

## **ANEJOS**

## 6. ANEJOS

### ANEJO 1 VARIEDADES MELOCOTONERO

variedad cv 1126-8			
forma fruto _ventral_	upov 33	2	medio achatado
punta de mucrón	upov 34	9	ausencia
extremo pistilar _sin mucrón_	upov 35	3	plano
simetria desde el pistilo	upov 36	2	asimetrico
prominencia de la sutura	upov 37	7	fuerte
cavidad peduncular_ profundidad	upov 38	5	media
cavidad peduncular_ anchura	upov 39	5	media
color de fondo de epidermis	upov 40	3	verde crema
color de superficie de epidermis	upov 41	9	presente
tono de color en superficie de epidermis	upov 42	6	rojo oscuro
distribución del color de superficie de epidermis	upov 43	3	estriado
extensión del color en superficie de epidermis	upov 44	7	grande
pubescencia en epidermis	upov 45	1	ausente
pubescencia_ densidad	upov 46	1	muy baja
grosor de epidermis	upov 49	1	fin

variedad cv 1126-8			
adherencia de epidermis y mesocarpo	7		fuerte
coloración del mesocarpo, en general	5		amarillo
coloración del mesocarpo pegado a la epidermis	2		débil
coloración del mesocarpo en el centro	2		débil
% de color en fruto	fuerte	3	
fibrosidad del mesocarpo	1		ausente
% color	60	2	
tamaño endocarpo	3		pequeño
forma endocarpo	3		eliptico
pigmentacion del endocarpo	3		débil
fisuras del endocarpo	1		ninguna
adherencia del endocarpo a mesocarpo	9		presente
L	2		gris
a	3,5		rosado
b	2		verde claro
a/b	4,5		alto
peso	4		alto
valor Ø longitudinal	3		medio
valor Ø ecuatorial	3		medio
valor dureza	8,5	3	semi duro



comentario panel catadores

Variedad con una zona calicina extensa que puede favorecer la susencia de plagas y enfermedades. Excelente sabor que mejora a las actuales ofertas de variedades de melocotón de tipo clásico.

variedad **cv Grocivac1**

forma fruto _ventral_	upov 33	2	medio achatado
punta de mucrón	upov 34	1	presencia
extremo pistilar _sin mucrón_	upov 35	2	algo puntiagudo
simetría desde el pistilo	upov 36	1	simetrico
prominencia de la sutura	upov 37	3	débil
cavidad peduncular_ profundidad	upov 38	3	poco profunda
cavidad peduncular_ anchura	upov 39	3	estrecha
color de fondo de epidermis	upov 40	2	verde
color de superficie de epidermis	upov 41	9	presente
tono de color en superficie de epidermis	upov 42	2	rosado
distribución del color de superficie de epidermis	upov 43	3	estriado
extensión del color en superficie de epidermis	upov 44	5	media
pubescencia en epidermis	upov 45	9	presente
pubescencia_ densidad	upov 46	5	media
grosor de epidermis	upov 49	1	finá

variedad	<b>cv Grocivac1</b>		
adherencia de epidermis y mesocarpo	7		fuerte
coloración del mesocarpo, en general	1		blanco-verde
coloración del mesocarpo pegado a la epidermis	1	1	ausente
coloración del mesocarpo en el centro	1		ausente
<b>% de color en fruto</b>	ausente	1	
fibrosidad del mesocarpo	1		ausente
<b>% color</b>	60	2	
tamaño endocarpo	3		pequeño
forma endocarpo	3		elíptico
pigmentación del endocarpo	1		ausente
fisuras del endocarpo	1		ninguna
adherencia del endocarpo a mesocarpo	9		presente
<b>L</b>	4		blanco
<b>a</b>	1		amarillo
<b>b</b>	5		azulado
<b>a/b</b>	1		muy bajo
<b>peso</b>	2,5		semi bajo
valor Ø longitudinal	2		bajo
valor Ø ecuatorial	2		bajo
valor dureza	6,5	2	semi blando



comentario panel catadores

Variedad de epidermis amarilla, poca acidez y adecuado contenido en azúcares. Se aprecian en algunos frutos encontrados en la zona soleada una epidermis sonrosada.

variedad cv Early Rich			
forma fruto _ventral_	upov 33	3	circular
punta de mucrón	upov 34	9	ausencia
extremo pistilar _sin mucrón_	upov 35	3	plano
simetria desde el pistilo	upov 36	1	simétrico
prominencia de la sutura	upov 37	7	fuerte
cavidad peduncular _profundidad_	upov 38	3	poco profunda
cavidad peduncular _anchura_	upov 39	3	estrecha
color de fondo de epidermis	upov 40	8	amarillo-verde
color de superficie de epidermis	upov 41	9	presente
tono de color en superficie de epidermis	upov 42	7	rojo negro
distribución del color de superficie de epidermis	upov 43	1	uniforme
extensión del color en superficie de epidermis	upov 44	1	ausente
pubescencia en epidermis	upov 45	1	ausente
pubescencia _densidad_	upov 46	1	muy baja
grosor de epidermis	upov 49	1	fin

variedad cv Early Rich			
adherencia de epidermis y mesocarpo	7		fuerte
coloración del mesocarpo, en general	6		amarillo anaranjado
coloración del mesocarpo pegado a la epidermis	1		ausente
coloración del mesocarpo en el centro	2		débil
% de color en fruto	débil	2	
fibrosidad del mesocarpo	1		ausente
% color	95	4	
tamaño endocarpo	3		pequeño
forma endocarpo	3		elíptico
pigmentación del endocarpo	1		ausente
fisuras del endocarpo	1		ninguna
adherencia del endocarpo a mesocarpo	9		presente
L	1		negro
a	2		amarillo rosa
b	1		verde
a/b	5		muy alto
peso	2,5		semi bajo
valor Ø longitudinal	2		bajo
valor Ø ecuatorial	2		bajo
valor dureza	9,19999	4	duro



comentario panel catadores

Melocotón de epidermis oscura, de recolección más tardía y sabor adecuado para la época de maduración. Destaca el excelente calibre de frutos analizados.

variedad	cv García		
forma fruto _ventral_	upov 33	3	circular
punta de mucrón	upov 34	9	ausencia
extremo pistilar _sin mucrón_	upov 35	3	plano
simetria desde el pistilo	upov 36	1	simetrico
prominencia de la sutura	upov 37	5	media
cavidad peduncular_ profundidad	upov 38	3	poco profunda
cavidad peduncular_ anchura	upov 39	3	estrecha
color de fondo de epidermis	upov 40	4	blanco-verde
color de superficie de epidermis	upov 41	1	ausente
tono de color en superficie de epidermis	upov 42	6	rojo oscuro
distribución del color de superficie de epidermis	upov 43	2	jaspeado
extensión del color en superficie de epidermis	upov 44	3	pequeña
pubescencia en epidermis	upov 45	1	ausente
pubescencia_ densidad	upov 46	1	muy baja
grosor de epidermis	upov 49	1	fina

variedad <b>cv Garcica</b>			
adherencia de epidermis y mesocarpo	7		fuerte
coloración del mesocarpo, en general	2		blanco
coloración del mesocarpo pegado a la epidermis	1		ausente
coloración del mesocarpo en el centro	1		ausente
<b>% de color en fruto</b>	ausente	1	
fibrosidad del mesocarpo	1		ausente
<b>% color</b>	50		1
tamaño endocarpo	3		pequeño
forma endocarpo	3		elíptico
pigmentación del endocarpo	3		débil
fisuras del endocarpo	1		ninguna
adherencia del endocarpo a mesocarpo	9		presente
<b>L</b>	3		claro
<b>a</b>	4		rojo
<b>b</b>	4		verde azul
<b>a/b</b>	2		bajo
<b>peso</b>	3		medio
valor Ø longitudinal	2		bajo
valor Ø ecuatorial	2		bajo
valor dureza	8,6	3	semi duro



comentario panel catadores

Variedad de pulpa blanca con excelente sabor que mejora a las variedades existentes en esta época de maduración.

variedad cv Gardeta			
forma fruto _ventral_	upov 33	4	ancho eliptico
punta de mucrón	upov 34	1	presencia
extremo pistilar _sin mucrón_	upov 35	3	plano
simetria desde el pistilo	upov 36	2	asimetrico
prominencia de la sutura	upov 37	7	fuerte
cavidad peduncular_ profundidad	upov 38	3	poco profunda
cavidad peduncular_ anchura	upov 39	3	estrecha
color de fondo de epidermis	upov 40	8	amarillo-verde
color de superficie de epidermis	upov 41	9	presente
tono de color en superficie de epidermis	upov 42	7	rojo negro
distribución del color de superficie de epidermis	upov 43	1	uniforme
extensión del color en superficie de epidermis	upov 44	7	grande
pubescencia en epidermis	upov 45	1	ausente
pubescencia_ densidad	upov 46	1	muy baja
grosor de epidermis	upov 49	1	fin

variedad cv Gardeta			
adherencia de epidermis y mesocarpo	7		fuerte
coloración del mesocarpo, en general	2		blanco
coloración del mesocarpo pegado a la epidermis	1		ausente
coloración del mesocarpo en el centro	1		ausente
% de color en fruto	ausente	1	
fibrosidad del mesocarpo	1		ausente
% color	80	3	
tamaño endocarpo	3		pequeño
forma endocarpo	3		elíptico
pigmentación del endocarpo	1		ausente
fisuras del endocarpo	1		ninguna
adherencia del endocarpo a mesocarpo	9		presente
L	3		claro
a	3,5		rosado
b	4		verde azul
a/b	2		bajo
peso	2		bajo
valor Ø longitudinal	2		bajo
valor Ø ecuatorial	2		bajo
valor dureza	10	5	muy duro



comentario panel catadores

Nectarina de coloración irregular que puede mostrar excesivas lenticelas según la zona de cultivo.  
Sabor muy equilibrado entre azúcares y ácidos.

variedad **cv PAR698-07**

forma fruto _ventral_	upov 33	1	eliptico
punta de mucrón	upov 34	1	presencia
extremo pistilar _sin mucrón_	upov 35	5	hundido
simetria desde el pistilo	upov 36	1	simetrico
prominencia de la sutura	upov 37	3	débil
cavidad peduncular_ profundidad	upov 38	3	poco profunda
cavidad peduncular_ anchura	upov 39	3	estrecha
color de fondo de epidermis	upov 40	4	blanco-verde
color de superficie de epidermis	upov 41	9	presente
tono de color en superficie de epidermis	upov 42	6	rojo oscuro
distribución del color de superficie de epidermis	upov 43	1	uniforme
extensión del color en superficie de epidermis	upov 44	9	muy grande
pubescencia en epidermis	upov 45	1	ausente
pubescencia_ densidad	upov 46	1	muy baja
grosor de epidermis	upov 49	2	media

variedad	<b>cv PAR698-07</b>		
adherencia de epidermis y mesocarpo	9	muy fuerte	
coloración del mesocarpo, en general	2	blanco	
coloración del mesocarpo pegado a la epidermis	1	ausente	
coloración del mesocarpo en el centro	1	ausente	
<b>% de color en fruto</b>	ausente	1	
fibrosidad del mesocarpo	2	débil	
<b>% color</b>	80	3	
tamaño endocarpo	3	pequeño	
forma endocarpo	2	circular	
pigmentación del endocarpo	3	débil	
fisuras del endocarpo	1	ninguna	
adherencia del endocarpo a mesocarpo	9	presente	
<b>L</b>	2	gris	
<b>a</b>	2,5	amarillo rosado	
<b>b</b>	2,5	semi verde	
<b>a/b</b>	4	semi alto	
<b>peso</b>	1	muy bajo	
valor Ø longitudinal	1	muy bajo	
valor Ø ecuatorial	1	muy bajo	
valor dureza	5	1	blando



comentario panel catadores

Material vegetal sin aperturas en la zona estilar que representa una novedad en este grupo de variedades.

Excelente sabor y textura que destaca por la fibrosidad de la pulpa.

