

## **ANEXO I**

### **Análisis estadísticos no significativos de la sintomatología de la encefalitozoonosis**

## Sintomatologías ocular y síndrome vestibular




Figura 19. Gráfico de mosaico para S. ocular según Rolling

Tabla 15. Frecuencias para S. ocular según Rolling

|                   | No     | Si     | Total por Fila |
|-------------------|--------|--------|----------------|
| No                | 47     | 14     | 61             |
|                   | 42,73% | 12,73% | 55,45%         |
| Si                | 38     | 11     | 49             |
|                   | 34,55% | 10,00% | 44,55%         |
| Total por Columna | 85     | 25     | 110            |
|                   | 77,27% | 22,73% | 100,00%        |

Tabla 16. Test de independencia para S. ocular según Rolling

| Prueba       | Estadístico | Gl | Valor-P |
|--------------|-------------|----|---------|
| Chi-Cuadrada | 0,004       | 1  | 0,9502  |

## Sintomatologías andar en círculos y síndrome vestibular




Figura 20. Gráfico de mosaico para S. andar en círculos según SV

Tabla 17. Frecuencias para S. andar en círculos según SV

|                   | No     | Si     | Total por Fila |
|-------------------|--------|--------|----------------|
| No                | 62     | 41     | 103            |
|                   | 56,36% | 37,27% | 93,64%         |
| Si                | 2      | 5      | 7              |
|                   | 1,82%  | 4,55%  | 6,36%          |
| Total por Columna | 64     | 46     | 110            |
|                   | 58,18% | 41,82% | 100,00%        |

Tabla 18. Test de independencia para S. andar en círculos según SV

| Prueba       | Estadístico | Gl | Valor-P |
|--------------|-------------|----|---------|
| Chi-Cuadrada | 2,694       | 1  | 0,1007  |

## Sintomatologías ataxia en extremidades posteriores y síndrome vestibular




Figura 21. Gráfico de mosaico para S. ataxia en extremidades posteriores según SV

Tabla 19. Frecuencias para S. ataxia en extremidades posteriores según SV

|                   | No     | Si     | Total por Fila |
|-------------------|--------|--------|----------------|
| No                | 57     | 39     | 96             |
|                   | 51,82% | 35,45% | 87,27%         |
| Si                | 7      | 7      | 14             |
|                   | 6,36%  | 6,36%  | 12,73%         |
| Total por Columna | 64     | 46     | 110            |
|                   | 58,18% | 41,82% | 100,00%        |

Tabla 20. Test de independencia para S. ataxia en extremidades posteriores según SV

| Prueba       | Estadístico | Gl | Valor-P |
|--------------|-------------|----|---------|
| Chi-Cuadrada | 0,441       | 1  | 0,5065  |

## Sintomatologías ataxia en extremidades posteriores y Rolling




Figura 22. Gráfico de mosaico para S. ataxia en extremidades posteriores según Rolling.

Tabla 21. Frecuencias para S. ataxia en extremidades posteriores según SV

|                   | No     | Si     | Total por Fila |
|-------------------|--------|--------|----------------|
| No                | 74     | 22     | 96             |
|                   | 67,27% | 20,00% | 87,27%         |
| Si                | 11     | 3      | 14             |
|                   | 10,00% | 2,73%  | 12,73%         |
| Total por Columna | 85     | 25     | 110            |
|                   | 77,27% | 22,73% | 100,00%        |

Tabla 22. Test de independencia para S. ataxia en extremidades posteriores según Rolling.

| Prueba       | Estadístico | Gl | Valor-P |
|--------------|-------------|----|---------|
| Chi-Cuadrada | 0,015       | 1  | 0,9012  |

## Sintomatologías ataxia general y Rolling




Figura 23. Gráfico de mosaico para S. ataxia general según Rolling.

Tabla 23. Frecuencias para S. ataxia general según Rolling.

|                   | No     | Si     | Total por Fila |
|-------------------|--------|--------|----------------|
| No                | 61     | 14     | 75             |
|                   | 55,45% | 12,73% | 68,18%         |
| Si                | 24     | 11     | 35             |
|                   | 21,82% | 10,00% | 31,82%         |
| Total por Columna | 85     | 25     | 110            |
|                   | 77,27% | 22,73% | 100,00%        |

Tabla 24. Test de independencia para S. ataxia en extremidades posteriores según Rolling.

| Prueba       | Estadístico | Gl | Valor-P |
|--------------|-------------|----|---------|
| Chi-Cuadrada | 2,213       | 1  | 0,1368  |