

51 Saponosa verde = Tercera gene-
racion = Corechada en Bar-
cheta (Pativa)

52 Cruzada de portuguesa y japo-
nesa verde = Segunda generacion
Corechada en Barcheta (Pati-
va)

- n. 1. nigrum denigratum
 2. quidam 2 denigratos
 3. nigrum denigratum
 4. emys a arvanon
 5. denigratum 3 denigratos 2
 7. nigrum brunum
 10. denigratum
 11. quidam 2
 17. quidam 5 2 2 2 denigratos
 20. nigrum quidam 2 denigratos
 21. denigratos
 22. quidam 3 denigratos 3 brunum
 23. quidam 5. 1 denigratos 2 brunum
 24. denigratos
 26. brunum denigratos 3

28 siguen

30 no sale

32 — deschad. (creamen)

33 id — id

35 — aviso mala - no se avisa

(creamen genavos) deschad.

40 bien - muy bien

41 bien insignificante

42 aviso. lenta - Indico

43 muy bien

44 bien sigue avanzando

45 muy bien - muchos

46 no sale

47 id

48 id

49 no sale

50 no sale muy bien

51 no sale

52 no sale

53 trav. America

n° 23	Japon vende		Uzad.
n° 24	" "	1° rep°	id.
n° 25	Cordova	Juan Colle	Meiva
n° 26	Africa	"	"
n° 27	Japon	Ant. S. Ant. 1° rep°	Chivivalla
n° 28	Maltonia	B. S. Ant. 1° rep°	Maltonia
n° 29	Japon vende 1° rep°	J. S. Ant. 1° rep°	Ninerosa
n° 30	Raza Cataluna	D. R. S. Ant. 1° rep°	Divinosa
n° 31	Japon 1° rep°	D. R. S. Ant. 1° rep°	Ovis
n° 32	Japon 2° rep°	D. R. S. Ant. 1° rep°	Ovis
n° 33	Japon 1° rep°	R. S. Ant. 1° rep°	Caragante
n° 34	" 2° rep°	id.	id.
n° 35	" 1° rep°	D. S. Ant. 1° rep°	id.
n° 36	" " "	"	Algenes
n° 37	" " "	D. S. Ant. 1° rep°	Meiva
n° 38	" " "	Mr. R. S. Ant. 1° rep°	Kamisa
n° 39	Raza europea	D. S. Ant. 1° rep°	Cataluna
n° 40	"	"	"
n° 41	"	D. S. Ant. 1° rep°	Bayo Aragon
n° 42	Raza japon 3° rep°	C. S. Ant. 1° rep°	Carlet.
n° 43	id.	travoltina	id.
n° 44	Raza europea	D. S. Ant. 1° rep°	Cataluna
n° 45	Raza japon 3° rep°	id.	Valencia

Muestras presentadas


n.º 1	Japón 1.º repud. 1.º	Blutlocke
n.º 2	id id Mendia	id
n.º 3	id id	D. Jaime Puig
n.º 4	" 3 - R. de Montigny	Vitanova
n.º 5	Japón - n.º 7 año anterior	Paña
n.º 6	D. Antonio Pascual Abad	
n.º 7	capullo blanco Montevideo	
n.º 8	verde 2.º repud - Algenes	
n.º 9	Japón amarillo 1.º repud	
n.º 10	San carpenteros - de Guines - 2.º cosecha 8 setiembre	
n.º 11	Guines - muy mala	
n.º 12	- o sea antiguo 1.º Agricultura	
n.º 13	(n.º 15) Salvador Montalva - sui	Alcivar
n.º 14	(23) Japón verde 2.º rep	Alcanda
n.º 15	(29) Portugal	Id
n.º 16	(30) Japón verde 2.º rep	id
n.º 17	(40) Japón verde 1.º rep	id
n.º 18	(39) id id 2.º id	id
n.º 19	(41) id id 5.º id	Monviedo.
n.º 20	(28) id id 4.º id	Albargen
n.º 21	Japón verde 3 rep	Albargen
n.º 22	" " 2 "	Purapa

n.º 1

Ex. Director del Gabinete
de examen microscopico de los
gusanos de seda.
Valencia

Muy Comis: habiendo li-
do la circular que esa sociedad ha
insertado anunciando la creacion de
un gabinete de ensayos precoces de
cosecha de seda, y aprovechando su
ofrecimiento, adjunto remito a V.
una pequena muestra de semilla
para su examen, agradeciendole
fuere una de las cincuenta cosechas
que V. se proponen llevar a efecto,
Pertenece a la raza europea de
capullo amarillo, reproducida y
criada dando buenos resultados dos
años consecutivos en Vite-puello
del Bajo-Aragon siendo su pro-
pietario este su afano J. J.
J. J. M. J.
Domiciliado Drets J. J. Espin
13. Valencia

Curso de 186 á 186




MÀTRICULADO AL NÚM. _____

Don Colomer cursante de dicha facultad
por el exámen de _____ asignaturas, segun

de *Junio* de 1867

El Secretario de la facultad,



Nº 1º tiene barba

3 - no tiene

17 - tiene

21 - no tiene

24 - barba corta

26 - muchos

28 - muchos

32 - id

33 - id

35 - no tiene

42 - no tiene

- D. Pedro Morán


Man Fontanals.

N^o 26 — Día 25

" 47 }
" 48 } Día 27
" 49 }
" 50 }

51 }
52 } Día 28

Día 9 — mes de mayo



- 1^o designales
 2^o numeros todos - directad -
 3 Indicos
 4 naen
 5 designales
 7 en numeros
 11 uno. valid? 3
 14 design
 20 descubados
 21 por
 22 validos 3
 23 id
 24 id
 26 por
 28 designales
 29 } hymanter 1^o por
 30 }
 31 }
 32 }

43 } bien


44

45 in muchos


49 - destruccion in mar

51 id. id.


50 mar bien muchos



F. FERNANDEZ DE LOS MUROS



F. FERNANDEZ DE LOS MUROS



Sevilla de Sartori del Japon enviada en el
puerto Chiriquillo primer año

Sevilla de Mallorca enviada en Mallorca
sus medios o sea lejos de Palma

Calle del Gobernador Viejo n. 55

Bernardo Arbois

Lo que estos atados con ilo negro es la
del Japon

n.º 27 y 28.

Sr. Director del Gabinete de especímenes
microscópicos de los gusanos de seda Val.º

Mi señor mío: en vista de los
datos de la sociedad, adjunto remito a V.º
una poca simiente de orizien cosechada
en casa el pasado año, es de color verde y
es el mismo sembrado con el n.º 4 de la cagente
bajo el nombre de Ricardo Pardo.

Sin más Sr. Director se repite de V.º con la
mayor consideración S. S. D. B. S. M.

Ricardo Pardo

Carcagente 29 Enero 1869.

T. L.

49

Villanueva de Castellón

Se vende en
Santiago y suano de
sede: reproducción del
Tapon. 70000 año

47 Para Europa - conchada en Cataluña

48

id

id

4000	montes a 6 escudos	24000
6000	montes a 6	36000
2000	ter a 6	12000
8000	ter a 2	16000
8000	ter a 1	8000
		80,000

Carruajes

130	de 4 ruedas y 2 cab.	a 6 esc. mrs	-	9360
126	de 4	1	6	6048
60	fant. cuadrada	3		2160
198	redonda	2		3792
60	carritos atant.	1		480
34	caballos montar	2		816

22656.

85
 85
 87
 47
 86

58
 45
 46

- no 1 Dargh

3 id

4 - Depósito 1

5 - buccina 4

7 por

11 guide 1 day: 2

17 buccina 3

21 buccina 4

22 depósito 4

23 depósito 3

26 depósito 2. regular

28 buccina 4

40 ~~Depósito~~ 2 buccina

41 depósito 2

42 depósito 2 por

43 id id

1 caudo grande y vacuo
no id. carnos
50 id - sabido

n^o. 1 Inj 3

3 Injuntan L.

4 Injuntor 2

5. Injuntor Inj L.

7 genda genda Injuntor 3

11. genda genda

17 Injuntor 3

22 B Inj L. Injuntor.) Inj 3

23 Inj L.

28 derchadu L Inj 3 —


24 Injuntan L.

L. Injuntor 2

41 id

42 id

- 43 id
44 bueno id
45 id
50 muchos y buenos
46 bueno 1a
47 nacen
48 nace
49
52 morale
53 id -





GABINETE DE EXÁMEN MICROSCÓPICO DE LOS GUSANOS DE SEDA.

Encargado este **Gabinete** del examen microscópico del *bombyx mori*, con el objeto de comprobar en la práctica las conclusiones científicas de los modernos entomólogos, hizo un llamamiento á los sericultores del país ofreciéndose desde luego á examinar el estado corpusculoso de las mariposas que se dedicaban á reproductoras en la pasada primavera, con el fin de que pudieran desecharse aquellas cosechas que presentaban un grado muy intenso de infección.

Creiendo interpretar los deseos de las Sociedades ECONOMICA y VALENCIANA DE AGRICULTURA, fundadoras del **Gabinete**, los que suscriben no han hecho mas que examinar las muestras presentadas, anotando cuidadosamente el estado mas ó menos corpusculoso de las mariposas para formar el cuadro que se acompaña á continuación. Si la teoría de M. Pasteur es cierta en toda su estension; si toda crisálida ó mariposa que contenga los pequeños cuerpos llamados corpúsculos vibrantes, produce una semilla donde tambien se encuentran, y ésta á su vez dá origen á gusanos en los que se desarrolla la enfermedad; las alegrías que despertó la pasada cosecha, mas rica en productos que las anteriores, tienen escasisimo fundamento. Mas aun, si aquella teoría es cierta podemos decir que el contagio que empobrece á los sericultores, se halla en un estado de poderosa energía, que todo lo ataca, todo lo invade, y domina hoy desde la primera generacion á las razas extranjeras del archipiélago japonés, que son á no dudarlo las de mas enérgica vitalidad que posee el mundo sericícola.

Cuarenta y cinco muestras se han presentado al examen, segun se detalla en el cuadro adjunto, y solo tres de ellas han aparecido completamente libres de corpúsculos en el campo microscópico. ¡Pequeñísima proporcion que desconsuela, si pensamos que los capullos recibidos corresponden á las cosechas calificadas como mejores en nuestra zona! y este desconsuelo aumenta si observamos tambien que en la mayor parte de los lotes, el número de individuos corpusculosos escende de 50 por 100, revelándose en ello la energía del contagio á que están sometidos.

Digno es igualmente de llamar la atencion el gravísimo estado de contagio que revela el número infinito de corpúsculos que aparece en las mariposas de las razas del país, cuyos signos exteriores demuestran bien á las claras la enfermedad que padecen. En las cinco muestras de estas razas examinadas en el **Gabinete**, los insectos ofrecían una verdadera masa de corpúsculos que estendida en agua destilada llenaba por completo el campo del microscopio, mientras que en las muestras japonesas, menos enfermas, se veían las mas voces, algunos aunque pocos de aquellos pequeños cuerpecillos. Conocido el estado de las razas europeas, este hecho parece que dé alguna fuerza á la teoría de M. Pasteur, sobre la que los que suscriben no se arriesgan á hacer apreciacion alguna por no conceptuar suficientes los datos reunidos hasta ahora para decidir en tan delicada cuestion.

De todos modos, y cumpliendo con una de las bases acordadas por este **Gabinete**, publicamos á continuación el siguiente cuadro, que esperamos sea provechoso á los sericultores, pues no solo dá la medida de la situacion de la enfermedad en nuestro país, sino que indica las procedencias que deban buscarse ó desecharse, segun el estado de sanidad en que se presenten.

Valencia 1.º de Enero de 1869.

José Monseñat.

Felicesimo Llorente y Olivares.

GABINETE DE EXÁMEN MICROSCÓPICO DE LOS GUSANOS DE SEDA.

Resultado obtenido en el exámen microscópico de las muestras presentadas á este gabinete.

RAZA JAPONESA (1).—Semilla de origen.			
Número de la muestra.	Punto donde se siguió la cosecha.	Nombre del propietario.	Número de individuos enfermos.
1	Játiva.	D. Luis Mas y Gozalvo.	94 %
7	Carcagente.	» Ricardo Peña.	10
12	Término de Ribarroja.	»	10
15	Alcira.	» Salvador Montalva.	0
17	Idem.	» Gregorio Presencia.	30
20	Carcagente.	» José Crespi.	66
22	Alberique.	Se ignora.	46
26	Valencia.	»	72
27	Alberique.	D. Antonio Iborra.	90
29	Valencia.	Se ignora.	9
30	Idem.	»	100
32	Alberique.	D. Hilario Roca.	33
35	Alcira.	» Francisco Ravent.	93
40	Valencia.	Se ignora.	0
42	Murviedro.	D. José María Garcés.	54
RAZA JAPONESA.—1.ª Reproduccion.			
2	Játiva.	D. Luis Mas y Gozalvo.	44 %
3	Alcira.	» Salvador Fust.	90
8	Carcagente.	» José Ferrer.	89
13	Manuél.	Se ignora.	64
21	Valencia.	»	100
23	Albaida.	D. Francisco Torno.	7
24	Valencia.	Se ignora.	100
34	Carlet.	D. Carlos Cervera.	55
37	Valencia.	Se ignora.	62
38	»	»	100
39	»	»	100
45	Novelda.	D. Vicente Gomez.	0
RAZA JAPONESA.—2.ª Reproduccion.			
11	Término de Ribarroja.	Se ignora.	10 %
16	Alcira.	D. Bernardo España.	100
19	»	» Bernardo Roselló.	50
31	Fuente Encarroz.	» Venancio Vives.	66
44	Guadasuar.	Se ignora.	100
RAZA JAPONESA.—3.ª Reproduccion.			
9	Borbotó.	D. José Marco.	53 %
10	Término de Ribarroja.	Se ignora.	10
18	Alcira.	D. Serafin Coll.	57
28	Alberique.	» Antonio Iborra.	50
43	Guadasuar.	Se ignora.	100
RAZA JAPONESA.—4.ª Reproduccion.			
6	Alginet.	Se ignora.	71 %
41	Murviedro.	D. Pedro Nolasco Barrachina.	59
RAZA EUROPEA.—Procedente de Mallorca.			
14	Manuél.	Se ignora.	100 %
RAZA EUROPEA.—Procedente de Portugal.			
25	Valencia.	D. Joaquin Hedó.	95 %
RAZA EUROPEA.—Procedente de Cataluña.			
36	Burjasot.	Se ignora.	100 %
CRUZAMIENTO DE RAZA EUROPEA Y JAPONESA.			
4	Carcagente.	D. José Ferrer.	100 %
5	Valencia.	Se ignora.	80

(1) Todas las muestras de raza japonesa presentadas en el gabinete eran de capullo verde, exceptuando las señaladas con los números 29 y 32 que era amarillo.

Año 1869

Cosechas precoces.

Nº 6.

Raza

Presentada por D. Antonio Pascual Mad.

Experimento microscopico = No aparecen espermatozoos en la muestra

- Día 3 feb. Se remite a la avivación a los 18° temperatura
4, 5, 6, 7 Temperatura a 20°.
8, 9. Bien — idem.
10. Comienza la avivación en buenas condiciones — se les da dos comidas.
11, 12, 13 Sigue la avivación con lentitud. Ayuda de agua.
14, 15. Bien — idem.
16. Concluye la avivación.
17, 18 Ayuda de agua — Mueren algunos.
19 Sigue la mortalidad.
Experimento microscopico { Habiendo examinado al microscopio algunos gusanos
han presentado muchos espermatozoos.
20, 21, 22 Siguen mal. Mortalidad.
23. Aumentan la mortalidad.

Desembada la muestra.

Nov. 1869

Cosechas precoces.

N.º 8.

Para japonesa - 1.ª reproducción - Cosechada en Algemesi
Presentada por D.

Lophium microscopico = Aparecen muchos ejemplares en la muestra.


Día 3 feb. Se volvió a la avivación a los 18° temperatura a.

4, 5, 6 Temperatura 20°

7 Avivación general. Los gusanos presentan buen aspecto y toman bien la hoja - Se les da dos comidas.

8 Mustranse lentos en tomar la hoja - 21°

9 Mortalidad - Se cosechada la muestra.



Año 1869.

Cosechas precoces.

Nº 9.

Parapionera capillo amarillo 1ª reproducción cosechada en Valencia.
Presentada por D. Feliciano Florenti y Olivares.

Examen microscópico - No aparecen corpúsculos en la semilla.

Día 3 feb. Se somete a la vivación a los 18° temperatura

4, 5, 6, 7 Temperatura 20°

8, 9, 10. *Idea* - *idea*.

11. Comienza la vivación con lentitud.

12 - 13 14 Sigue con lentitud.

15. - 16 Concluye la vivación

17 Facilidad en los movimientos. Aspecto dorado.

18. 19. Mueven sus miembros.

Examen microscópico { Habiendo examinado al microscopio algunos granos
han presentado bastante corpúsculos

20, 21 Mortalidad.

Desembada la muestra.

Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º 12.

Raza

Presentado por el jabuche microscopico.

Lepisma microscopico. No aparecen corpúsculos en la muestra.

Día 3 feb. Se somete a la avivación a los 18° temperaturas.

4, 5, 6, 7 Temperatura 20°.

8 Comienza la avivación con buen apuro. Se le da dos comidas = 21°.

9, 10 Siguen la avivación con lentitud.

11, 12, 13 Muestran poco apuro.

14, 15, 16 Mueren algunos avivación lenta.

17, 18. Siguen lentamente la avivación, y mueren algunos gusanos.

19, 20 Bien.

21. Deurica. Mal apuro.

22, 23, 24 Deurican

25, 26, 27. Juegan pocos.

28. Mueren casi todos

1. Marzo 2. Se continúan los ultimamente nacidos

3, 4, 5, 6 Mueren paulatitamente.

7, 8, 9. Bien - idem.

Desechada la muestra.

Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º 13.

Raza

Presentada por el fabrilero microscopio

Examen microscopio = No aparecen corpusculos en la muestra

- Día 3 feb. Se somete a la ariación a los 18° temperatura
4, 5, 6, 7 Temperatura a 20°
8, 9, 10, Ben - idem
11. Comienza la ariación
12, 13, 14 Sigue rápida la ariación - Aspecto rojizo en el gerano.
15 - 16 Concluye ariación
17 Mueven algunos - Se abiten en los movimientos.
18, 19 Siguen moviéndose.

- Examen microscopio { Habiendo examinado al microscopio algunos geranos
no han presentado bastantes corpusculos.
20, 21 Mueven bastantes.
22, 23 - Siguen la mortandad.

Desechada la muestra.

Año 1869

Cosechas precoces.

Nº 14.

Para japonesa 2ª reproducción - sembrada en Maizá

Presentada por el fabricante microscopio

Especimen microscopio - No aparecen corpúsculos en la semilla.

Día 3 feb. Se somete a la aviación a los 18° temperatura

4, 5, 6, 7 temperatura 20°

8, 9. idem idem

10, 11. Comienza la aviación - se le da dos comidas.


12, 13. Segue con mucha lentitud la aviación.

14, 15. Idem idem.

16, 17. Mueren algunos.

18

Desembada la muestra.



Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º 18.

Para

Presentada por el Jefe de Microscopio

Ejemplar microscopio - No aparecen organismos en la muestra.

Día 3 feb. Se somete a la avivación a los 18° temperatura

4, 5, 6, 7 Temperatura 20°

8, 9, 10, 11. Idem

12, 13, 14. Idem

15, 16, 17. Idem

18, 19, 20. Idem

21, 22, 23 Idem

24, 25, 26 Idem

27, 28 Idem

1.º Marz 2.º Se presentan los primeros gusarros.

3. 4. 5. 6 Mueren los gusarros que han nacido

7. 8. 9. Idem - idem.

Terminada la muestra.

Año 1869

Cosechas precoces.

N.º 14.

Raza japonesa 2.ª reproducción cosechada en Valencia.

Presentada por el fabril microscopico

Examen microscopico = No aparecen corpúsculos en la muestra.

Día 3 feb. Se somete a la acivación a los 18.º temperatura

1, 5, 6, 7 Temperatura 20.º

8, 9, Idem — idem.


10, 11, Continúa la acivación Se le da los comidos.

12, 13, 14 Sigue la acivación. Aspecto rojo y de dorso en los gusanos.

15, 16 Mueren algunos.

17 Mortalidad notable.

18 Se ceba la muestra.



Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º 18.

Para japonés a 2.ª reproducción cosechada en Valencia
Preservada por el jabón trieroscopio

Ejemplar trieroscopio = No aparecen copulantes en la muestra.

Día 3 feb.	Se remite a la cría a las 18° temperatura
4, 5, 6, 7,	Temperatura 20.º
8, 9, 10, 11,	Idem.
12, 13, 14,	Idem.
15, 16, 17,	Idem.
18, 19, 20	Idem.
21, 22, 23,	Idem.
24, 25, 26	Idem.
27 28	Idem.
1. Marzo 2.	Idem.
3, 4, 5, 6	Idem.
7, 8, 9.	Idem.

Describida la muestra.

Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º 19.

Para japonesa 5ª reproducción cosechada en Murviello
Presentada por el fabriante microscopio

Epianu microscopio = No aparecen corpusculos en la semilla.

Día 3 feb.	Se remite a la avivación a los 18° temperatura
4, 5, 6, 7,	Temperatura 20°
8, 9, 10, 11	Ben. idem.
12,	Ben.
13	Comienza la avivación. Aspecto sudoso.
14, 15, 16	Mueren algunos
17	Mortalidad notable.
18	Concluye la avivación. Mueren algunos.
19.	Mortalidad.

Cosechada la muestra.

Examinados al microscopio han presentado bastante corpusculos.

Año 1869.

Cerebras praeceles.

N.º 25.

Flora europea Cocida en Cordova

Presentada por Don Juan Coll

Examen microscopico - No aparecen compuestos en la muestra.

Dia 3 feb. Se pasa a la avivacion a los 18.º temperatura

4, 5, 6, 7, temperatura a 20.º

8, 9, 10, 11, Idem.

12, 13, 14, Idem.

15, 16, 17, Idem.

18, Idem.

19. Comienza la avivacion con lentitud y mal aspecto.

20. Aspecto negro - lentitud en los movimientos. No toman la forma y mueren algunos.

21. Mortalidad notable.

Desechada la muestra.

Año 1869.

Culebra proceres.

N.º 27.

Para japonesa 1.ª reproducción Culebrada en Chirivella
Presentada por D. Bernardo Arbores.

Examen microscópico - No aparecen conpunclos en la semilla.

En 3.ª se somete a la acivación a los 18.º temperatura.

4, 5, 6, 7 Temperatura 20.º

8, 9, Idem idem

10, 11, Comienza la acivación.

12, 13, 14 Sigue con mucha actividad

15, 16 Concluye la acivación Después repeto.

17, Aspecto rojo y Indura.

18 Mucha actividad.

19, 20 Sigue aumentando.

21 Mortalidad notable.

Desechada la muestra.

Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º 29.

Escaraposa 1.ª reproducción cosechada en Mérida
presentada por D. José Velasco

Examen microscópico: Aparato bastante concurrido en la semilla.

- Des 8 p.b. Se remite a la cría a las 18° temperatura
9, 10, Temperatura 20°.
11, Comienza la cría.
12, 13, Sigue rápidamente. Muy buen apuro.
14, 15, 16, Sigue. Apuro de oro.
17, 18, Mueren algunos.
19, 20, 21, Idem.
22, 23, 24, Continúa críandose y muriendo a la poca hora.
25, 26, Idem.
27,

Deschada la muestra.

Año 1869.

Cochas precous.

N.º 31.

Rasa japonica = 1.ª reproducción Cochada en Oliva
Presentada por D. Rafael Pascual.

Especimen microscopico = No aparecen coperculo en la semilla.

Dia 8 p.b. Se remite a la vivacion a los 18.º temperatura

9, 10, 11. Temperatura 20.º

12. Bien idem

13. Comienza la vivacion con lentitud.

14, 15, 16 Se presentan muy pocos gusanos

17, 18, 19 Sejen con mucha lentitud.

20, 21 Mueren muchos al nacer

22, 23, 24 Bien

25, 26, 27 Bien.

28. Bien

1.º Marzo 2. Bien

3, 4, 5, 6. Bien

7, 8 - 9. Bien

Derubada la muestra.

Año 1869.

Cosecha precocis.


N.º 14.

Sera japonesa 2.^a reproducción cosechada en Carcagente
presentada por D. Rosendo Pastor.

Lupinus microrogius - No aparecen corpúsculos en la muestra.

Del 10 al 12	Se remite a la asociación a los 18° temperatura
11 - 12	temperatura a 20°
13, 14, 15, 16	Nacen algunos granos
17, 18, 19	Según la asociación con lentitud. Aspecto Induro.
20, 21	Según marcando algunos no toman la forma
22, 23 -	Nacen muchos otros no toman la forma

Desechada la muestra.



Año 1869.

Corubas precoces.

N.º 36.

Rana japonica 1.ª reproducción - Corubada en *Aguiar*
presentada por.

Rana microcephala - Aparcen bastante copiosos en la muestra.

Día 10 feb. Se remite a la acuario a los 18° temperaturas.

11. 12. 13 Temperatura 20°

14. 15. 16 Nacen con lentitud - Aspecto Indura.

17. 18. 19 Mueven algunos.

20. 21. 22 Nacen muchos y sanos sin tomar la luz

23. 24. 25 - Idem -

26. 27. 28 - Idem -

1.º Marzo 2.º Continúa moviendo los peces que nacen

3. 4. 5. 6 -

Describida la muestra.

Año 1869.

Combinaciones

N.º 98.

Para japonesa 1.ª reproducción Combinada a Francia
Presentada por Mr. Adolphe Olivier.


Examen microscópico = no aparecen corpúsculos en la muestra.

Día 13 feb. Se presenta una muestra de gusano reaccionados

11.

Los gusanos que en vida habían padecido un largo ayuno, no han
tenido energía para subir a la hoja tierna que se les dio, y han
muerto todos.

Describida la muestra.



Año 1869.

Conchas frescas.


N.º 37.

Naia japonica 1.ª reproducción - Conchada en Aliva
presentada por D. José Dart.

Examen microscópico = No aparecen corpusculos en la muestra.

Día 10 feb.	Se somete a la vivificación a los 18° temperatura
11, 12, 13	Temperatura 20°
14, 15, 16	Idem.
17, 18, 19	Se presentan algunos juvenes.
20, 21, 22	Mueren y mueren sin tomar la boga.
23, 24, 25	Idem
26, 27, 28	Idem
1.º Marzo. 2.º	Idem
3.º 4.º 5.º 6.º	Idem.

Desechada la muestra.



Año 1869.

Cosecha precoz.


N.º 39.

Para Europa de capullo amarillo cosechada en Cataluña.
Presentada por D.ª Dolores Ferrer.

Egamon microscopio = No aparecen cuerpos en la muestra.

Día 13 feb. Se resume a la cría a los 18° temperaturas.
14, 15, 16, 17 Temperatura 20°
18, 19, 20, Idem
21, 22, 23 Comenzan a nacer algunos
24, 25, 26 Mueren algunos sin tomar la fuga
27, 28 Idem
1.º Marzo 2 Idem
3, 4, 5, 6 Siguen muriéndose al nacer.

Desechada la muestra



Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º 1.º

Para japonesa 1.ª reproducción = cosechada en Valencia.
Presentada por D.

Examen microscópico = La semilla presenta algunos corpusculos.

Día 3 febrero. Se somete a la incubación a los 18° temperaturas.

4 y 5 Aumentata la temperatura a 20°.

6 Se presentan los primeros gusanos. Filizos umbilados.

7 Sigue la avivación normal. Los gusanos se presentan de buen aspecto: a la de los comidos y suben bien a la hoja.

8 Sigue la avivación en buenas condiciones. Suben bien a la hoja. 21°.

9. Termina la avivación. Siguen bien.

10, 11, 12. Bien.

13, 14, 15. Bien.

16. Bien.

17, 18. Comienza a dar origen alguna. Aspecto bueno.

19. Disminuye en su mayor parte.

Examen microscópico [He habiendo examinado al microscopio los que van adelante los se habían despertado ya, han presentado bastante corpusculos.

20, 21. Se despiertan. Bastante actividad.

22, 23, 24. Mejoran de aspecto.

25, 26, 27. Siguen algo desiguales.

28. 1.º Marzo. Disminuye 2.º mismo.

2. Despiertan.

3, 4, 5, 6, 7. Siguen bien.

8, 9. Se despiertan algo.

Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º 2.

Raza japonesa = 1.ª reproducción = cosechada en Alcadia.
Presentada por

Examen microscopico = La muestra presenta algunos corpusculos.

Día 3 feb. Se somete a la incubación a los 18.º temperaturas.

4 y 5. Aumento de temperatura a 20.º

6 Se presentan los primeros gusanos. Ninguno cubado.

7 Sigue la avivación normal. Los gusanos presentan buen aspecto; se les da dos comidas y suben bien a la hoja.

8 Sigue la avivación en buenas condiciones. Suben bien a la hoja = 21.º

9-10. Bien - idem.

11, 12. Concluye la avivación. Forman bien la hoja.

13, 14, 15, 16. Bien. Siguen dando en sus movimientos.

17, 18. Mueven algunos. Aspecto de dorso.

19. Comienzan a dormir.

Examen microscopico { Habiendo examinado al microscopio algunos gusanos
han presentado bastante corpusculos.

20, 21. Se depositan bastante mortalidad.

22, 23, 24. Mejorán de aspecto.

25, 26, 27. Juegan poquitos.

28. 1.ª Muerte. Describen 2.ª muerte.

2. Describen.

3, 4, 5, 6, 7. Mueven algunos al depositar del 2.º sueno.

8, 9

Año 1867.

Cochas precoces.

Nº 3.

Naza pygmaea = 1ª reproducción - cosechada en
presentada por Don Jaime Puig.

Ejemplar microscopico = La muestra contiene algunos corpusculos.

Día 3 feb. Se somete a la incubación a los 18° temperatura.

4 y 5 Aumento de temperatura a los 20°.

6, 7, 8, 9 Bien - idem.

10 Comienza la avivación en buenas condiciones - se les da dos comidas.

11, - 12 Concluye la avivación - forman bien la hoja.

13, 14, 15 Siguen algo dirigidas.

16 - 17 Bien.

18, - 19 Comienzan a dormir.

Ejemplar microscopico { Habiendo examinado al microscopio algunos geranos
han presentado bastante corpusculos.

20, 21 Se dirigen bien - bastante verdes.

22, 23, 24 Mejoran de aspecto.

25, 26, 27 Siguen dirigidas.

28. 1ª Maza Dormen. 2ª Maza

2-3 Se dirigen bien.

4, 5, 6, 7 Siguen con aspecto bueno.

8, 9

Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º 4-

Nara japonesa = 3.ª reproducción = Cosechada en Real de Montroy
presentada por D. José Vilanova.

Examen microscópico = La semilla contiene algunos corpusculos

Día 3 feb.º Se remite á la crivacion á los 18.º temperatura.

4, 5, 6, 7. Temperatura 20.º

8, 9, 10, 11,

12-13, 14,

15, 16, 17,

18, 19, 20,

21, 22, 23


24, 25, 26

27, 28

1. Marzo. 2-

3, 4, 5, 6-

7, 8, 9.



Año 1869.

Cochran puerces.

Nº 5º

Nasa japonica = 1ª reproducción Cochada en Carcagente
Presentada por D. Ricardo de la Peña.

Examen microscópico. La muestra contiene algunos copresculos.

- Día 3 feb. Se somete a la ariación a los 18° temperatura
- 4 - 5 Aumento de temperatura a los 20°
- 6 Comienza la ariación con igualdad. Los gusanos presentan buen aspecto y toman bien la leña - se les da dos comidas.
- 7 Sigue la ariación - se les da tres comidas conservándolos a los 20°
- 8 Muestran todos en tomas la leña - sigue la ariación. = 21°
- 9-10, 11. Idem - idem.
- 12 - 13 Concluye la ariación - siguen bien.
- 14, 15, 16 Poco apetito y lentitud en los movimientos
- 17, 18, 19 Mueren algunos.
- 20 - Comienzan a dormir.
- Examen microscópico { Habiendo examinado al microscopio algunos gusanos
han presentado bastantes copresculos
21. Se dignifican con mal aspecto.
- 22, 23, 24. Mejoran de aspecto.
- 25, 26, 27. Siguen dignos.
28. 1.ª Mue. 2.ª Mue.
2. 3. Dapistan
- 4, 5, 6, 7. Siguen en aspecto bueno.
8. 9

Año 1867.

Cochas precoces.

N.º 7

Para americana procedente de Montevideo - Capullo blanco.
Presentada por D. Feliciano Lorenzo y Nieves.

Especimen microscopico = de aparcen corpunculos en la semilla.

Dia 3.º. Se somete a la avivacion a los 18.º temperatura

4. - 5. Temperatura 20.º

6. Comienza la avivacion con sigualdad. Los gusanos presentan buen
apeto y toman bien la hoja. Se les da dos comidas.

7. Siguen la avivacion. Se les da tres comidas, conservandolos a 20.º

8, 9, 10. Muestranse lentos en tomar la hojas. - 21.º

11. Concluye la avivacion. Siguen bien.

12, 13. Poco apeto. Lentitud en los movimientos.

14, 15, 16. Siguen bien, mejorando de apeto

17, 18. Comienzan a dormir

19. Durmen.

Especimen microscopico { Habiendo examinados al microscopio algunos gusanos
han presentado bastantes corpunculos

20, 21. Despiertan con apeto indistinto.

22, 23, 24. Mejoran mucho de apeto

25, 26, 27. Siguen bien.

28. 1.º Mar Siguen bien

2. - 3. - 4. Durmen 2.º turno

5, 6, 7, 8. Despiertan; Siguen bien.

9.

Año 1869.

Cochas precoces.

Nº 10.

Susa

Presentada por D.

Examen microscópico = No aparecen corpusculos en la semilla.

Día 3 febº	Se somete a la avivación a los 18° temperatura
4, 5, 6, 7	Temperatura 20°
8, 9, 10	Idem - idem
10.	Comienzan la avivación; aspecto sudoso - se les da dos comidas.
11, 12, 13	Segu la avivación con mucha lentitud. La semilla se muestra dura.
14, 15	Idem - idem
16.	Continúa la avivación. Mueren algunos. Aspecto sudoso.
17.	Mortalidad notable.
18, 19, 20, 21	Segu rápidamente la avivación, y mueren muchos al nacer.
22, 23, 24, 25	Idem - idem.
26, 27, 28	Mueren muchos, pero comienzan a sobrevivir algunos
1º marzo. 2	Idem - idem
3, 4, 5, 6	Idem - idem
7, 8.	Aspecto sudoso en los que sobreviven.

Año 1869.

Coschas precoces.

Nº 11.

Para

presentada por Don

Examen microscopico = No aparecen componentes en la muestra.

23 feb.	Se somete a la avivacion a los 18° temperaturas.
4, 5, 6, 7	Temperatura 20°.
8	Comienza la avivacion con buen aspecto. Se les da los comidos = 21°.
9, 10	Segue la avivacion con lentitud.
11	Concluye la avivacion.
12-13	Seguen con muy buen aspecto y apetito.
14, 15, 16	Muy bien.
17, 18, 19	Aspecto Induso.
20, 21, 22	Desarrollan el 1° sacno.
23.	Despertar. Juegan poco.
24, 25, 26	Seguen con aspecto Induso.
27-28	Desarrollan el 2° sacno.
1. Marzo 2	Mueren casi todos al despertar.
3, 4, 5, 6	Aspecto Induso.
7, 8, 9.	

Año 1869

Cosechas precoces.

N.º 17.

Harra japonesa, 1.ª reproducción cosechada en Valencia
presentada por el Gabinete microscópico

Epinema microscópico = Aspecto Induro a la semilla.

- Día 3 feb. Se somete a la avivación a los 18° temperatura
- 4, 5, 6, 7 Temperatura 20°
- 8, 9, 10, 11. Bien - bien
12. Se presentan algunos germinos
13. Concluye la avivación con aspecto Induro.
- 14, 15, 16. Mejoran dr. aspecto
- 17, 18, 19. Mueren algunos.
- 20, 21. Bien.
22. Desmenu el 1.º sueno
- 23, 24, 25. Despiertan. quedan pocos.
- 26, 27, 28. Siguen murriendo
- 1.º Marzo 2.º Comienzan a despertar los pocos que quedan
- 3.º L. Desmenu el 2.º sueno
- 5, 6, 7, 8. Despiertan
- 9.

Año 1869.

Corchas precoces.

N.º 20.

Maripagonesa - 1.ª reproducción - Corchada en Alberique
presentada por el Gabinete microscopico

Examen microscopico - No aparecen componentes en la nimitta

Día 3 feb. Se somete a la avisación a los 18° temperatura

1, 5, 6, 7. Temperatura 20°

8, 9, 10, 11. *Idea* *idem*

12, 13, 14, 15. *Idea* *idem*

16. Comienza la avisación. Aspecto Induso

17. Mueven algunos.

18, 19. Siguen moviendo al nacer.

Examen microscopico [Habiendo examinado al microscopio algunos juvenes
han presentado algunos componentes.

20, 21, 22 Siguen moviendo al nacer.

23, 24, 25 *Idea* *idem*

26, 27, 28 quedan muy pocos

1.º Marzo 2 Siguen moviendo al nacer

3, 4, 5, 6 *Idea* *idem*

7, 8, 9 *Idea* *idem*

Año 1869.

Cosubas preciosas.

N.º 21.

Hara paponera 3.ª reproducción Cosubada en Albiqub.
Presentada por Don _____

Examen microscópico. No aparecen organismos en la muestra.

Día 3 feb. Se somete a la avivación a los 18.º temperatros.

4, 5, 6, 7 4temperatura 20.º

8, 9, 20an ---- iban ----

10-11, Comienza la avivación. Se la da dos comidas.

12, 13, 14 Siguen con mucha actividad.

15, 16, 17, 20an.

18, 19, 20 Mueren algunos.

21, 22, 23 Desvallen. Mal aspecto.

24, 25, 26 Despiertan: mueren bastante.

27, 28 Siguen muriendo.

1.º Marzo 2 20an

3, 4, Desvallen el 2.º sueno

5, 6, 7, 8 Despiertan

9.

Año 1869

Conchas juveniles.

N.º 12

Nara japonesa 2.ª reproducción - Conchada en Durango
Presentada por Don

Examen microscopico. No aparecen copulaculos a la vista.

Día 3 feb. Se somete a la acivacion a los 18.º temperatura

4, 5, 6 Temperatura 20.º

7 Comienza la acivacion con buen aspecto - Se les da dos comidas.

8, 9, Siguen la acivacion - Suben bien a la huya - 21.º

10, 11, 12, Siguen con lentitud.

13, 14, 15 Bien. Aspecto bueno

16. Continúa acivacion

17 Lentitud en los movimientos.

18, 19, 20 Mueren algunos.

21, 22, 23 Bien.

24-25. Mueren.

26, 27, 28. Quedan pocos

1.º Marzo. 2 Comienzan a morir el 2.º día

3, 4. Despiertan

5, 6, 7, 8. Siguen bien

9. Mueren el 3.º día.

Año 1869

Cosechas precoces.

N.º 23.

Nara pygmaea

Presentada por Don

Examen microscopico = No aptum exponentes en la semilla

Día 3 feb. Se somete a la aviación a los 18° temperatura

4, 5, 6, 7 Temperatura 20°

8. Idem

9. Comienza la aviación con buen aspecto, se le da dos comidas.

10, 11, 12. Sigue con lentitud

13, 14, 15. Idem

16. Continúa con buen aspecto.

17, 18. Aspecto dudoso, lentitud en los movimientos.

19. Comienzan a dormir a las 11^{as} menos

20 - 21. Despiertan. Aspecto dudoso.

22, 23, 24. Idem. Muere.

25. quedan muy pocos con mal aspecto.

26 - 27. Despiertan. quedan pocos.

28. Despiertan

1. Marzo 2. Sigue bien

3, 4, 5, 6. Idem

7. Despiertan a las 3^{as} menos

8, 9. Despiertan algo desiguales.

Año 1869.

Casidas priores.

N.º 24.

Para japonesa 1.ª reproducción contada en la Uza de Valencia.
Presentada por Don

Epinae microscopio no aparecen copulantes en la semilla.

Día 3 feb. Se somete a la avivación a los 18.º temperatura

2, 5, 6, 7. Temperatura 20.º

8, 9. Idem idem.

10, 11. Comienza la avivación se le da dos comidas.

12, 13, 14. Siguen con boca abierta.

15, 16, 17. Siguen con actividad.

18, 19. Mueren algunos.

Epinae microscopio { Habiendo examinado al microscopio algunos juvenes
han presentado bastante copulantes.

20, 21. Siguen muriendo algunos.

22. Mueren el 1.º sueno

23, 24, 25. Despiertan con mal aspecto.

26, 27, 28. Mueren muchos.

1.ª Macra 2. Idem

3, 4. Comienzan a dormir el 2.º sueno

5, 6. Despiertan

7, 8, 9.

Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º 24.

Rara africana

presentada por Don Juan Coll.

Examen microscopico Aparecen bastantes copulantes en la muestra

- 3 feb. Se somete a la avivación a los 18° temperatura.
- 4, 5. Temperatura 20°.
- 6 Comienza la avivación con igualdad. Los gusanos presentan un aspecto imborable. Mucha vida. Toman muy bien la tupa de los comedas.
- 7 Sigue la avivación. Solo de los comedas.
- 8 Termina la avivación. Mucha rebenten con la bien.
- 9, 10. Siguen bien.
- 11, 12, 13. Bien.
14. Bien.
- 15 Comienza a el 1.º sueno. Buen aspecto.
16. Comienzan a despertar con buen aspecto. Todavía no comen.
- 17 Se libentan del 1.º sueno. Mortalidad notable.
- 18, 19. Siguen la mortalidad.

Examen microscopico { Habiendo examinado al microscopio algunos gusanos han presentado bastantes copulantes.

- 20, 21. Mejoran de aspecto los pocos que quedan.
- 22, 23, 24 Siguen bien.
25. Describen algunos el 1.º sueno.
- 26, 27, 28 Describen muchos y comienzan a despertar.
1. Marzo. Siguen bien.
- 3, 4, 5. Describen el 2.º sueno.
- 6, 7. Despiertan. Siguen muy bien.
- 8, 9.

Año 1869.

Contas proceses.

N.º 28.

Para Europa - Conchada en Mallorca
Presentada por D. Bernardo Albos.

Spamen Anomoeopus - No aparecen copresentes en la semilla.

Día 3^{ro} Se somete a la avivación a los 18° temperatura
4, 5, 6, 7 Temperatura 20°
8, 9, 10, 11 Bien bien
12, Bien
13 Comienza la avivación.
14, 15 Siguen bien
16 Concluye la avivación con buen aspecto
17 Siguen bien
18 Mueren algunos.
19 Comienzan a dormir - Sepulta Indura
20 Dormien
21 Comienzan a despertar
22, 23, 24 Mueren algunos
25, 26 Gradan poquitos.
27, 28 Dormien a 2.º mano.
1.º Mayo 2.º Despiertan
3, 4, 5, 6 Siguen bien
7, 8, 9

Año 1869.

Corchetes precoces.

N.º 30.

Rasa europea procedente de Cataluña

Presentada por D. Rafael Pascual.

Ejemplar sericeo cogido = No aparecen insectos en la muestra.

Día 8. feb. Se comen a la cría a los 18° temperatura

9, 10, 11, temperatura 20°

12, 13, 14,

15, 16, 17,

18, 19, 20

21, 22, 23


24, 25, 26

27, 28.

1. Marzo 2

3, 4, 5, 6

7, 8, 9



Año 1869.

Coruba. puerces.

Nº 32.

Sera japonesa - 2ª reproducción Corubada en Oliva
Presentada por D. Rafael Pascual

Esperma. microscopica = *Aparecen bastante copiosos en la hembra.*

Día 8 feb. Se somete a la acivación a los 18° temperatura

9, 10, 11. Temperatura 20°

12. *Idem*

13. Comienza la acivación con lentitud.

14, 15, 16 Sigue la acivación murmurando algunos peces.

17, 18, 19 Siguen murmurando al agua.

20, 21, 22 *Idem*


23, 24, 25 *Idem*

26, 27, 28 *Idem*

1.º Marzo 2º *Idem*

3. 4. 5. 6º *Idem*

7. 8. 9.



Año 1889.

Cosubas precoces.

N.º 53.

Nasa pygmaea - 1.ª reproducción - sembrada en Caracazúte
Presentada por Don Rosendo Pastor.

Examen microscópico - No aparecen corpúsculos en la semilla.

Día 10 feb.º Se somete a la incubación a los 18.º temperatura

11, 12. Temperatura 20.º

13-14, 15, 16 Nacen algunos gusanos

17, 18 19, 20 Aspecto hedoroso; lentitud en los movimientos. Mueven algunos

21, 22, 23 Mucha lentitud y mueven algunos sin tomar la legía


24, 25 - Bólen.

26-27, 28 Primer silencio - Mueven muchos

1.º Marzo 2.º Despiertan con mal aspecto

3, 4, 5, 6, 7. Seguen hedorosos.

8, 9.



Año 1869.

Corubas precoces.

N.º 55

Para pponer a 1.ª reproducción - Corubada en Caracazante
presentada por D. José Crespi

Especimen microscopico - No aparecen corpúsculos en la muestra.

Día 10 feb.º	Se somete a la vivación a los 18.º temperatura
11, 12, 13	Temperatura 20.º
14 - 15	Nacen algunos gusanos
16, 17, 18.	Aspecto induso.
19, 20, 21.	Mueren algunos sin tomar la tuya
22, 23, 24	Muere
25, 26, 27	Muere
28	Muere
1.º Marzo 2.º	Muere
3, 4, 5.	sobreviven algunos
6, 7, 8	Seguen indusos
9	Comienzan a dormir el 1.º silencio

Año 1869.

Cosechas precoces.

N.º L.º.

Pasa europea de apurillo amarrillo - cosechada en Cataluña.

Presentada por D.ª Dolores Ferrer.

Examen minor coprio = No aparecen coprecitos en la muestra

Dia 13 feb. Se somete a la ariación a los 18.º temperatura

14, 15, 16, 17 Temperatura 20.º

18, 19. 20. Blau

21, 22, 23. Blau


24, 25, 26. Blau

27, 28. Blau

1.º Marzo 2.º Blau

3.º 4.º 5.º 6.º Blau

7.º 8.º 9.º Comienza bien la ariación.



Año 1869.

Concha precoces.

N.º 41.

Mara europea de capullo amarillo - Cochada en el lago de Izón.
Presentada por Don Francisco Lypin.

Examen microscópico = No aparecen conchuntos a la micula.

Día 13 feb. Se comete a la cría a los 18. Temperatura

14, 15, 16, 17 Temperatura 20.º

18, 19, 20, 21. Idem


22, 23, 24, 25 Idem

26, 27, 28 Idem

1.º Marzo - 2.º Idem

3.º 4.º 5.º 6.º Idem

7.º 8.º 9.º Comienza bien la cría



Año 1869.

Cosubia, precoces.

N.º 42

Raza japonesa - 3.ª reproducción - Criada en Carlet.

Presentada por D. Carlos Cervera.

Examen microscópico = No aparecen conjunciones en la semilla

Día 13 feb. Se somete a la crivación a los 18.º temperatura

14, 15, 16, 17 Temperatura 20.º

18, 19, 20, 21. Idem


22, 23. Comienzan a nacer

24, 25, 26 Mueren algunos sin tomar la hoja.

27 - 28. Siguen bien

1.º Marzo 2. Idem

3. 4. 5. 6. Idem



Año 1869.

Cosechas precoces.

n.º 23.

Naca pyrenaica

Cosechada en Cardet

presentada por D. Carlos Corvera

Epimen. univ. egyptio.

Día 13 feb.º Se anota á la avivación á los 18.º temperatura

14, 15, 16, 17 Temperatura 20.º

18, 19, 20, 21. Eten


22. 23. Nacen algunos

24, 25, 26 Mueren algunos sin tomar la coza

27. 28. Siguen bien

1.º Marzo. 2.º Eten

3. 4. 5. 6.



Año 1867.


Cerebas precoces.

N.º 14.

Nara europea de capullo amarillo cosechada en Cataluña
presentada por D. José Puje.

Examen microscópico =

Día 17 feb.	Se somete a la vivación a los 18.º temperatura
18, 19, 20, 21.	Temperatura 20.º
22, 23, 24	Idem
25, 26, 27	Idem.
28	Idem
1.º Marzo 2.	Idem
3, 4, 5, 6, 7	Idem
8, 9	Comienza la avivación



Año 1869.


Cochas precisas.

N.º 45.

Parapionera 3ª reproducción - Cochada en Valencia
Presentada por D. José Mayo

Examen microscopico=

- Die 17 feb. Se somete a la avivacion a los 18° temperatura a.
18, 19, 20 Temperatura 20°
21. - 22. ~~Idem~~
23 - Mueren algunos
24, 25. Mueren algunos sintiéndose la cocha.
26, 27, 28. Mejoran
1.º Marzo 2.º Siguen bien
2, 4, 5, 6, 7 Siguen muy bien la avivacion
8, 9.



1869

C-178

I. Agricultura n. 4

1869

Guano de Leda

