ANEJO Nº3 FLORA Y FAUNA

ANEJO Nº3.1 LISTADO FLORA Y FAUNA

LISTADO FAUNA Nº1: CREVILLENT

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Acanthocinus griseus			
Acrocephalus arundinaceus	Busquerot	Carricero tordal	
Acrocephalus melanopogon *	Xitxarra bigotuda	Carricerín real	
Acrocephalus schoenobaenus	Xitxarra dels joncs	Carricerín común	
Acrocephalus scirpaceus	Xitxarra de canyar	Carricero común	
Aegithalos caudatus	Senyoreta	Mito común	
Alectoris rufa	Perdiu	Perdiz roja	
Anas strepera	Ascle	Ánade friso	
Anax parthenope			
Anguilla anguilla	Anguila	Anguila	
Aphanius iberus *	Fartet	Fartet	
Apus apus	Falcia	Vencejo común	
Aquila fasciata * **	Aguila de panxa blanca	Águila-azor perdicera	
Ardea purpurea *	Agró roig	Garza imperial	
Ardeola ralloides *	Oroval	Garcilla cangrejera	
Arvicola sapidus	Talpó d´aigua	Rata de agua	
Athene noctua	Mussol comú	Mochuelo europeo	
Aythya ferina	Boix	Porrón europeo	
Aythya fuligula	Morell capellut	Porrón moñudo	
Brachythemis impartita			
Bubo bubo *	Brúfol, duc	Búho real	
Burhinus oedicnemus *	Torlit, alcaravà	Alcaraván común	
Carduelis carduelis	Cadernera, cagarnera	Jilguero europeo	
Carduelis chloris	Verderol	Verderón común	
Charadrius alexandrinus *	Corriol camanegre	Chorlitejo patinegro	
Charadrius dubius	Corriolet	Chorlitejo chico	
Cisticola juncidis	Trist	Cisticola buitrón	
Columba livia	Colom roquer	Paloma bravía	
Columba palumbus	Todó	Paloma torcaz	
Coracias garrulus *	Cavaller	Carraca europea	
Coronella girondica	Serp llisa meridional	Culebra lisa meridional	
Corvus monedula	Gralla	Grajilla	
Crocothemis erythraea			
Cuculus canorus	Cucut	Cuco común	
Cyprinus carpio	Carpa	Carpa	
Dactylopius opuntiae			
Delichon urbicum	Oroneta cuablanca, oronell	Avión común	
Emberiza calandra	Cruixidell	Triguero	
Emberiza cirlus	Sit golanegre	Escribano soteño	
Eobania vermiculata			
Epidalea calamita			
≡ *Bufo calamita*			
Falco tinnunculus	Soliguer	Cernícalo vulgar	
Fulica atra	Fotja	Focha común	
Galerida cristata	Cogullada vulgar	Cogujada común	

Gallinula chloropus	Polla d'aigua	Gallineta común
Gambusia holbrooki	Gambúsia	Gambusia
Genetta genetta	Geneta	Gineta
Glareola pratincola *	Carregada	Canastera común
Hemianax ephippiger		
Hemorrhois hippocrepis	Serp teuladina	Culebra de herradura
Himantopus himantopus *	Camallonga	Cigüeñuela común
Hirundo daurica	Oroneta cua-rogenca	Golondrina dáurica
Hirundo rustica	Oroneta	Golondrina común
Hypophloeus pini		
Ips sexdentatus		
Ischnura elegans		
Ischnura graellsii		
Lanius meridionalis	Capsot botxí	Alcaudón real
Lanius senator	Capsot	Alcaudón común
Larus melanocephalus *	Gavina capnegra	Gaviota cabecinegra
Larus ridibundus	Gavina comuna	Gaviota reidora
Leonia mamillaris		
Lepus granatensis	Llebre	Liebre ibérica
Lophophanes cristatus	Capellanet de cresta	Herrerillo capuchino
Luscinia megarhynchos	Rossinyol	Ruiseñor común
Malpolon monspessulanus	Serp verda	Culebra bastarda
Marmaronetta angustirostris *	Rosseta	Cerceta pardilla

Mauremys leprosa *	Tortuga d'aigua ibèrica	Galápago leproso
Merops apiaster	Abellerol	Abejaruco europeo
Monticola solitarius	Merla blava, solitari	Roquero solitario
Muscicapa striata	Papamosques gris, mastegatatxets	Papamoscas gris
Oenanthe leucura *	Còlbia negra	Collalba negra
Oriolus oriolus	Oriol	Oropéndola europea
Orthetrum cancellatum		
Orthetrum trinacria		
Orthotomicus erosus		
Oryctolagus cuniculus	Conill	Conejo
Otala punctata		
Oxypleurus nodieri		
Oxyura leucocephala *	Anec capblanc	Malvasía cabeciblanca
Panurus biarmicus *	Xauet mostatxut Serenet	Bigotudo
Parus major	Totestiu	Carbonero común
Passer domesticus	Teuladí	Gorrión común
Pelophylax perezi	Granota verda	Rana común
Petronia petronia	Pardal roquer	Gorrión chillón
Pica pica	Blanca	Urraca
Picus viridis	Picot verd	Pito real
Pityogenes calcaratus		
Plecotus austriacus	Rata penada orelluda meridional	Orejudo gris
Podarcis hispanica	Sargantana ibèrica	Lagartija ibérica

Podiceps cristatus	Cabrellot	Somormujo lavanco
Pomatoschistus microps	Gobi d´arena	Cabuxino enano
Psammodromus edwarsianus	Sargantana cendrosa	Lagartija cenicienta
Pseudotachea splendida		
Ptinus fur		
Ptyonoprogne rupestris	Roquer	Avión roquero
Pyrrhocorax pyrrhocorax *	Gralla de bec roig	Chova piquirroja
Rattus norvegicus	Rata comuna	Rata parda
Rhinolophus ferrumequinum *	Rata penada de ferradura gran	Murciélago grande de herradura
Rhizophagus depressus		
Rhynchophorus ferrugineus		Picudo rojo
Rhyzobius chrysomeloides		
Riparia riparia *	Parpalló	Avión zapador
Scobicia chevrieri		
Serinus serinus	Gafarró	Verdecillo
Sinoxylon sexdentatum		
Sirex noctilio		
Sterna hirundo *	Xatrac d'albufera	Charrán común
Sternula albifrons *	Mongeta	Charrancito común
Streptopelia decaocto	Tórtora turca	Tórtola turca
Streptopelia turtur	Tórtora	Tórtola europea

≡ *Galium valentinum var. idubedae*
≡ *Galium pusillum ssp. idubedae*
– *Galium hypnoides*

Strix aluco	Gamarús	Cárabo común
Sturnus unicolor	Estornell negre	Estornino negro
Suncus etruscus	Musaranya nana	Musgaño enano
Sylvia melanocephala	Busquereta capnegra	Curruca cabecinegra
Tachybaptus ruficollis	Escabussonet	Zampullín común
Tadorna tadorna	Ánec blanc, tadorna	Tarro blanco
Theba pisana		
Tomicus destruens		
Triturus pygmaeus	Tritó pigmeu	Tritón pigmeo
Tropidothorax sternalis		
Turdus merula	Merla	Mirlo común
Upupa epops	Puput, palput	Abubilla
Vulpes vulpes	Rabosa	Zorro rojo
Xerotricha huidobroi		
Xyleborinus saxesenii		

** especies prioritarias*

*** especies restringidas*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

LISTADO FAUNA Nº2: SAN ISIDRO

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Aeshna isoceles			
Aeshna mixta			
Anax imperator			
Anax parthenope			
Crocothemis erythraea			
Enoplognatha mandibularis			
Glareola pratincola *	Carregada	Canastera común	
Ischnura elegans			
Orthetrum cancellatum			
Orthetrum coerulescens			
Orthetrum trinacria			
Sympetrum fonscolombii			
Sympetrum striolatum			

** especies prioritarias* *nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)*

*** especies restringidas*

LISTADO FAUNA Nº3: ALBATERA

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Agapanthia annularis			
Agapanthia cardui			
Alectoris rufa	Perdiu	Perdiz roja	
Anisoplia baetica			
Anoxia australis			
Anthaxia parallela			
Anthaxia scutellaris			
Anthoplia floricola			
Apus apus	Falcia	Vencejo común	
Aquila chrysaetos *	Àguila reial	Águila real	
Aquila fasciata * **	Aguila de panxa blanca	Águila-azor perdicera	
Athene noctua	Mussol comú	Mochuelo europeo	
Bucanetes githagineus *	Pinsà trompeter	Camachuelo trompetero	
Burhinus oedicnemus *	Torlit, alcaravà	Alcaraván común	
Camponotus barbaricus			
Carduelis cannabina	Paserell	Pardillo común	
Carduelis carduelis	Cadernera, cagarnera	Jilguero europeo	
Carduelis chloris	Verderol	Verderón común	
Chrysolina americana			
Cisticola juncidis	Trist	Cisticola buitrón	
Cuculus canorus	Cucut	Cuco común	

Delichon urbicum	Oroneta cuablanca, oronell	Avión común
Falco tinnunculus	Soliguer	Cernícalo vulgar
Galerida cristata	Cogullada vulgar	Cogujada común
Galerida theklae *	Cogullada fosca	Cogujada montesina
Hirundo daurica	Oroneta cua-rogenca	Golondrina dáurica
Hirundo rustica	Oroneta	Golondrina común
Lanius meridionalis	Capsot botxí	Alcaudón real
Lanius senator	Capsot	Alcaudón común
Leonia mamillaris		
Lepus granatensis	Llebre	Liebre ibérica
Luscinia megarhynchos	Rossinyol	Ruiseñor común
Malpolon monspessulanus	Serp verda	Culebra bastarda
Merops apiaster	Abellerol	Abejaruco europeo
Motacilla alba	Cueta blanca	Lavandera blanca
Oryctolagus cuniculus	Conill	Conejo
Otala punctata		
Oxythyrea funesta		
Paratriodonta alicantina		
Parus major	Totestiu	Carbonero común
Passer domesticus	Teuladí	Gorrión común
Passer montanus	Teuladí morisc	Gorrión molinero
Pica pica	Blanca	Urraca
Plagionotus bobelayei		
Protaetia cuprea		
Protaetia oblonga		
Rumina decollata		
Scaurus punctatus		
Serinus serinus	Gafarró	Verdecillo
Stegodyphus lineatus		
Streptopelia decaocto	Tórtora turca	Tórtola turca
Streptopelia turtur	Tórtora	Tórtola europea
≡ *Galium valentinum var. idubedae* ≡ *Galium pusillum ssp. idubedae* – *Galium hypnoides*		
Sturnus unicolor	Estornell negre	Estornino negro
Sus scrofa	Porc senglar	Jabalí
Sylvia melanocephala	Busquereta capnegra	Curruca cabecinegra
Sylvia undata *	Busquereta cuallarga	Curruca rabilarga
Thyreonotus corsicus		
Timon lepidus	Fardatxo	Lagarto ocelado
Turdus merula	Merla	Mirlo común
Upupa epops	Puput, palput	Abubilla
Vulpes vulpes	Rabosa	Zorro rojo

** especies prioritarias*

*** especies restringidas*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

LISTADO FAUNA Nº4: GRANJA DE ROCAMORA

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Burhinus oedicnemus *	Torlit, alcaravà	Alcaraván común	
Carduelis chloris	Verderol	Verderón común	
Cisticola juncidis	Trist	Cisticola buitrón	
Coracias garrulus *	Cavaller	Carraca europea	
Corvus monedula	Gralla	Grajilla	
Coturnix coturnix	Guatla	Codorniz común	
Falco tinnunculus	Soliguer	Cernícalo vulgar	
Galerida cristata	Cogullada vulgar	Cogujada común	
Hirundo rustica	Oroneta	Golondrina común	
Lanius meridionalis	Capsot botxí	Alcaudón real	
Oxythyrea funesta			
Passer domesticus	Teuladí	Gorrión común	
Picus viridis	Picot verd	Pito real	
Serinus serinus	Gafarró	Verdecillo	
Sturnus unicolor	Estornell negre	Estornino negro	
Sylvia melanocephala	Busquereta capnegra	Curruca cabecinegra	
Turdus merula	Merla	Mirlo común	
Upupa epops	Puput, palput	Abubilla	

** especies prioritarias* *nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)*

*** especies restringidas*

LISTADO FAUNA Nº5: COX

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Alectoris rufa	Perdiu	Perdiz roja	
Apus apus	Falcia	Vencejo común	
Carduelis carduelis	Cadernera, cagarnera	Jilguero europeo	
Carduelis chloris	Verderol	Verderón común	
Cisticola juncidis	Trist	Cisticola buitrón	
Delichon urbicum	Oroneta cuablanca, oronell	Avión común	
Eidmannella pallida			
Emberiza calandra	Cruixidell	Triguero	
Enoplognatha quadripunctata			
Eptesicus serotinus	Rata penada d´horta	Murciélago hortelano	
Falco tinnunculus	Soliguer	Cernícalo vulgar	
Galerida cristata	Cogullada vulgar	Cogujada común	
Hippolais polyglotta	Bosqueta vulgar	Zarcero políglota	
Hirundo rustica	Oroneta	Golondrina común	
Lanius meridionalis	Capsot botxí	Alcaudón real	
Loxosceles rufescens			
Myotis blythii *	Rata penada de morro agut	Murciélago ratonero mediano	
Myotis escalerai	Rata penada ibérica	Murciélago ratonero ibérico	
Myotis myotis *	Rata penada de morro gran	Murciélago ratonero grande	
Oryctolagus cuniculus	Conill	Conejo	
Passer domesticus	Teuladí	Gorrión común	

Phasianus colchicus	Faisà	Faisán vulgar
Picus viridis	Picot verd	Pito real
Pyrrhocorax pyrrhocorax *	Gralla de bec roig	Chova piquirroja
Rhinolophus ferrumequinum *	Rata penada de ferradura gran	Murciélago grande de herradura
Sepedophilus cavicola		
Serinus serinus	Gafarró	Verdecillo
Stegodyphus lineatus		
Streptopelia decaocto	Tórtora turca	Tórtola turca
Sylvia melanocephala	Busquereta capnegra	Curruca cabecinegra
Tadarida teniotis	Rata penada de cua llarga	Murciélago rabudo
Tropidothorax sternalis		
Turdus merula	Merla	Mirlo común
Upupa epops	Puput, palput	Abubilla

** especies prioritarias*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

*** especies restringidas*

LISTADO FAUNA Nº6: REDOVÁN

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Aegithalos caudatus	Senyoreta	Mito común	
Aquila fasciata * **	Aguila de panxa blanca	Águila-azor perdicera	
Cisticola juncidis	Trist	Cisticola buitrón	
Dactylopius opuntiae			
Delichon urbicum	Oroneta cuablanca, oronell	Avión común	
Hirundo rustica	Oroneta	Golondrina común	
Parus major	Totestiu	Carbonero común	
Passer domesticus	Teuladí	Gorrión común	
Serinus serinus	Gafarró	Verdecillo	
Sylvia melanocephala	Busquereta capnegra	Curruca cabecinegra	

** especies prioritarias*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

*** especies restringidas*

LISTADO FAUNA Nº7: CALLOSA DE SEGURA

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Aegithalos caudatus	Senyoreta	Mito común	
Alectoris rufa	Perdiu	Perdiz roja	
Anas platyrhynchos	Collverd	Ánade azulón	
Apus apus	Falcia	Vencejo común	
Athene noctua	Mussol comú	Mochuelo europeo	
Bubulcus ibis	Esplugabous	Garcilla bueyera	
Burhinus oedicnemus *	Torlit, alcaravà	Alcaraván común	
Carduelis carduelis	Cadernera, cagarnera	Jilguero europeo	
Carduelis chloris	Verderol	Verderón común	
Cisticola juncidis	Trist	Cisticola buitrón	
Columba palumbus	Todó	Paloma torcaz	
Coracias garrulus *	Cavaller	Carraca europea	
Corvus monedula	Gralla	Grajilla	
Coturnix coturnix	Guatla	Codorniz común	
Dactylopius opuntiae			
Emberiza calandra	Cruixidell	Triguero	
Emberiza cirlus	Sit golanegre	Escribano soteño	
Falco tinnunculus	Soliguer	Cernícalo vulgar	
Galerida cristata	Cogullada vulgar	Cogujada común	
Gallinula chloropus	Polla d'aigua	Gallineta común	
Hirundo daurica	Oroneta cua-rogenca	Golondrina dáurica	
Hirundo rustica	Oroneta	Golondrina común	
Lanius meridionalis	Capsot botxí	Alcaudón real	
Larus ridibundus	Gavina comuna	Gaviota reidora	
Luscinia megarhynchos	Rossinyol	Ruiseñor común	
Muscicapa striata	Papamosques gris, mastegatatxets	Papamoscas gris	
Oryctolagus cuniculus	Conill	Conejo	
Parus major	Totestiu	Carbonero común	
Passer domesticus	Teuladí	Gorrión común	
Passer montanus	Teuladí morisc	Gorrión molinero	
Pica pica	Blanca	Urraca	
Serinus serinus	Gafarró	Verdecillo	
Streptopelia decaocto	Tórtora turca	Tórtola turca	
Sturnus unicolor	Estornell negre	Estornino negro	
Sylvia melanocephala	Busquereta capnegra	Curruca cabecinegra	
Turdus merula	Merla	Mirlo común	
Upupa epops	Puput, palput	Abubilla	

** especies prioritarias*

*** especies restringidas*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

LISTADO FAUNA Nº8: ORIHUELA

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Accipiter gentilis	Astor	Azor común	
Accipiter nisus	Esparver	Gavilán común	
Aedes albopictus		Mosquito tigre	
Aeshna isoceles			
Alburnus alburnus	Albor	Alburno	
Alectoris rufa	Perdiu	Perdiz roja	
Amara aenea			
Amara simplex			
Ameles spallanzania			
Anax imperator			
Anax parthenope			
Anguilla anguilla	Anguila	Anguila	
Anthaxia parallela			
Anthaxia rugicollis			
Aphanius iberus *	Fartet	Fartet	
Apis mellifera			
Apodemus sylvaticus	Ratolí de bosc	Ratón de campo	
Aporrectodea molleri			
Aporrectodea rosea			
Aporrectodea trapezoides			
Apus apus	Falcia	Vencejo común	
Aquila chrysaetos *	Àguila reial	Águila real	
Aquila fasciata * **	Aguila de panxa blanca	Águila-azor perdicera	
Ardeola ralloides *	Oroval	Garcilla cangrejera	
Arvicola sapidus	Talpó d´aigua	Rata de agua	
Asida ricoi			
Asio otus	Duc petit	Búho chico	
Barbus sclateri	Barb del Segura	Barbo gitano	
Blanus cinereus	Serpeta cega	Culebrilla ciega	
Bubo bubo *	Brúfol, duc	Búho real	
Bubulcus ibis	Esplugabous	Garcilla bueyera	
Bucanetes githagineus *	Pinsà trompeter	Camachuelo trompetero	
Bufo spinosus			
≡ *Bufo bufo*			
Burhinus oedicnemus *	Torlit, alcaravà	Alcaraván común	
Buteo buteo	Aguilot comú	Busardo ratonero	
Carduelis carduelis	Cadernera, cagarnera	Jilguero europeo	
Carduelis chloris	Verderol	Verderón común	
Cecilioides eucharista			
Cercion lindenii			
Ceriagrion tenellum			
Chaetoptelius vestitus			
Charadrius alexandrinus *	Corriol camanegre	Chorlitejo patinegro	
Chrysolina americana			
Circaetus gallicus *	Àguila serpera	Culebrera europea	

Coenagrion scitulum		
Corbicula fluminea		Almeja asiática
Crocothemis erythraea		
Cryptolestes ferrugineus		
Crypturgus mediterraneus		
Cyanopica cooki		Rabilargo
Cyprinus carpio	Carpa	Carpa
Dactylopius opuntiae		
Dendropoma petraeum *	Vermètid	Vermétido
≡ *Dendropoma lebeche*		
Eliomys quercinus	Rata cellarda	Lirón careto
Emberiza cirlus	Sit golanegre	Escribano soteño
Empusa pennata		
Enallagma cyathigerum		
Erythromma viridulum		
Falco peregrinus *	Falcó pelegrí	Halcón peregrino
Falco tinnunculus	Soliguer	Cernícalo vulgar
Felis silvestris	Gat salvatge	Gato montés europeo
Galerida cristata	Cogullada vulgar	Cogujada común
Galerida theklae *	Cogullada fosca	Cogujada montesina
Gambusia holbrooki	Gambúsia	Gambusia
Genetta genetta	Geneta	Gineta
Harpalus aesculanus		
Heliopathes morandi		

Hemianax ephippiger		
Hieraaetus pennatus *	Àguila calçada	Aguililla calzada
Himantopus himantopus *	Camallonga	Cigüeñuela común
Hirundo daurica	Oroneta cua-rogenca	Golondrina dáurica
Hirundo rustica	Oroneta	Golondrina común
Hylastes ater		
Hypophloeus pini		
Hypsosinga pygmaea		
Ischnura elegans		
Ischnura graellsii		
Lanius meridionalis	Capsot botxí	Alcaudón real
Lanius senator	Capsot	Alcaudón común
Latrodectus lilianae		
Leonia mamillaris		
Lepus granatensis	Llebre	Liebre ibérica
Liza ramada	Sama	Capitón
Luscinia megarhynchos	Rossinyol	Ruiseñor común
Lutra lutra *	Llúdria	Nútria paleártica
Malpolon monspessulanus	Serp verda	Culebra bastarda
Mauremys leprosa *	Tortuga d'aigua ibèrica	Galápago leproso
Meles meles	Teixó	Tejón
Merops apiaster	Abellerol	Abejaruco europeo
Microlestes abeillei		

Microscolex phosphoreus		
Monticola solitarius	Merla blava, solitari	Roquero solitario
Motacilla alba	Cueta blanca	Lavandera blanca
Mustela nivalis	Mostela	Comadreja
Nemesia dorthesi		
Octodrilus complanatus		
Oenanthe leucura *	Còlbia negra	Collalba negra
Ophonus cordatus		
Orthetrum brunneum		
Orthetrum cancellatum		
Orthetrum chrysostigma		
Orthetrum coerulescens		
Orthetrum trinacria		
Orthotomicus erosus		
Oryctolagus cuniculus	Conill	Conejo
Otala punctata		
Oxypleurus nodieri		
Parus major	Totestiu	Carbonero común
Passer domesticus	Teuladí	Gorrión común
Passer montanus	Teuladí morisc	Gorrión molinero
Pelophylax perezi	Granota verda	Rana común
Phylloneta sisyphia		
Pityophagus laevior		

Pogonocherus perroudi		
Pomatias elegans		
Psammodromus algirus	Sargantana cuallarga	Lagartija colilarga
Ptinus bidens		
Ptyonoprogne rupestris	Roquer	Avión roquero
Pyrrhocorax pyrrhocorax *	Gralla de bec roig	Chova piquirroja
Rhinechis scalaris	Serp blanca	Culebra de escalera
Riparia riparia *	Parpalló	Avión zapador
Rivetina baetica		
Rumina decollata		
Saxicola torquatus	Bitxà comú	Tarabilla común
≡ *Saxicola rubicola*		
Sciurus vulgaris	Esquirol, farda	Ardilla roja
Scyphophorus acupunctatus		Picudo del Ágave
Selysiothemis nigra		
Serinus serinus	Gafarró	Verdecillo
Sinoxylon sexdentatum		
Sterna hirundo *	Xatrac d'albufera	Charrán común
Sternula albifrons *	Mongeta	Charrancito común
Streptopelia decaocto	Tórtora turca	Tórtola turca
Streptopelia turtur	Tórtora	Tórtola europea
≡ *Galium valentinum var. idubedae* ≡ *Galium pusillum ssp. idubedae* – *Galium hypnoides*		
Sturnus unicolor	Estornell negre	Estornino negro
Sus scrofa	Porc senglar	Jabalí

Sylvia melanocephala	Busquereta capnegra	Curruca cabecinegra
Sympetrum fonscolombii		
Sympetrum striolatum		
Thanasimus formicarius		
Timon lepidus	Fardatxo	Lagarto ocelado
Tomicus destruens		
Trithemis annulata		
Trithemis kirbyi		
Tudorella sulcata *		
Turdus merula	Merla	Mirlo común
Ummidia aedificatoria		
Upupa epops	Puput, palput	Abubilla
Vesperus xatarti		
Vulpes vulpes	Rabosa	Zorro rojo
Xerocrassa derogata		
Xerotricha huidobroi		
Zodarion affine		

** especies prioritarias*

*** especies restringidas*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

LISTADO FLORA Nº1: CREVILLENT

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Acaulon dertosense			
Adonis microcarpa – *Adonis dentata*			
Aegilops geniculata – *Aegilops ovata*	Blat bord	Rompesacos	
Aeluropus littoralis ≡ *Poa littoralis* = *Poa maritima*			
Aeonium arboreum ≡ *Sempervivum arboreum*			
Agave americana	Pitera	Agave	
Aizoon hispanicum			
Ajuga iva ≡ *Teucrium iva*			
Aloina aloides			
Aloina ambigua			
Amaranthus albus			
Amaranthus muricatus ≡ *Euxolus muricatus*	Amarant muricat	Bledo	
Amaranthus retroflexus = *Amaranthus delilei*	Blet punxoset	Bledo	
Anacyclus clavatus ≡ *Anthemis clavata*	Panigroc	Manzanilla de los campos	
Anacyclus valentinus	Panigroc valencià	Manzanilla valenciana	
Anagallis arvensis ssp. arvensis = *Anagallis arvensis ssp. phoenicea* = *Anagallis arvensis ssp. latifolia* = *Anagallis arvensis ssp. parviflora*			
Anarrhinum fruticosum *	Anarrí fruticós	Anarrino fruticoso	
Andryala integrifolia	Herba blanca	Cerraja lanuda	

Andryala ragusina		
= *Andryala lyrata*		
Anethum graveolens		
Anthyllis cytisoides	Albaida	Albaida
Anthyllis terniflora	Albada	Albaida fina
≡ *Genista terniflora* ≡ *Anthyllis cytisoides ssp. terniflora* ≡ *Anthyllis cytisoides var. lagascana* = *Anthyllis genistae*		
Anthyllis x media		
Apium graveolens		
Apium nodiflorum	Api de séquia	Apio bastardo
≡ *Sium nodiflorum* ≡ *Helosciadium nodiflorum*		
Aptenia cordifolia		
≡ *Mesembryanthemum cordifolium*		
Apteranthes munbyana ssp. hispanica *		Chumberillo de lobo
≡ *Boucerosia munbyana var. hispanica* ≡ *Caralluma munbyana ssp. hispanica* ≡ *Boucerosia hispanica*		
Arbutus unedo	Arbocer	Madroño
Arenaria leptoclados		
≡ *Arenaria serpyllifolia var. leptoclados* ≡ *Arenaria serpyllifolia ssp. leptoclados* = *Arenaria minutiflora* = *Arenaria serpyllifolia ssp. tenuior* = *Arenaria leptoclados ssp. minutiflora*		
Arenaria montana ssp. intricata	Herba pixadora	Arenaria
≡ *Arenaria montana var. intricata* ≡ *Arenaria intricata* = *Arenaria segobricensis* = *Arenaria montana ssp. linearifolia*		
Argyrolobium uniflorum *		
≡ *Cytisus uniflorus*		
Aristolochia pistolochia		
Artemisia barrelieri	Botja de saladar	Ontina
Artemisia campestris ssp. glutinosa		
≡ *Artemisia glutinosa* = *Artemisia variabilis*		

Artemisia herba-alba		
Artemisia herba-alba ssp. valentina		
≡ *Artemisia valentina* = *Artemisia herba-alba var. glabrescens*		
Arthrocnemum macrostachyum		
≡ *Salicornia macrostachya* = *Arthrocnemum glaucum* – *Salicornia glauca*		
Arundo donax	Canya	Caña
– *Arundo mauritanica*		
Asparagus acutifolius	Esparraguera	Esparraguera silvestre
Asparagus albus		
Asparagus horridus	Esparreguera de menjar	Esparraguera
= *Asparagus stipularis*		
Asperula aristata ssp. scabra	Herba prima	Asperilla de flor roja
≡ *Asperula aristata var. scabra*		
Asphodelus cerasiferus		
– *Asphodelus albus* – *Asphodelus ramosus*		
Asphodelus fistulosus	Gamonet	Gamoncillo
Asphodelus fistulosus ssp. fistulosus		
Aster sedifolius		
≡ *Galatella sedifolia* = *Galatella punctata* = *Aster hyssopifolius*		
Aster squamatus	Àster americà	Rama negra
≡ *Conyza squamata* ≡ *Symphyotrichum squamatum*		
Aster tripolium ssp. pannonicus		
≡ *Aster pannonicus* ≡ *Tripolium pannonicum* = *Aster longicaulis*		
Asteriscus aquaticus		
≡ *Buphtalmum aquaticum* – *Asteriscus aquaticus ssp. pygmaeus*		
Asteriscus maritimus		
≡ *Buphtalmum maritimum*		

Asteriscus spinosus		
≡ *Buphtalmum spinosum*		
≡ *Pallenis spinosa*		
Asterolinon linum-stellatum	Lli estelat	Lino de lagartijas
≡ *Lysimachia linum-stellatum*		
= *Asterolinon stellatum*		
Astragalus hispanicus	Botja rosada	Astrágalo hispanico
= *Astragalus hegelmaieri*		
– *Astragalus onobrychis*		
Astragalus incanus		
Astragalus monspessulanus ssp. gypsophilus		
= *Astragalus teresianus*		
= *Astragalus chlorocyaneus*		
= *Astragalus monspessulanus ssp. chlorocyaneus*		
= *Astragalus monspessulanus ssp. canescens*		
= *Astragalus monspessulanus ssp. teresianus*		
Atractylis cancellata		
Atractylis humilis	Card hereu	Cardo heredero
≡ *Erigeron canadensis*		
Atriplex glauca		
Atriplex halimus		
= *Atriplex serrulata*		
Atriplex prostrata		
– *Atriplex hastata*		
Atriplex rosea		
Atriplex suberecta		
Avena barbata ssp. barbata		
Avena barbata ssp. hirtula		
≡ *Avena hirtula*		
Avena barbata ssp. wiestii		
≡ *Avena wiestii*		
Ballota hirsuta	Marrubi hirsut	Flor rubí
≡ *Echeandia hirsuta*		
≡ *Zapateria hirsuta*		
= *Ballota mollissima*		
– *Ballota hispanica*		

Barbula convoluta		
Bartsia trixago		
≡ *Trixago apula*		
≡ *Bellardia trixago*		
Bellis annua ssp. annua		
Beta macrocarpa		
= *Beta bourgaei*		
Beta maritima	Bleda borda	Acelga silvestre
≡ *Beta vulgaris ssp. maritima*		
Biscutella auriculata		
Biscutella lucentina	Llunetes	Anteojos
Brachypodium retusum	Cerverol	Fenazo
≡ *Bromus retusus*		
= *Bromus plukenetii*		
= *Brachypodium plukenetii*		
= *Brachypodium ramosum*		
Brassica oleracea		
Bryum bicolor		
Bryum dunense		
Bryum radiculosum		
Buglossoides arvensis		
≡ *Lithospermum arvense*		
Bupleurum fruticescens	Ajocaperdius	Cuchilleja
Bupleurum gibraltaricum		Cuchilleja
Bupleurum rigidum		
Bupleurum rigidum ssp. rigidum		
Bupleurum semicompositum		
= *Bupleurum glaucum*		
= *Bupleurum semicompositum ssp. glaucum*		
Calendula arvensis	Ungla de gat	Hierba del podador
= *Calendula parviflora*		
= *Calendula arvensis ssp. macroptera*		

Campanula erinus		
Campanula fastigiata		
Cardamine hirsuta		
Cardiospermum halicacabum		
Carduus bourgeanus		Cardo borriquero
= *Carduus reuterianus*		
Carduus pycnocephalus	Card	Cardo
Carduus tenuiflorus		
= *Carduus malacitanus*		
Carduus valentinus	Card alacantí	Cardo borriquero
≡ *Carduus bourgeanus ssp. valentinus*		
≡ *Carduus meonanthus ssp. valentinus*		
Carex halleriana		Lastoncillo
Carrichtera annua		
≡ *Vella annua*		
= *Carrichtera vellae*		
Carthamus arborescens		
≡ *Kentrophyllum arborescens*		
= *Carthamus hircinus*		
Carthamus lanatus	Assotacrist	Cardo cabrero
≡ *Kentrophyllum lanatum*		
Carthamus lanatus ssp. lanatus		
Carum foetidum *		
≡ *Selinopsis foetida*		
Catananche caerulea		
Centaurea aspera	Bracera	Tramaladro
Centaurea aspera ssp. aspera		
Centaurea aspera ssp. stenophylla	Margenera vera	Bracera
≡ *Centaurea stenophylla*		
Centaurea melitensis		

Centaurea seridis		
= *Centaurea maritima*		
= *Centaurea cruenta*		
= *Centaurea homeoscevos*		
= *Centaurea seridis ssp. cruenta*		
= *Centaurea seridis ssp. maritima*		
– *Centaurea sonchifolia*		
– *Centaurea sphaerocephala*		
Centaurea spachii	Bracera	Centaurea
≡ *Centaurea resupinata ssp. spachii*		
= *Centaurea tenuifolia*		
= *Centaurea buxea*		
= *Centaurea saetabensis*		
= *Centaurea boissieri ssp. dufourii*		
= *Centaurea spachii var. humilis*		
= *Centaurea dufourii*		
Centaurium quadrifolium		
≡ *Gentiana quadrifolia*		
Centaurium quadrifolium ssp. barrelieri	Herba de Santa Margarida	Centaurea menor
≡ *Erythraea barrelieri*		
≡ *Centaurium barrelieri*		
Centranthus calcitrapae		
≡ *Valeriana calcitrapae*		
= *Centranthus calcitrapae ssp. trichocarpus*		
= *Centranthus calcitrapae var. trichocarpus*		
Cephalaria leucantha	Falla	Culilla
≡ *Scabiosa leucantha*		
Ceratonia siliqua	Garrofer	Algarrobo
Ceratophyllum demersum		
Ceratophyllum submersum *		Ceratofilo
Chaenorhinum crassifolium ssp. crassifolium		
≡ *Antirrhinum crassifolium*		
≡ *Chaenorhinum origanifolium ssp. crassifolium*		
≡ *Linaria crassifolia*		
Chamaerops humilis	Margalló	Palmito
≡ *Phoenix humilis*		
Chamaesyce serpens		
≡ *Euphorbia serpens*		

Cheilanthes acrostica ≡ *Pteris acrosticha* ≡ *Cheilanthes pteridioides ssp. acrosticha* = *Cheilanthes odora* – *Cheilanthes fragrans* – *Cheilanthes pteridioides*		
Cheirolophus intybaceus ≡ *Centaurea intybacea* = *Centaurea virgata* = *Centaurea leucantha*		
Chenopodium album		
Chenopodium ambrosioides – *Chenopodium anthelminticum*	Te bord	Ajasote
Chenopodium murale		
Chloris gayana		Hierba de Rhodas, Pata de Gallo
Chrysanthemum coronarium		
Cirsium echinatum ≡ *Carduus echinatus* = *Cirsium willkommianum*		
Cistus albidus	Estepa blanca	Jara blanca
Cistus clusii – *Cistus libanotis* – *Cistus libanotis*	Esteperola	Jaguarzo
Cistus salviifolius	Estepa borrera	Jaguarzo morisco
Cladophora glomerata		
Cladophora vagabunda		

Clinopodium nepeta ≡ *Melissa nepeta* ≡ *Calamintha nepeta* ≡ *Satureja calamintha ssp. nepeta* ≡ *Satureja nepeta* = *Calamintha ascendens* = *Calamintha menthifolia* = *Calamintha nepetoides* = *Thymus glandulosus* = *Calamintha officinalis ssp. nepetoides* = *Calamintha sylvatica ssp. ascendens* = *Calamintha nepeta ssp. glandulosa* = *Calamintha glandulosa* = *Satureja calamintha* = *Satureja calamintha ssp. ascendens* = *Calamintha officinalis ssp. glandulosa* – *Calamintha sylvatica* – *Calamintha officinalis*		
Compsopogon coeruleus		
Convolvulus althaeoides	Corretjola	Corregüela grande
Convolvulus lanuginosus = *Convolvulus capitatus*	Campanera capdellana	Campanilla lanuda
Convolvulus valentinus	Campaneta	Campanilla
Coris monspeliensis		
Coris monspeliensis ssp. syrtica ≡ *Coris monspeliensis ssp. rivasiana* ≡ *Coris monspeliensis var. syrtica*		
Coronilla juncea	Ginestera	Coronilla de hoja fina
Coronilla minima ssp. lotoides ≡ *Coronilla lotoides* = *Coronilla clusii* = *Coronilla minima ssp. major* = *Coronilla minima ssp. clusii*	Coroneta valenciana	Coronilla de rey
Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia ≡ *Crepis taraxacifolia* = *Crepis recognita* = *Barkhausia haenseleri* = *Crepis hackeli* = *Crepis vesicaria ssp. haenseleri*		
Crossidium crassinerve		
Crupina vulgaris ≡ *Centaurea crupina*		

Crypsis aculeata
≡ *Schoenus aculeatus*

Cuscuta epithymum | Cabells de la Mare de Déu | Cuscuta
≡ *Cuscuta europaea var. epithymum*
= *Cuscuta kotschyi*
= *Cuscuta epithymum ssp. kotschyi*

Cuscuta planiflora
= *Cuscuta brevistyla*

Cylindropuntia pallida
– *Cylindropuntia rosea*
– *Opuntia rosea*
– *Cylindropuntia tunicata*
– *Opuntia tunicata*
– *Cactus tunicatus*

Cynanchum acutum

Cynoglossum cheirifolium
= *Cynoglossum cheirifolium ssp. heterocarpum*
= *Cynoglossum heterocarpum*

Cynoglossum creticum | Besneula | Viniebla
= *Cynoglossum pictum*

Cynomorium coccineum

Cyperus sculentus

Daphne gnidium | Astruc | Torvisco

Daucus carota ssp. carota
= *Daucus maritimus*
= *Daucus carota ssp. maritimus*

Daucus durieua
≡ *Caucalis hispanica*
= *Durieua hispanica*

Delphinium gracile
≡ *Delphinium peregrinum ssp. gracile*
= *Delphinium junceum*
– *Delphinium peregrinum*

Dianthus broteri | Clavellinera de pastor | Clavellinas de pluma
= *Dianthus malacitanus*
= *Dianthus serrulatus ssp. barbatus*

Dianthus broteri ssp. valentinus | Clavellinera de pastor | Clavellinas de pluma
= *Dianthus valentinus*

Dianthus saetabensis ssp. contestanus
≡ *Dianthus hispanicus ssp. contestanus*

Didymodon sicculus

Digitalis obscura | Didalera | Digital negra

Dipcadi serotinum | Marcet | Falso narciso
≡ *Hyacinthus serotinus*
≡ *Uropetalum serotinum*
= *Hyacinthus fulvus*
= *Dipcadi fulvum*

Diplotaxis erucoides | Ravenell | Rabaniza blanca
≡ *Sinapis erucoides*
= *Diplotaxis valentina*
= *Diplotaxis platystylos*

Diplotaxis ilorcitana | Ravenissa peluda | Jaramago de secarral
≡ *Pendulina ilorcitana*
= *Diplotaxis gomez-campoi*

Diplotaxis lagascana | Ravenissa groga | Jaramago de yesar
≡ *Diplotaxis harra ssp. lagascana*
≡ *Pendulina lagascana*
= *Pendulina intricata*
= *Pendulina webbiana*
= *Diplotaxis harra ssp. intricata*
– *Diplotaxis crassifolia*

Dittrichia viscosa | Olivarda | Julivarda
≡ *Erigeron viscosus*
≡ *Cupularia viscosa*
≡ *Inula viscosa*

Dorycnium pentaphyllum
≡ *Lotus dorycnium*

Dorycnium pentaphyllum ssp. pentaphyllum | Botgeta | Escobón
= *Dorycnium suffruticosum*

Drosanthemum floribundum
≡ *Mesembryanthemum floribundum*

Echinops ritro | Panical blau | Cardo yesquero

Echinops strigosus

Echium asperrimum
= *Echium pyrenaicum*
= *Echium valentinum*
– *Echium altissimum*
– *Echium italicum*

Echium creticum		
Echium creticum ssp. coincyanum	Viperina	Viborera
≡ *Echium coincyanum* ≡ *Echium vulgare ssp. coincyanum* = *Echium lagascae* = *Echium granatense* = *Echium vulgare ssp. granatense*		
Echium humile		
= *Echium angustifolium*		
Echium humile ssp. pycnanthum		
≡ *Echium pycnanthum*		
Echium vulgare		
Eclipta prostrata		
≡ *Verbesina prostrata* = *Eclipta alba*		
Elaeoselinum tenuifolium	Julivert marí	Hinojo marino
≡ *Thapsia tenuifolia* ≡ *Distichoselinum tenuifolium* = *Elaeoselinum lagascae*		
Emex spinosa	Bleda borda	Romaza espinosa
≡ *Rumex spinosa*		
Ephedra fragilis		
– *Ephedra altissima*		
Erica multiflora	Petorreta	Brezo
Erodium chium		
≡ *Geranium chium*		
Erodium malacoides	Agulletes	Filamaría
≡ *Geranium malacoides*		
Erodium neuradifolium		
= *Erodium aragonense* = *Erodium malacoides ssp. aragonense*		
Erodium sanguis-christi		
Erucastrum nasturtiifolium		
Erucastrum virgatum ssp. baeticum	Ravenissa de roca	Jaramago de monte
≡ *Sinapis baetica*		
Erucastrum virgatum ssp. brachycarpum	Cabeso d´or, ravenissa major	Jaramago de roca
≡ *Erucastrum brachycarpum*		
Eryngium campestre	Panical	Cardo corredor
Eucalyptus gomphocephala		
Euphorbia falcata		
= *Euphorbia acuminata* = *Euphorbia rubra* = *Euphorbia falcata ssp. rubra*		
Euphorbia segetalis	Lletera	Lechera
= *Euphorbia pinea* = *Euphorbia segetalis ssp. pinea*		
Euphorbia serrata	Lletera de vinya	Lechetrezna serrada
Euphorbia squamigera		
= *Euphorbia rupicola* = *Euphorbia carthaginensis* – *Euphorbia monchiquensis*		
Fagonia cretica		
Ferula communis ssp. catalaunica		
≡ *Ferula communis var. catalaunica* = *Ferula nodiflora* = *Ferula hispanica* – *Ferula tingitana*		
Filago congesta		
= *Filago bianori*		
Filago desertorum		
Filago fuscescens		
≡ *Filago pyramidata ssp. fuscescens*		
Filago pyramidata	Herba del borm	Hierba algodonera
= *Filago spathulata*		
Frankenia corymbosa		
= *Frankenia webbii*		
Frankenia pulverulenta		
Fumana ericifolia		
= *Fumana spachii* = *Fumana montana* = *Fumana spachii ssp. montana* = *Fumana ericoides ssp. montana*		

Fumana ericoides — Jarilla — Esteperola

≡ *Cistus ericoides*
= *Fumana spachii ssp. robusta*

Fumana hispidula — Fals timó — Tomillo moruno

≡ *Fumana glutinosa var. hispidula*
≡ *Fumana thymifolia var. hispidula*
≡ *Fumana laevis var. hispidula*
≡ *Fumana viscida ssp. hispidula*

Fumana laevipes

≡ *Cistus laevipes*

Fumana laevis

≡ *Cistus laevis*
≡ *Fumana glutinosa var. laevis*
≡ *Fumana thymifolia ssp. laevis*

Fumana scoparia

= *Fumana racemosa*
= *Fumana ericoides var. glandulosa*

Fumana thymifolia

≡ *Cistus thymifolius*
= *Cistus glutinosus*
= *Fumana viscida*
= *Helianthemum glutinosum*
= *Fumana glutinosa*

Fumaria agraria

Fumaria parviflora

Funaria hygrometrica

Galium aparine — Amor d'hortolà — Amor de hortelano

Galium fruticescens — Herba mosquera — Galio blanco

≡ *Galium lucidum ssp. fruticescens*

Galium parisiense

Galium setaceum

= *Galium capillare*

Galium verrucosum

= *Galium saccharatum*

Genista scorpius

≡ *Spartium scorpius*
= *Genista salesii*
= *Genista purgans*

Geranium lucidum

Geranium rotundifolium

Gladiolus illyricus

≡ *Gladiolus communis ssp. illyricus*
= *Gladiolus reuteri*
– *Gladiolus dubius*

Globularia alypum — Coroneta de frare — Coronilla de fraile

Gnaphalium luteoalbum

≡ *Laphangium luteo-album*
≡ *Pseudognaphalium luteo-album*

Guillonea scabra — Fenoll bord — Fenollosa

≡ *Laserpitium scabrum*

Guiraoa arvensis — Ravanissa fina — Jaramago menor

Gymnostomum viridulum

Halimione portulacoides

≡ *Obione portulacoides*
≡ *Atriplex portulacoides*

Halocnemum strobilaceum

≡ *Salicornia strobilacea*

Halogeton sativus

≡ *Salsola sativa*
= *Salsola setifera*

Halopeplis amplexicaulis *

≡ *Salicornia amplexicaulis*

Hammada articulata

≡ *Caroxylon articulatum*
≡ *Haloxylon articulatum*
= *Salsola articulata*
– *Haloxylon tamariscifolium*
– *Hammada tamariscifolia*
– *Anabasis tamariscifolia*

Haplophyllum linifolium ssp. rosmarinifolium — Ruda mascle — Ruda silvestre

≡ *Ruta rosmarinifolia*
= *Haplophyllum angustifolium*

Hedypnois cretica

≡ *Hyoseris cretica*
= *Hyoseris rhagadioloides*
= *Hedypnois tuberaeformis*
= *Hedypnois polymorpha*
= *Hedypnois pygmaea*
= *Hedypnois rhagadioloides*

Helianthemum cinereum ≡ *Cistus cinereus*	Herba del setge	Jarilla
Helianthemum cinereum ssp. cinereum	Herba del setge	Jarilla
Helianthemum marifolium ≡ *Cistus marifolius* = *Cistus myrtifolius* = *Helianthemum myrtifolium*	Herba del setge	Jarilla de hoja de maro
Helianthemum origanifolium ssp. origanifolium		
Helianthemum rotundifolium ≡ *Helianthemum cinereum ssp. rotundifolium* ≡ *Helianthemum marifolium ssp. rotundifolium* = *Helianthemum paniculatum* – *Helianthemum rubellum* – *Helianthemum cinereum ssp. rubellum*		
Helianthemum salicifolium ≡ *Cistus salicifolius*		
Helianthemum squamatum ≡ *Cistus squamatus*		
Helianthemum syriacum ≡ *Cistus syriacus* = *Helianthemum thibaudii* = *Helianthemum syriacum ssp. thibaudii* – *Helianthemum racemosum* – *Helianthemum lavandulifolium*	Romer blanc	Romero blanco
Helianthemum violaceum ≡ *Cistus violaceus* ≡ *Helianthemum apenninum ssp. violaceum* ≡ *Helianthemum pilosum ssp. violaceum* = *Cistus racemosus* = *Cistus pilosus* = *Helianthemum lavandulifolium* = *Cistus strictus* = *Cistus linearis* = *Helianthemum racemosum* = *Helianthemum pilosum* = *Helianthemum lineare* = *Helianthemum strictum*		
Helianthemum viscarium = *Helianthemum viscarium ssp. hispidulum*		
Helichrysum stoechas ≡ *Gnaphalium stoechas* = *Gnaphalium decumbens* = *Helichrysum decumbens*	Sempreviva borda	Siempreviva de monte

Helictotrichon filifolium ≡ *Avena filifolia*		
Heliotropium curassavicum		Verruguera
Heliotropium europaeum	Herba berruguera	Verrucaria
Herniaria cinerea ≡ *Herniaria hirsuta ssp. cinerea* = *Herniaria annua*		
Herniaria fruticosa	Herba del renyó	Matilla de la orina
Heteropogon contortus ≡ *Andropogon contortus* = *Andropogon allionii* = *Heteropogon glaber* = *Heteropogon allionii*		
Hippocrepis ciliata ≡ *Hippocrepis multisiliquosa ssp. ciliata* = *Hippocrepis annua*		
Hippocrepis squamata ≡ *Coronilla squamata* ≡ *Hippocrepis comosa ssp. squamata*	Ferradura blanquinosa	Herradura cenicienta
Hordeum murinum		
Hordeum murinum ssp. leporinum ≡ *Hordeum leporinum*	Margall bord	Cebadilla de ratón
Hymenolobus procumbens ≡ *Lepidium procumbens* ≡ *Hornungia procumbens* ≡ *Hutchinsia procumbens*		
Hymenolobus procumbens ssp. procumbens		
Hyoscyamus albus		
Hyoseris scabra		
Hyparrhenia hirta ≡ *Andropogon hirtus* = *Hyparrhenia podotricha*	Fenàs	Cebrillo
Hypericum ericoides	Trencapedres	Pinillo de oro
Iberis carnosa ssp. hegelmaieri ≡ *Iberis hegelmaieri*	Boleta de neu o herba-neu	Carraspique, parasol

Inula crithmoides		
Jasonia glutinosa ≡ *Erigeron glutinosus* ≡ *Chiliadenus glutinosus* = *Inula saxatilis* = *Chrysocoma verticalis* = *Jasonia saxatilis* = *Chiliadenus saxatilis*		
Juncus bufonius		
Juncus maritimus = *Juncus pseudoacutus* = *Juncus maritimus var. pseudoacutus*		
Juniperus oxycedrus		
Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus	Càdec	Enebro
Lactuca serriola = *Lactuca scariola*	Enciam bord	Lechuga borde
Lafuentea rotundifolia	Orelleta de penya	Orejilla de roca
Lamarckia aurea ≡ *Cynosurus aureus*	Cua de gos	Cepillitos
Lantana camara		Banderita española
Lapiedra martinezii		
Lathyrus hirsutus		
Launaea fragilis ≡ *Lactuca fragilis* = *Rhabdotheca chondrilloides* – *Zollikoferia resedifolia* – *Launaea resedifolia*		
Launaea lanifera * – *Sonchus spinosus*		
Launaea pumila ≡ *Scorzonera pumila* ≡ *Launaea fragilis ssp. pumila* ≡ *Zollikoferia pumila* = *Sonchus scorzoneraeformis*	Llicsó bord	Falsa escorzonerilla
Lavandula dentata	Tomaní d´Alacant	Cantueso rizado
Lavandula latifolia	Espigol	Espliego

Lavandula multifida		
Lavatera cretica	Malva	Malva
Lavatera maritima = *Lavatera africana*		
Lavatera triloba * = *Lavatera micans*		
Lepidium draba ≡ *Cardaria draba*		
Lepidium graminifolium		
Lepidium graminifolium ssp. iberideum = *Lepidium suffruticosum* = *Lepidium graminifolium ssp. suffruticosum*		
Leuzea conifera ≡ *Centaurea conifera* ≡ *Rhaponticum coniferum*	Carxofeta	Cuchara de pastor
Limonium angustebracteatum ≡ *Limonium delicatulum ssp. angustebracteatum* = *Limonium delicatulum ssp. valentinum*	Ensopeguera	Saladilla fina
Limonium bellidifolium * ≡ *Statice limonium var. bellidifolia* ≡ *Statice bellidifolia*	Ensopeguera francesa	Limonio de hoja estrecha
Limonium caesium ≡ *Statice caesia*		Sopaenvino
Limonium cossonianum	Trenca olla blanca	Limonio de flor blanca
Limonium delicatulum	Ensopeguera	Espantazorras
Limonium echioides ≡ *Statice echioides*	Lletugueta menuda	Limonio enano
Limonium parvibracteatum	Ensopeguera alacantina	Limonio alicantino
Limonium santapolense	Trenca l'olla de Santa Pola	Limonio
Linaria micrantha ≡ *Antirrhinum micranthum* ≡ *Linaria arvensis ssp. micrantha*		
Linum narbonense	Lli blau	Lino azul

Linum strictum = *Linum corymbulosum* = *Linum strictum ssp. corymbulosum*		
Linum strictum ssp. strictum		
Lobularia maritima ≡ *Clypeola maritima* ≡ *Alyssum maritimum* ≡ *Koniga maritima*		
Lobularia maritima ssp. maritima	Caps blancs	Mastuerzo marino
Lonicera implexa = *Lonicera valentina*	Lligabosc	Madreselva
Lycium intricatum		
Lycopersicum esculentum ≡ *Solanum lycopersicum*		
Lygeum spartum	Espart	Albardín
Malva parviflora = *Malva microcarpa*	Malva	Malva de flor pequeña
Marrubium alysson		
Matricaria chamomilla = *Matricaria recutita* = *Chamomilla recutita*		
Matthiola fruticulosa ≡ *Cheiranthus fruticulosus* = *Cheiranthus tristis* = *Matthiola varia* = *Matthiola tristis*	Violer trist	Alhelí de campo
Matthiola parviflora ≡ *Cheiranthus parviflorus*		
Melica minuta		
Mesembryanthemum nodiflorum ≡ *Gasoul nodiflorum*		
Mirabilis jalapa	Flor de nit	Dondiego de noche

Misopates microcarpum ≡ *Antirrhinum microcarpum* = *Misopates orontium var. pusillus* = *Misopates orontium ssp. pusillus*			
Misopates orontium ≡ *Antirrhinum orontium*			
Moricandia arvensis ≡ *Brassica arvensis*	Colletxó	Collejón	
Najas marina			
Najas marina ssp. armata ≡ *Najas armata*			
Nepeta amethystina ≡ *Nepeta nepetella ssp. amethystina* = *Nepeta murcica*			
Nepeta amethystina ssp. mallophora			
Nerium oleander	Baladre	Adelfa	
Nicotiana glauca	Tabac de jardí	Tabaco moro	
Nonea micrantha			
Odontites longiflorus ≡ *Euphrasia longiflora* ≡ *Macrosyringion longiflorum*			
Olea europaea ssp. sylvestris ≡ *Olea sylvestris* = *Olea oleaster*			
Ononis minutissima = *Ononis barbata*	Gavó menut	Anonis menor	
Ononis tridentata ssp. tridentata	Arnall	Arnacho	
Onopordum macracanthum ssp. micropterum ≡ *Onopordum micropterum* = *Onopordum murcicum*	Card borriquer	Cardo borriquero	
Ophrys fusca	Mosques negres	Monjas	

Ophrys scolopax		
= *Ophrys scolopax ssp. apiformis*		
Ophrys speculum	Mosques blaves	Espejo de Venus
= *Ophrys ciliata*		
Opuntia dillenii		
≡ *Cactus dillenii*		
Opuntia ficus-indica		
= *Opuntia maxima*		
= *Opuntia amyclaea*		
= *Opuntia ficus-barbarica*		
Orobanche amethystea		
= *Orobanche eryngii*		
Orobanche icterica		
≡ *Orobanche major ssp. icterica*		
≡ *Orobanche elatior ssp. icterica*		
Orobanche mutelii		
≡ *Orobanche ramosa ssp. mutelii*		
≡ *Phelipaea ramosa ssp. mutelii*		
≡ *Phelipanche mutelii*		
≡ *Phelipaea mutelii*		
= *Orobanche mutelii ssp. spissa*		
Orobanche purpurea		
Orobanche reuteriana		
≡ *Phelipaea reuteriana*		
≡ *Phelipanche reuteriana*		
= *Orobanche tunetana*		
Osyris alba		Retama loca
Osyris lanceolata	Ginestó valencià	Bayón
= *Osyris quadripartita*		
Oxalis corniculata		
Oxalis pes-caprae	Agret	Agrios
= *Oxalis cernua*		
Papaver hybridum		
= *Papaver hispidum*		
Papaver rhoeas	Rosella	Amapola

Parietaria judaica	Blet de paret	Albahaca de río
= *Parietaria diffusa*		
– *Parietaria officinalis*		
Paronychia argentea	Herba de neu	Nevadilla
≡ *Illecebrum paronychia*		
= *Paronychia saguntina*		
Paronychia suffruticosa	Herbeta de la sang	Sanguinaria mayor
≡ *Illecebrum suffruticosum*		
≡ *Herniaria suffruticosa*		
= *Herniaria paniculata*		
= *Paronychia brevistipulata*		
= *Herniaria polygonoides*		
Peganum harmala		
Pennisetum setaceum		
≡ *Phalaris setacea*		
Periploca angustifolia		
≡ *Periploca laevigata ssp. angustifolia*		
≡ *Periploca laevigata*		
Phagnalon rupestre		
≡ *Conyza rupestris*		
Phagnalon saxatile	Botgeta	Manzanilla yesquera
≡ *Gnaphalium saxatile*		
= *Conyza intermedia*		
Phalaris aquatica		
= *Phalaris tuberosa*		
= *Phalaris nodosa*		
– *Phalaris bulbosa*		
Phillyrea angustifolia		Labiernago
Phlomis crinita	Orella de llop	Oreja de burro
= *Phlomis barrelieri*		
Phlomis lychnitis	Orella de llebre	Oreja de liebre
Phlomis purpurea	Matagall	Matagallo
Phlomis x composita		
= *Phlomis trullenquei*		
Phoenix dactylifera		
Phragmites australis	Senill	Carrizo
≡ *Arundo australis*		
= *Arundo phragmites*		
= *Phragmites communis*		

Phragmites australis ssp. australis		
Phyla nodiflora ≡ *Verbena nodiflora* ≡ *Lippia nodiflora*		
Picnomon acarna ≡ *Carduus acarna* ≡ *Cirsium acarna*		
Picris echioides ≡ *Helminthia echioides*	Arpell	Lengua de gato
Pinus halepensis	Pi blanc	Pino carrasco
Piptatherum miliaceum ssp. miliaceum		
Pistacia lentiscus	Llentiscle	Lentisco
Pistacia terebinthus	Cornicabra	Cornicabra
Plantago afra		
Plantago albicans	Penosella	Llantén blanquecino
Plantago amplexicaulis		
Plantago coronopus	Cervina	Cuerno de ciervo
Plantago crassifolia ≡ *Plantago maritima ssp. crassifolia*		
Plantago major = *Plantago intermedia* = *Plantago major ssp. intermedia* – *Plantago cornutii*	Plantatge gros	Llantén mayor
Plantago ovata		
Plantago sempervirens – *Plantago cynops*	Matafoc	Zaragatona
Platycapnos spicata ≡ *Fumaria spicata* = *Platycapnos echeandiae* = *Platycapnos spicata ssp. echeandiae*		
Polycarpon tetraphyllum ssp. tetraphyllum	Policarp	
Polygala rupestris ≡ *Lerrouxia ifniensis* = *Polygala juniperina* – *Polygala comosa* – *Polygala saxatilis*	Polígala	Hierba amarga
Polygonum aviculare	Centinòdia	Centinodia
Polygonum equisetiforme	Passacamins equisetiforme	Hierba de la sangre
Potamogeton pectinatus = *Potamogeton cylindricum* = *Potamogeton marinus*	Espiga d'aigua	Espiga de agua
Pottia pallida		
Prunus dulcis ≡ *Amygdalus dulcis* = *Prunus amygdalus* = *Amygdalus communis*		
Psoralea bituminosa ≡ *Bituminaria bituminosa* = *Psoralea plumosa*		
Pterygoneurum ovatum		
Pterygoneurum subsesile		
Puccinellia distans ≡ *Poa distans* ≡ *Glyceria distans*		
Puccinellia fasciculata ≡ *Poa fasciculata* = *Puccinellia pseudodistans*		
Pulicaria sicula ≡ *Erigeron siculum*		
Quercus coccifera	Coscoll	Coscoja
Quercus ilex ssp. rotundifolia ≡ *Quercus rotundifolia* = *Quercus ballota* = *Quercus ilex ssp. smilax* = *Quercus ilex ssp. ballota*		Carrasca
Ranunculus peltatus ssp. baudotii ≡ *Ranunculus baudotii* ≡ *Ranunculus aquatilis ssp. baudotii* = *Ranunculus confusus*		
Ranunculus repens		

Raphanus sativus		
Rapistrum rugosum ≡ *Myagrum rugosum*		
Reichardia picroides ≡ *Scorzonera picroides* = *Picridium crassifolium* = *Picridium vulgare*		
Reichardia tingitana ≡ *Scorzonera tingitana* ≡ *Picridium tingitanum* = *Picridium pinnatifidum*		
Reseda barrelieri	Frarot	Reseda mayor ≡ *Reseda fruticulosa ssp. barrelieri* = *Reseda macrostachya*
Reseda lutea – *Reseda ramosissima*	Bufadors	Gualdón
Reseda phyteuma – *Reseda phyteuma ssp. media* – *Reseda media*		
Reseda undata		
Reseda undata ssp. leucantha ≡ *Reseda leucantha* – *Reseda gayana* – *Reseda alba ssp. gayana*		
Rhamnus alaternus	Aladern	Aladiern
Rhamnus lycioides		
Rhamnus lycioides ssp. borgiae	Aranyoner	Espino negro
Rhamnus lycioides ssp. lycioides = *Rhamnus aragonensis*	Arçot	Espino negro
Rhamnus oleoides ssp. angustifolia ≡ *Rhamnus oleoides var. angustifolia*		
Riccia crustata		
Riella helicophylla *		
Riella notarisii		
Rosmarinus officinalis	Romaní	Romero
Rosmarinus officinalis ssp. officinalis		
Rubia peregrina	Rogeta	Raspalengua
Rubia peregrina ssp. longifolia ≡ *Rubia longifolia*		
Rubia tinctorum		
Rubus ulmifolius = *Rubus valentinus* = *Rubus discolor*	Esbarzer	Zarzamora
Rumex conglomeratus		
Rumex intermedius ≡ *Rumex thyrsoides ssp. intermedius*		
Rumex obtusifolius		
Rumex pulcher ssp. woodsii ≡ *Rumex woodsii* – *Rumex pulcher ssp. divaricatus*		
Ruppia cirrhosa		
Ruppia maritima = *Ruppia rostellata* = *Ruppia aragonensis* = *Ruppia maritima ssp. rostellata*		
Ruta angustifolia ≡ *Ruta chalepensis ssp. angustifolia*	Ruda	Ruda menor
Ruta chalepensis = *Ruta bracteosa*		
Salicornia alpini ≡ *Sarcocornia perennis ssp. alpini* – *Sarcocornia perennis* – *Salicornia perennis*		
Salicornia ramosissima – *Salicornia europaea* – *Salicornia dolichostachya* – *Salicornia herbacea*		
Salsola genistoides ≡ *Caroxylon genistoides* = *Caroxylon tamariscifolium*		

Salsola kali = *Salsola ruthenica* = *Salsola kali ssp. ruthenica*		
Salsola oppositifolia – *Salsola longifolia* – *Salsola verticillata* – *Salsola fruticosa*		
Salsola soda *		Barrilla Común
Salsola vermiculata = *Salsola microphylla* = *Salsola flavescens*	Barrella	Caramillo
Salvia verbenaca	Tàrrec	Verbena
Sanguisorba minor ssp. spachiana ≡ *Poterium spachianum* = *Poterium verrucosum* = *Poterium magnolii* = *Sanguisorba mauritanica* = *Sanguisorba minor ssp. magnolii* = *Poterium mauritanicum* = *Sanguisorba verrucosa*		
Sanguisorba rupicola ≡ *Poterium rupicolum* ≡ *Sanguisorba minor ssp. rupicola*		
Santolina chamaecyparissus ssp. squarrosa ≡ *Santolina chamaecyparissus var. squarrosa* = *Santolina chamaecyparissus var. virens* = *Santolina villosa*	Camamilla	Manzanilla
Sarcocornia fruticosa ≡ *Salicornia europaea var. fruticosa* ≡ *Salicornia fruticosa* ≡ *Arthrocnemum fruticosum*		
Satureja obovata ≡ *Satureja cuneifolia ssp. obovata*		
Satureja obovata ssp. canescens ≡ *Satureja cuneifolia var. canescens*	Cendrosa	Saborija blanca
Saxifraga corsica ssp. cossoniana ≡ *Saxifraga cossoniana*		
Scirpus litoralis ≡ *Schoenoplectus litoralis*		
Scrophularia canina – *Scrophularia canina ssp. frutescens* – *Scrophularia ramosissima* – *Scrophularia frutescens*		
Scrophularia tanacetifolia = *Scrophularia sciophila* = *Scrophularia grenieri*	Conillets rojos	Escrofularia de sombra
Sedum acre		
Sedum album = *Sedum micranthum* = *Sedum teretifolium*	Raïmet de Pastor	Uva de gato
Sedum dasyphyllum ssp. glanduliferum ≡ *Sedum glanduliferum*		
Sedum sediforme ≡ *Sempervivum sediforme* = *Sedum altissimum* = *Sempervivum anomalum* = *Sedum nicaeense*	Raïmet de pastor	Uña de gato
Sedum sediforme ssp. sediforme		
Senecio malacitanus ≡ *Senecio nevadensis ssp. malacitanus* = *Senecio linifoliaster* = *Senecio linifolius*		
Senecio vulgaris	Citró	Hierba cana
Serratula flavescens ssp. leucantha ≡ *Carduus leucanthus* ≡ *Klasea leucantha* ≡ *Klasea flavescens ssp. leucantha* ≡ *Serratula leucantha*	Clacida fina	Cardillo blanco
Sherardia arvensis		
Sideritis leucantha	Rabet de gat	Rabo de gato
Sideritis leucantha ssp. albicaulis		
Sideritis leucantha ssp. leucantha = *Sideritis leucantha ssp. illicitana*	Rabet de gat	Rabo de gato
Sideritis tragoriganum ≡ *Sideritis leucantha var. tragoriganum* = *Sideritis angustifolia* = *Sideritis saetabensis* – *Sideritis lagascana*		

Silene apetala = *Silene decipiens*		
Silene secundiflora = *Silene setabensis* = *Silene glauca*		
Silene tridentata = *Silene coarctata*		
Silene vulgaris ≡ *Behen vulgaris*		
Silybum marianum ≡ *Carduus marianus*	Card de Maria	Cardo mariano
Smilax aspera	Arítjol	Zarzaparrilla
Solanum bonariense		Naranjillo
Solanum elaeagnifolium		Tomatillo
Solanum nigrum	Herba mora	Hierba mora
Solanum tuberosum		
Sonchus maritimus ssp. maritimus = *Sonchus loscosii* – *Sonchus crassifolius*		
Sonchus oleraceus	Lletsó	Cerraja
Sonchus tenerrimus	Lletsó	Cerraja tierna
Spergularia bocconei ≡ *Alsine bocconei*		
Spergularia diandra ≡ *Arenaria diandra* = *Spergularia salsuginea*		
Spergularia marina ≡ *Arenaria rubra var. marina* ≡ *Arenaria marina* = *Spergularia salina*		
Spergularia media ≡ *Arenaria media* = *Arenaria maritima* = *Arenaria marginata* = *Spergularia marginata* = *Spergularia maritima*		
Staehelina dubia	Pinzell	Hierba pincel
Stipa capensis = *Stipa tortilis* = *Stipa retorta*		
Stipa parviflora		
Stipa tenacissima ≡ *Macrochloa tenacissima*	Espart	Esparto
Suaeda pruinosa ≡ *Suaeda vera ssp. pruinosa* = *Cochliospermum cavanillesii*		
Suaeda vera – *Suaeda altissima* – *Suaeda fruticosa*		
Tamarix boveana		
Tamarix canariensis = *Tamarix segobricensis*		
Teucrium botrys		
Teucrium buxifolium = *Teucrium saxatile*		
Teucrium buxifolium ssp. rivasii ≡ *Teucrium rivasii*	Poliol de roca	Poleo de roca
Teucrium capitatum		
Teucrium capitatum ssp. gracillimum ≡ *Teucrium capitatum var. gracillimum*	Timó blanc	Tomillo macho
Teucrium carolipaui ≡ *Teucrium pumilum ssp. carolipaui* = *Teucrium carolipaui ssp. fontqueri*		
Teucrium libanitis = *Teucrium verticillatum* = *Teucrium pumilum ssp. verticillatum*	Timó mascle	Zamarrilla
Teucrium murcicum = *Teucrium polium ssp. aguilasense*	Poliol mascle	Poleo macho
Teucrium pseudochamaepitys	Cresta de gall	Falso pinillo
Teucrium ronnigeri ssp. ronnigeri		

Teucrium thymifolium	Poliol amarg de roca	Poleo de roca
≡ *Teucrium buxifolium ssp. thymifolium* = *Teucrium buxifolium var. diversifolium* = *Teucrium caespitulosum* = *Teucrium petrophyllum*		
Teucrium x alvarezii		
Thesium humifusum		
≡ *Thesium divaricatum* = *Thesium humifusum ssp. divaricatum* – *Thesium linophyllum*		
Thymelaea argentata		
≡ *Daphne argentata* = *Daphne nitida* = *Passerina segobricensis* = *Thymelaea pseudodioica* = *Passerina nitida* = *Thymelaea nitida*		
Thymelaea hirsuta	Bufalaga hirsuta	Borja marina
≡ *Passerina hirsuta*		
Thymelaea tartonraira ssp. valentina	Bufalaga	Salamunda
≡ *Passerina tartonraira var. valentina* ≡ *Thymelaea valentina* – *Passerina thomasii*		
Thymus hyemalis		Tomillo fino
= *Thymus glandulosus* = *Thymus reuteri*		
Thymus moroderi	Cantauesso	Cantahueso
≡ *Thymus longiflorus ssp. moroderi* = *Thymus longiflorus var. ciliatus*		
Thymus vulgaris	Timó	Tomillo
Thymus vulgaris ssp. aestivus	Timonet, timó, farigola	Tomillo, tomillo borde
≡ *Thymus aestivus*		
Thymus vulgaris ssp. vulgaris		
Thymus x martinezii		
≡ *Thymus funkii var. martinezii*		
Torilis arvensis ssp. neglecta		
≡ *Torilis neglecta* = *Scandix infesta* = *Torilis infesta*		
Torilis leptophylla		
≡ *Caucalis leptophylla*		
Torilis nodosa		
≡ *Tordylium nodosum*		
Tortula muralis		
Tortula vahliana		
Tribulus terrestris		
Tropaeolum majus	Bequera	Capuchina
Ulva intestinalis		
Urospermum picroides	Amargot	Barba de viejo
≡ *Tragopogon picroides*		
Valantia hispida		
Valantia muralis		
Valerianella discoidea		
≡ *Valeriana locusta var. discoidea* ≡ *Valerianella coronata ssp. discoidea*		
Verbascum thapsus		
= *Verbascum crassifolium* = *Verbascum montanum* = *Verbascum thapsus ssp. crassifolium* = *Verbascum thapsus ssp. montanum* – *Verbascum phlomoides*		
Verbascum thapsus ssp. giganteum		
≡ *Verbascum giganteum* = *Verbascum thapsiforme* = *Verbascum valentinum* = *Verbascum phlomoides ssp. thapsiforme* = *Verbascum thapsus var. valentinum* – *Verbascum densiflorum*		
Verbena officinalis	Berbena	Verbena
Veronica polita	Verònica polida	Azuletes
≡ *Veronica agrestis ssp. polita* = *Veronica didyma*		
Viburnum tinus	Marfull	Durillo
Viola arborescens	Violeta de la tardor	Violeta de otoño
Vitis vinifera	Vinya	Viña

Volutaria tubuliflora

≡ *Amberboa tubuliflora*
– *Centaurea lippi*
– *Volutaria lippi*

Withania frutescens — Oroval

≡ *Atropa frutescens*
= *Physalis suberosa*

Zannichellia pedunculata

≡ *Zannichellia palustris ssp. pedunculata*
= *Zannichellia pedicellata*
= *Zannichellia palustris ssp. pedicellata*

Zygophyllum fabago

** especies prioritarias* — *nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)*

*** especies restringidas*

LISTADO FLORA Nº2: SAN ISIDRO

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Aster squamatus	Àster americà	Rama negra	
≡ *Conyza squamata* ≡ *Symphyotrichum squamatum*			
Avena barbata ssp. barbata			
Halopeplis amplexicaulis *			
≡ *Salicornia amplexicaulis*			
Hymenolobus procumbens			
≡ *Lepidium procumbens* ≡ *Hornungia procumbens* ≡ *Hutchinsia procumbens*			
Lavandula multifida			
Ranunculus peltatus ssp. baudotii			
≡ *Ranunculus baudotii* ≡ *Ranunculus aquatilis ssp. baudotii* = *Ranunculus confusus*			
Ruppia maritima			
= *Ruppia rostellata* = *Ruppia aragonensis* = *Ruppia maritima ssp. rostellata*			
Silene pseudoatocion			
Tanacetum parthenium			
≡ *Matricaria parthenium* ≡ *Leucanthemum parthenium* ≡ *Pyrethrum parthenium* ≡ *Chrysanthemum parthenium*			
Thymus vulgaris	Timó	Tomillo	
Veronica polita	Verònica polida	Azuletes	
≡ *Veronica agrestis ssp. polita* = *Veronica didyma*			

** especies prioritarias* — *nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)*

*** especies restringidas*

LISTADO FLORA Nº3: ALBATERA

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Acaulon dertosense			
Achillea ageratum			
Agave fourcroydes			
Aizoon hispanicum			
Ajuga iva ≡ *Teucrium iva*			
Alcea rosea ≡ *Althaea rosea*			
Aloina aloides			
Amaranthus blitoides = *Amaranthus aragonensis*			
Amaranthus viridis ≡ *Euxolus viridis* = *Amaranthus gracilis*	Blet	Bledo	
Anabasis articulata ≡ *Salsola articulata* = *Salicornia mucronata* = *Anabasis hispanica* = *Anabasis mucronata*			
Anagallis arvensis ssp. arvensis = *Anagallis arvensis ssp. phoenicea* = *Anagallis arvensis ssp. latifolia* = *Anagallis arvensis ssp. parviflora*			
Andryala ragusina = *Andryala lyrata*			
Anthyllis cytisoides	Albaida	Albaida	
Anthyllis terniflora ≡ *Genista terniflora* ≡ *Anthyllis cytisoides ssp. terniflora* ≡ *Anthyllis cytisoides var. lagascana* = *Anthyllis genistae*	Albada	Albaida fina	
Arenaria montana ≡ *Willwebera montana*			
Arenaria montana ssp. intricata ≡ *Arenaria montana var. intricata* ≡ *Arenaria intricata* = *Arenaria segobricensis* = *Arenaria montana ssp. linearifolia*	Herba pixadora	Arenaria	
Artemisia arborescens			
Artemisia barrelieri	Botja de saladar	Ontina	
Artemisia herba-alba			
Artemisia lucentica ≡ *Artemisia hispanica* – *Artemisia reptans*	Donzell	Ontina	
Arthrocnemum macrostachyum ≡ *Salicornia macrostachya* = *Arthrocnemum glaucum* – *Salicornia glauca*			
Arundo donax – *Arundo mauritanica*	Canya	Caña	
Asparagus horridus = *Asparagus stipularis*	Esparreguera de menjar	Esparraguera	
Asperula aristata ssp. scabra ≡ *Asperula aristata var. scabra*	Herba prima	Asperilla de flor roja	
Asphodelus cerasiferus – *Asphodelus albus* – *Asphodelus ramosus*			
Asphodelus fistulosus	Gamonet	Gamoncillo	
Asphodelus fistulosus ssp. fistulosus			
Aster squamatus ≡ *Conyza squamata* ≡ *Symphyotrichum squamatum*	Àster americà	Rama negra	
Asteriscus spinosus ≡ *Buphtalmum spinosum* ≡ *Pallenis spinosa*			
Astragalus hispanicus = *Astragalus hegelmaieri* – *Astragalus onobrychis*	Botja rosada	Astrágalo hispanico	
Atractylis humilis ≡ *Erigeron canadensis*	Card hereu	Cardo heredero	

Atriplex halimus
= *Atriplex serrulata*

Ballota hirsuta — Marrubi hirsut — Flor rubí
≡ *Echeandia hirsuta*
≡ *Zapateria hirsuta*
= *Ballota mollissima*
– *Ballota hispanica*

Barbula convoluta

Bellis annua
= *Bellis annua ssp. microcephala*

Bellis annua ssp. annua

Beta maritima — Bleda borda — Acelga silvestre
≡ *Beta vulgaris ssp. maritima*

Bombycilaena discolor
≡ *Micropus discolor*
≡ *Bombycilaena erecta ssp. discolor*
= *Micropus bombicinus*
= *Micropus erectus ssp. bombicinus*

Brachypodium retusum — Cerverol — Fenazo
≡ *Bromus retusus*
= *Bromus plukenetii*
= *Brachypodium plukenetii*
= *Brachypodium ramosum*

Bryum dunense

Bupleurum fruticescens — Ajocaperdius — Cuchilleja

Bupleurum gibraltaricum — Cuchilleja
= *Bupleurum verticale*

Bupleurum semicompositum
= *Bupleurum glaucum*
= *Bupleurum semicompositum ssp. glaucum*

Cachrys sicula
= *Hippomarathrum pterochlaenum*

Campanula erinus

Carduus bourgeanus — Cardo borriquero
= *Carduus reuterianus*

Carex halleriana — Lastoncillo

Carrichtera annua
≡ *Vella annua*
= *Carrichtera vellae*

Carthamus arborescens
≡ *Kentrophyllum arborescens*
= *Carthamus hircinus*

Carthamus lanatus ssp. baeticus
≡ *Kentrophyllum baeticum*

Carum foetidum *
≡ *Selinopsis foetida*

Centaurea calcitrapa — Card estrellat — Arbojos

Centaurea lagascae *
≡ *Centaurea boissieri ssp. lagascae*
≡ *Centaurea dufourii ssp. lagascae*
= *Centaurea incana*

Centaurium spicatum
≡ *Gentiana spicata*
≡ *Erythraea spicata*

Chamaerops humilis — Margalló — Palmito
≡ *Phoenix humilis*

Cheirolophus intybaceus
≡ *Centaurea intybacea*
= *Centaurea virgata*
= *Centaurea leucantha*

Chenopodium vulvaria

Cistanche phelypaea
≡ *Lathraea phelypaea*
= *Phelipaea lutea*
= *Cistanche lutea*

Cistus albidus — Estepa blanca — Jara blanca

Cistus clusii — Esteperola — Jaguarzo
– *Cistus libanotis*
– *Cistus libanotis*

Cistus salviifolius — Estepa borrera — Jaguarzo morisco

Convolvulus althaeoides — Corretjola — Corregüela grande

Convolvulus arvensis — Corretjola — Corregüela menor
= *Convolvulus segobricensis*

Convolvulus lanuginosus = *Convolvulus capitatus*	Campanera capdellana	Campanilla lanuda
Conyza bonariensis ≡ *Erigeron bonariensis* = *Conyza ambigua* = *Erigeron crispus*		
Coris monspeliensis		
Coris monspeliensis ssp. syrtica ≡ *Coris monspeliensis ssp. rivasiana* ≡ *Coris monspeliensis var. syrtica*		
Coronilla juncea	Ginestera	Coronilla de hoja fina
Coronilla minima ssp. lotoides ≡ *Coronilla lotoides* = *Coronilla clusii* = *Coronilla minima ssp. major* = *Coronilla minima ssp. clusii*	Coroneta valenciana	Coronilla de rey
Coronopus didymus ≡ *Lepidium didymum* ≡ *Senebiera didyma* = *Senebiera pinnatifida*		
Crossidium laevipilum		
Crupina crupinastrum ≡ *Centaurea crupinastrum* ≡ *Crupina vulgaris ssp. crupinastrum*		
Cuscuta epithymum ≡ *Cuscuta europaea var. epithymum* = *Cuscuta kotschyi* = *Cuscuta epithymum ssp. kotschyi*	Cabells de la Mare de Déu	Cuscuta
Daucus carota ssp. carota = *Daucus maritimus* = *Daucus carota ssp. maritimus*		
Delphinium gracile ≡ *Delphinium peregrinum ssp. gracile* = *Delphinium junceum* – *Delphinium peregrinum*		
Dianthus broteri = *Dianthus malacitanus* = *Dianthus serrulatus ssp. barbatus*	Clavellinera de pastor	Clavellinas de pluma
Dianthus broteri ssp. valentinus = *Dianthus valentinus*	Clavellinera de pastor	Clavellinas de pluma

Didymodon luridus		
Didymodon vinealis		
Digitalis obscura	Didalera	Digital negra
Diplotaxis erucoides ≡ *Sinapis erucoides* = *Diplotaxis valentina* = *Diplotaxis platystylos*	Ravenell	Rabaniza blanca
Diplotaxis ilorcitana ≡ *Pendulina ilorcitana* = *Diplotaxis gomez-campoi*	Ravenissa peluda	Jaramago de secarral
Diplotaxis lagascana ≡ *Diplotaxis harra ssp. lagascana* ≡ *Pendulina lagascana* = *Pendulina intricata* = *Pendulina webbiana* = *Diplotaxis harra ssp. intricata* – *Diplotaxis crassifolia*	Ravenissa groga	Jaramago de yesar
Diplotaxis viminea ≡ *Sisymbrium vimineum*		
Dittrichia viscosa ≡ *Erigeron viscosus* ≡ *Cupularia viscosa* ≡ *Inula viscosa*	Olivarda	Julivarda
Dorycnium pentaphyllum ≡ *Lotus dorycnium*		
Dorycnium pentaphyllum ssp. pentaphyllum = *Dorycnium suffruticosum*	Botgeta	Escobón
Echium creticum		
Echium humile = *Echium angustifolium*		
Elaeoselinum tenuifolium ≡ *Thapsia tenuifolia* ≡ *Distichoselinum tenuifolium* = *Elaeoselinum lagascae*	Julivert marí	Hinojo marino
Ephedra fragilis – *Ephedra altissima*		
Erianthus ravennae ≡ *Andropogon ravennae* ≡ *Saccharum ravennae*		

Erica multiflora	Petorreta	Brezo
Erodium chium ≡ *Geranium chium*		
Erodium neuradifolium = *Erodium aragonense* = *Erodium malacoides ssp. aragonense*		
Eruca vesicaria ≡ *Brassica vesicaria*		
Erucastrum virgatum ssp. baeticum ≡ *Sinapis baetica*	Ravenissa de roca	Jaramago de monte
Erucastrum virgatum ssp. brachycarpum ≡ *Erucastrum brachycarpum*	Cabeso d´or, ravenissa major	Jaramago de roca
Eryngium campestre	Panical	Cardo corredor
Fagonia cretica		
Ferula communis ssp. catalaunica ≡ *Ferula communis var. catalaunica* = *Ferula nodiflora* = *Ferula hispanica* – *Ferula tingitana*		
Filago fuscescens ≡ *Filago pyramidata ssp. fuscescens*		
Filago pyramidata = *Filago spathulata*	Herba del borm	Hierba algodonera
Frankenia laevis ≡ *Frankenia hirsuta var. laevis*		
Fumana ericifolia = *Fumana spachii* = *Fumana montana* = *Fumana spachii ssp. montana* = *Fumana ericoides ssp. montana*		
Fumana ericoides ≡ *Cistus ericoides* = *Fumana spachii ssp. robusta*	Jarilla	Esteperola
Fumana hispidula ≡ *Fumana glutinosa var. hispidula* ≡ *Fumana thymifolia var. hispidula* ≡ *Fumana laevis var. hispidula* ≡ *Fumana viscida ssp. hispidula*	Fals timó	Tomillo moruno

Fumana laevipes ≡ *Cistus laevipes*		
Fumana laevis ≡ *Cistus laevis* ≡ *Fumana glutinosa var. laevis* ≡ *Fumana thymifolia ssp. laevis*		
Fumana thymifolia ≡ *Cistus thymifolius* = *Cistus glutinosus* = *Fumana viscida* = *Helianthemum glutinosum* = *Fumana glutinosa*		
Galium setaceum = *Galium capillare*		
Glaucium corniculatum ≡ *Chelidonium corniculatum*		
Globularia alypum	Coroneta de frare	Coronilla de fraile
Gnaphalium luteoalbum ≡ *Laphangium luteo-album* ≡ *Pseudognaphalium luteo-album*		
Guiraoa arvensis	Ravanissa fina	Jaramago menor
Gypsophila struthium		Jabonera
Halogeton sativus ≡ *Salsola sativa* = *Salsola setifera*		
Hammada articulata ≡ *Caroxylon articulatum* ≡ *Haloxylon articulatum* = *Salsola articulata* – *Haloxylon tamariscifolium* – *Hammada tamariscifolia* – *Anabasis tamariscifolia*		
Haplophyllum linifolium ssp. rosmarinifolium ≡ *Ruta rosmarinifolia* = *Haplophyllum angustifolium*	Ruda mascle	Ruda silvestre
Helianthemum cinereum ≡ *Cistus cinereus*	Herba del setge	Jarilla
Helianthemum cinereum ssp. cinereum	Herba del setge	Jarilla
Helianthemum origanifolium ssp. glabratum = *Cistus dichotomus* = *Helianthemum origanifolium var. glabratum*	Setge, herba de setge	Hierba de hígado

Helianthemum squamatum ≡ *Cistus squamatus*		
Helianthemum syriacum ≡ *Cistus syriacus* = *Helianthemum thibaudii* = *Helianthemum syriacum ssp. thibaudii* – *Helianthemum racemosum* – *Helianthemum lavandulifolium*	Romer blanc	Romero blanco
Helianthemum violaceum ≡ *Cistus violaceus* ≡ *Helianthemum apenninum ssp. violaceum* ≡ *Helianthemum pilosum ssp. violaceum* = *Cistus racemosus* = *Cistus pilosus* = *Helianthemum lavandulifolium* = *Cistus strictus* = *Cistus linearis* = *Helianthemum racemosum* = *Helianthemum pilosum* = *Helianthemum lineare* = *Helianthemum strictum*		
Helichrysum serotinum ≡ *Helichrysum italicum* ≡ *Gnaphalium italicum* ≡ *Helichrysum italicum ssp. serotinum*	Sempreviva	Siempreviva
Helichrysum stoechas ≡ *Gnaphalium stoechas* = *Gnaphalium decumbens* = *Helichrysum decumbens*	Sempreviva borda	Siempreviva de monte
Helictotrichon filifolium ≡ *Avena filifolia*		
Heliotropium europaeum	Herba berruguera	Verrucaria
Herniaria cinerea ≡ *Herniaria hirsuta ssp. cinerea* = *Herniaria annua*		
Herniaria fruticosa	Herba del renyó	Matilla de la orina
Hippocrepis ciliata ≡ *Hippocrepis multisiliquosa ssp. ciliata* = *Hippocrepis annua*		
Hippocrepis scabra ≡ *Hippocrepis comosa ssp. scabra*	Ferradura	Hierba de la herradura
Hornungia petraea ≡ *Lepidium petraeum* ≡ *Hutchinsia petraea*		

Hyparrhenia hirta ≡ *Andropogon hirtus* = *Hyparrhenia podotricha*	Fenàs	Cebrillo
Hypericum ericoides	Trencapedres	Pinillo de oro
Hypericum perforatum	Pericó	Hipérico
Inula crithmoides		
Juncus acutus	Jonc agut	Junco
Juniperus oxycedrus		
Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus	Càdec	Enebro
Juniperus phoenicea ssp. phoenicea		
Lapiedra martinezii		
Launaea fragilis ≡ *Lactuca fragilis* = *Rhabdotheca chondrilloides* – *Zollikoferia resedifolia* – *Launaea resedifolia*		
Launaea nudicaulis ≡ *Chondrilla nudicaulis* ≡ *Microrhynchus nudicaulis* = *Prenanthes runcinata*		
Launaea pumila ≡ *Scorzonera pumila* ≡ *Launaea fragilis ssp. pumila* ≡ *Zollikoferia pumila* = *Sonchus scorzoneraeformis*	Llicsó bord	Falsa escorzonerilla
Lavandula latifolia	Espigol	Espliego
Lavandula multifida		
Lepidium draba ≡ *Cardaria draba*		
Limonium caesium ≡ *Statice caesia*		Sopaenvino
Limonium cossonianum	Trenca olla blanca	Limonio de flor blanca
Limonium parvibracteatum	Ensopeguera alacantina	Limonio alicantino

Limonium supinum ≡ *Statice supina*	Acelga de salobrar	Ensopeguera manxega
Lithodora fruticosa ≡ *Lithospermum fruticosum*	Herbeta de la sang	Sanguinaria
Lobularia maritima ≡ *Clypeola maritima* ≡ *Alyssum maritimum* ≡ *Koniga maritima*		
Lobularia maritima ssp. maritima	Caps blancs	Mastuerzo marino
Lonicera implexa = *Lonicera valentina*	Lligabosc	Madreselva
Lycium intricatum		
Lygeum spartum	Espart	Albardín
Malcolmia africana ≡ *Hesperis africana*		
Malva parviflora = *Malva microcarpa*	Malva	Malva de flor pequeña
Marrubium alysson		
Matthiola fruticulosa ≡ *Cheiranthus fruticulosus* = *Cheiranthus tristis* = *Matthiola varia* = *Matthiola tristis*	Violer trist	Alhelí de campo
Matthiola parviflora ≡ *Cheiranthus parviflorus*		
Medicago littoralis		
Mercurialis ambigua ≡ *Mercurialis annua ssp. ambigua* – *Mercurialis annua*	Melcoratge	Malcoraje
Misopates orontium ≡ *Antirrhinum orontium*		
Moricandia arvensis ≡ *Brassica arvensis*	Colletxó	Collejón
Moricandia moricandioides ≡ *Brassica moricandioides*		

Nerium oleander	Baladre	Adelfa
Olea europaea	Olivera	Olivo
Olea europaea ssp. sylvestris ≡ *Olea sylvestris* = *Olea oleaster*		
Ononis minutissima = *Ononis barbata*	Gavó menut	Anonis menor
Ophrys speculum = *Ophrys ciliata*	Mosques blaves	Espejo de Venus
Orobanche cernua		
Osyris lanceolata = *Osyris quadripartita*	Ginestó valencià	Bayón
Paronychia suffruticosa ≡ *Illecebrum suffruticosum* ≡ *Herniaria suffruticosa* = *Herniaria paniculata* = *Paronychia brevistipulata* = *Herniaria polygonoides*	Herbeta de la sang	Sanguinaria mayor
Phagnalon rupestre ≡ *Conyza rupestris*		
Phagnalon saxatile ≡ *Gnaphalium saxatile* = *Conyza intermedia*	Botgeta	Manzanilla yesquera
Phlomis crinita = *Phlomis barrelieri*	Orella de llop	Oreja de burro
Phlomis lychnitis	Orella de llebre	Oreja de liebre
Phlomis x composita = *Phlomis trullenquei*		
Phoenix canariensis		
Phragmites australis ≡ *Arundo australis* = *Arundo phragmites* = *Phragmites communis*	Senill	Carrizo
Phragmites australis ssp. australis		
Picris hispanica ≡ *Apargia hispanica* ≡ *Leontodon hispanicus*		

Pinus halepensis	Pi blanc	Pino carrasco
Piptatherum miliaceum	Ripoll	Mijo mayor
≡ *Agrostis miliacea* ≡ *Oryzopsis miliacea* = *Milium multiflorum* = *Piptatherum multiflorum*		
Piptatherum miliaceum ssp. miliaceum		
Pistacia lentiscus	Llentiscle	Lentisco
Plantago albicans	Penosella	Llantén blanquecino
Plantago amplexicaulis		
Plantago ovata		
Polycarpon tetraphyllum ssp. diphyllum		
≡ *Polycarpon diphyllum*		
Polycarpon tetraphyllum ssp. tetraphyllum	Policarp	
Polygala rupestris	Polígala	Hierba amarga
≡ *Lerrouxia ifniensis* = *Polygala juniperina* – *Polygala comosa* – *Polygala saxatilis*		
Portulaca oleracea ssp. oleracea		
Quercus coccifera	Coscoll	Coscoja
Quercus ilex ssp. rotundifolia		Carrasca
≡ *Quercus rotundifolia* = *Quercus ballota* = *Quercus ilex ssp. smilax* = *Quercus ilex ssp. ballota*		
Reichardia intermedia		
≡ *Picridium intermedium* ≡ *Reichardia picroides ssp. intermedia*		
Reichardia tingitana		
≡ *Scorzonera tingitana* ≡ *Picridium tingitanum* = *Picridium pinnatifidum*		
Reseda barrelieri	Frarot	Reseda mayor
≡ *Reseda fruticulosa ssp. barrelieri* = *Reseda macrostachya*		
Reseda phyteuma		
– *Reseda phyteuma ssp. media* – *Reseda media*		
Reseda undata		
Reseda undata ssp. leucantha		
≡ *Reseda leucantha* – *Reseda gayana* – *Reseda alba ssp. gayana*		
Rhamnus alaternus	Aladern	Aladiern
Rhamnus lycioides		
Rhamnus lycioides ssp. borgiae	Aranyoner	Espino negro
Rhamnus lycioides ssp. lycioides	Arçot	Espino negro
= *Rhamnus aragonensis*		
Rosmarinus officinalis	Romaní	Romero
Rosmarinus officinalis ssp. officinalis		
Rubia peregrina ssp. longifolia		
≡ *Rubia longifolia*		
Ruta angustifolia	Ruda	Ruda menor
≡ *Ruta chalepensis ssp. angustifolia*		
Salsola genistoides		
≡ *Caroxylon genistoides* = *Caroxylon tamariscifolium*		

Salsola oppositifolia – *Salsola longifolia* – *Salsola verticillata* – *Salsola fruticosa*		
Salsola soda *		Barrilla Común
Salsola vermiculata = *Salsola microphylla* = *Salsola flavescens*	Barrella	Caramillo
Salvia sclarea		
Sarcocornia fruticosa ≡ *Salicornia europaea var. fruticosa* ≡ *Salicornia fruticosa* ≡ *Arthrocnemum fruticosum*		
Satureja obovata ≡ *Satureja cuneifolia ssp. obovata*		
Satureja obovata ssp. canescens ≡ *Satureja cuneifolia var. canescens*	Cendrosa	Saborija blanca
Scorzonera angustifolia = *Scorzonera macrocephala* – *Scorzonera graminifolia*	Escurçonera barballera	Tetas de vaca
Sedum album = *Sedum micranthum* = *Sedum teretifolium*	Raïmet de Pastor	Uva de gato
Sedum sediforme ≡ *Sempervivum sediforme* = *Sedum altissimum* = *Sempervivum anomalum* = *Sedum nicaeense*	Raïmet de pastor	Uña de gato
Sedum sediforme ssp. sediforme		
Senecio malacitanus ≡ *Senecio nevadensis ssp. malacitanus* = *Senecio linifoliaster* = *Senecio linifolius*		
Serratula flavescens ssp. leucantha ≡ *Carduus leucanthus* ≡ *Klasea leucantha* ≡ *Klasea flavescens ssp. leucantha* ≡ *Serratula leucantha*	Clacida fina	Cardillo blanco
Sideritis leucantha	Rabet de gat	Rabo de gato
Sideritis leucantha ssp. leucantha = *Sideritis leucantha ssp. illicitana*	Rabet de gat	Rabo de gato
Sideritis montana ssp. ebracteata ≡ *Sideritis ebracteata*		
Silene diversifolia = *Silene rubella* = *Silene segetalis* = *Silene rubella ssp. segetalis*		
Silene sclerocarpa – *Silene cerastoides*		
Sisymbrium irio	Apagallums	Matacandil
Smilax aspera	Arítjol	Zarzaparrilla
Solanum elaeagnifolium		Tomatillo
Sonchus maritimus ssp. maritimus = *Sonchus loscosii* – *Sonchus crassifolius*		
Sonchus tenerrimus	Lletsó	Cerraja tierna
Stipa capensis = *Stipa tortilis* = *Stipa retorta*		
Stipa offneri = *Stipa fontanesii* – *Stipa juncea*		
Stipa parviflora		
Stipa tenacissima ≡ *Macrochloa tenacissima*	Espart	Esparto
Suaeda spicata ≡ *Salsola spicata* = *Cochliospermum hispanicum* – *Suaeda maritima*		
Suaeda splendens ≡ *Salsola splendens* = *Cochliospermum clementei*		
Suaeda vera – *Suaeda altissima* – *Suaeda fruticosa*		

Tamarix africana		
Tamarix boveana		
Tamarix canariensis = *Tamarix segobricensis*		
Teucrium buxifolium = *Teucrium saxatile*		
Teucrium buxifolium ssp. rivasii ≡ *Teucrium rivasii*	Poliol de roca	Poleo de roca
Teucrium capitatum ssp. gracillimum ≡ *Teucrium capitatum var. gracillimum*	Timó blanc	Tomillo macho
Teucrium carolipaui ≡ *Teucrium pumilum ssp. carolipaui* = *Teucrium carolipaui ssp. fontqueri*		
Teucrium libanitis = *Teucrium verticillatum* = *Teucrium pumilum ssp. verticillatum*	Timó mascle	Zamarrilla
Teucrium murcicum = *Teucrium polium ssp. aguilasense*	Poliol mascle	Poleo macho
Teucrium pseudochamaepitys	Cresta de gall	Falso pinillo
Teucrium ronnigeri ssp. ronnigeri		
Teucrium thymifolium ≡ *Teucrium buxifolium ssp. thymifolium* = *Teucrium buxifolium var. diversifolium* = *Teucrium caespitulosum* = *Teucrium petrophyllum*	Poliol amarg de roca	Poleo de roca
Teucrium x alvarezii		
Teucrium x robledoi		
Thapsia villosa		
Thesium humile – *Thesium arvense*		

Thymelaea argentata ≡ *Daphne argentata* = *Daphne nitida* = *Passerina segobricensis* = *Thymelaea pseudodioica* = *Passerina nitida* = *Thymelaea nitida*		
Thymelaea hirsuta ≡ *Passerina hirsuta*	Bufalaga hirsuta	Borja marina
Thymelaea tartonraira ssp. valentina ≡ *Passerina tartonraira var. valentina* ≡ *Thymelaea valentina* – *Passerina thomasii*	Bufalaga	Salamunda
Thymus hyemalis = *Thymus glandulosus* = *Thymus reuteri*		Tomillo fino
Thymus moroderi ≡ *Thymus longiflorus ssp. moroderi* = *Thymus longiflorus var. ciliatus*	Cantauesso	Cantahueso
Thymus vulgaris ssp. vulgaris		
Thymus x martinezii ≡ *Thymus funkii var. martinezii*		
Thymus zygis		
Thymus zygis ssp. gracilis ≡ *Thymus tenuifolius var. gracilis*		
Tortula atrovirens		
Urospermum picroides ≡ *Tragopogon picroides*	Amargot	Barba de viejo
Valantia hispida		

Viola arborescens	Violeta de la tardor	Violeta de otoño
Volutaria tubuliflora ≡ *Amberboa tubuliflora* – *Centaurea lippi* – *Volutaria lippi*		
Weissia condensa		
Withania frutescens ≡ *Atropa frutescens* = *Physalis suberosa*		Oroval
Xeranthemum inapertum ≡ *Xeranthemum annuum var. inapertum*		

** especies prioritarias*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

*** especies restringidas*

LISTADO FLORA Nº4: GRANJA DE ROCAMORA

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. lega
Artemisia barrelieri	Botja de saladar	Ontina	
Dianthus broteri = *Dianthus malacitanus* = *Dianthus serrulatus ssp. barbatus*	Clavellinera de pastor	Clavellinas de pluma	
Ferula communis ssp. catalaunica ≡ *Ferula communis var. catalaunica* = *Ferula nodiflora* = *Ferula hispanica* – *Ferula tingitana*			
Lavandula multifida			
Orobanche cernua			
Paronychia suffruticosa ≡ *Illecebrum suffruticosum* ≡ *Herniaria suffruticosa* = *Herniaria paniculata* = *Paronychia brevistipulata* = *Herniaria polygonoides*	Herbeta de la sang	Sanguinaria mayor	
Phoenix canariensis			
Rhamnus lycioides			
Satureja obovata ≡ *Satureja cuneifolia ssp. obovata*			
Sedum rubens ≡ *Crassula rubens*			
Thymus hyemalis = *Thymus glandulosus* = *Thymus reuteri*		Tomillo fino	
Umbilicus gaditanus = *Umbilicus rupestris ssp. gaditanus* – *Umbilicus rupestris ssp. horizontalis* – *Umbilicus horizontalis*			
Verbascum sinuatum	Herba plorosa	Gordolobo ccenicero	
Withania frutescens ≡ *Atropa frutescens* = *Physalis suberosa*		Oroval	
Ziziphus lotus			

** especies prioritarias*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

*** especies restringidas*

LISTADO FLORA Nº5: COX

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Agave americana	Pitera	Agave	
Aizoon hispanicum			
Ajuga iva ssp. iva			
Allium melananthum	All negre	Ajo de flor negra	
Anacyclus valentinus	Panigroc valencià	Manzanilla valenciana	
Anagallis arvensis ssp. arvensis = *Anagallis arvensis ssp. phoenicea* = *Anagallis arvensis ssp. latifolia* = *Anagallis arvensis ssp. parviflora*			
Andryala ragusina = *Andryala lyrata*			
Anthyllis cytisoides	Albaida	Albaida	
Anthyllis tetraphylla ≡ *Tripodion tetraphyllum* ≡ *Physanthyllis tetraphylla*	Trèvol de mamella de vaca	Vulneraria de cuatro hojas	
Arenaria montana ≡ *Willwebera montana*			
Arenaria montana ssp. intricata ≡ *Arenaria montana var. intricata* ≡ *Arenaria intricata* = *Arenaria segobricensis* = *Arenaria montana ssp. linearifolia*	Herba pixadora	Arenaria	
Artemisia alba = *Artemisia camphorata* = *Artemisia fruticosa* = *Artemisia alba ssp. fruticosa*			
Artemisia campestris ssp. glutinosa ≡ *Artemisia glutinosa* = *Artemisia variabilis*			
Artemisia herba-alba			
Artemisia lucentica ≡ *Artemisia hispanica* – *Artemisia reptans*	Donzell	Ontina	
Arundo donax – *Arundo mauritanica*	Canya	Caña	
Asparagus albus			
Asparagus horridus = *Asparagus stipularis*	Esparreguera de menjar	Esparraguera	
Asperula cynanchica = *Asperula cynanchica ssp. brachysiphon*			
Asphodelus ayardii			
Asphodelus cerasiferus – *Asphodelus albus* – *Asphodelus ramosus*			
Asphodelus fistulosus	Gamonet	Gamoncillo	
Asphodelus fistulosus ssp. cirerae ≡ *Asphodelus cirerae*			
Asphodelus tenuifolius ≡ *Asphodelus fistulosus ssp. tenuifolius*			
Asplenium petrarchae ssp. petrarchae = *Asplenium glandulosum*		Falzia glandulosa	
Asteriscus spinosus ≡ *Buphtalmum spinosum* ≡ *Pallenis spinosa*			
Athalamia spathysii			
Atractylis cancellata			
Atractylis humilis ≡ *Erigeron canadensis*	Card hereu	Cardo heredero	
Atriplex glauca			
Atriplex halimus = *Atriplex serrulata*			
Ballota hirsuta ≡ *Echeandia hirsuta* ≡ *Zapateria hirsuta* = *Ballota mollissima* – *Ballota hispanica*	Marrubi hirsut	Flor rubí	

Bellis annua
= *Bellis annua ssp. microcephala*

Beta maritima | Bleda borda | Acelga silvestre
≡ *Beta vulgaris ssp. maritima*

Bombycilaena erecta
≡ *Micropus erectus*

Brachypodium distachyon
≡ *Bromus distachyos*
≡ *Trachynia distachya*

Brachypodium retusum | Cerverol | Fenazo
≡ *Bromus retusus*
= *Bromus plukenetii*
= *Brachypodium plukenetii*
= *Brachypodium ramosum*

Brassica fruticulosa

Brassica fruticulosa ssp. cossoniana
≡ *Brassica cossoniana*

Bromus madritensis

Bromus rubens | Estripa-sacs | Bromo

Bryum radiculosum

Bupleurum fruticescens | Ajocaperdius | Cuchilleja

Calendula officinalis

Campanula erinus

Carex halleriana | Lastoncillo

Carlina hispanica
≡ *Carlina corymbosa ssp. hispanica*
– *Carlina corymbosa*

Carrichtera annua
≡ *Vella annua*
= *Carrichtera vellae*

Carthamus arborescens
≡ *Kentrophyllum arborescens*
= *Carthamus hircinus*

Carthamus lanatus ssp. lanatus

Centaurea melitensis

Centaurea saxicola
≡ *Centaurea ornata ssp. saxicola*

Cephaloziella baumgartneri

Cerastium semidecandrum
= *Cerastium pentandrum*
= *Cerastium balearicum*
– *Cerastium siculum*

Ceratonia siliqua | Garrofer | Algarrobo

Ceterach officinarum | Dauradeta | Doradilla
≡ *Asplenium ceterach*

Chamaerops humilis | Margalló | Palmito
≡ *Phoenix humilis*

Cheilanthes acrostica
≡ *Pteris acrosticha*
≡ *Cheilanthes pteridioides ssp. acrosticha*
= *Cheilanthes odora*
– *Cheilanthes fragrans*
– *Cheilanthes pteridioides*

Cheirolophus intybaceus
≡ *Centaurea intybacea*
= *Centaurea virgata*
= *Centaurea leucantha*

Cistus albidus | Estepa blanca | Jara blanca

Clematis flammula
= *Clematis maritima*

Convolvulus althaeoides | Corretjola | Corregüela grande

Convolvulus arvensis | Corretjola | Corregüela menor
= *Convolvulus segobricensis*

Convolvulus siculus

Coris monspeliensis

Coris monspeliensis ssp. syrtica
≡ *Coris monspeliensis ssp. rivasiana*
≡ *Coris monspeliensis var. syrtica*

Coronilla juncea	Ginestera	Coronilla de hoja fina
Coronilla minima ssp. lotoides	Coroneta valenciana	Coronilla de rey
≡ *Coronilla lotoides* = *Coronilla clusii* = *Coronilla minima ssp. major* = *Coronilla minima ssp. clusii*		
Cosentinia vellea		Doradilla vellosa
≡ *Acrostichum velleum* ≡ *Cheilanthes vellea* ≡ *Notholaena vellea* = *Acrostichum lanuginosum* = *Cheilanthes catanensis* = *Notholaena lanuginosa*		
Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia		
≡ *Crepis taraxacifolia* = *Crepis recognita* = *Barkhausia haenseleri* = *Crepis hackeli* = *Crepis vesicaria ssp. haenseleri*		
Crupina vulgaris		
≡ *Centaurea crupina*		
Cuscuta epithymum	Cabells de la Mare de Déu	Cuscuta
≡ *Cuscuta europaea var. epithymum* = *Cuscuta kotschyi* = *Cuscuta epithymum ssp. kotschyi*		
Cuscuta planiflora		
= *Cuscuta brevistyla*		
Cylindropuntia pallida		
– *Cylindropuntia rosea* – *Opuntia rosea* – *Cylindropuntia tunicata* – *Opuntia tunicata* – *Cactus tunicatus*		
Cynodon dactylon	Gespa	Césped
≡ *Panicum dactylon*		
Dactylis glomerata ssp. hispanica		
≡ *Dactylis hispanica*		
Dianthus broteri	Clavellinera de pastor	Clavellinas de pluma
= *Dianthus malacitanus* = *Dianthus serrulatus ssp. barbatus*		
Dianthus broteri ssp. valentinus	Clavellinera de pastor	Clavellinas de pluma
= *Dianthus valentinus*		
Dichantium ischaemum		
≡ *Andropogon ischaemum* ≡ *Bothriochloa ischaemum*		
Didymodon fallax		
Didymodon luridus		
Didymodon rigidulus		
Dipcadi serotinum	Marcet	Falso narciso
≡ *Hyacinthus serotinus* ≡ *Uropetalum serotinum* = *Hyacinthus fulvus* = *Dipcadi fulvum*		
Diplotaxis erucoides	Ravenell	Rabaniza blanca
≡ *Sinapis erucoides* = *Diplotaxis valentina* = *Diplotaxis platystylos*		
Diplotaxis ilorcitana	Ravenissa peluda	Jaramago de secarral
≡ *Pendulina ilorcitana* = *Diplotaxis gomez-campoi*		
Diplotaxis lagascana	Ravenissa groga	Jaramago de yesar
≡ *Diplotaxis harra ssp. lagascana* ≡ *Pendulina lagascana* = *Pendulina intricata* = *Pendulina webbiana* = *Diplotaxis harra ssp. intricata* – *Diplotaxis crassifolia*		
Dittrichia viscosa	Olivarda	Julivarda
≡ *Erigeron viscosus* ≡ *Cupularia viscosa* ≡ *Inula viscosa*		
Echium creticum		
Echium creticum		
Echium creticum ssp. coincyanum	Viperina	Viborera
≡ *Echium coincyanum* ≡ *Echium vulgare ssp. coincyanum* = *Echium lagascae* = *Echium granatense* = *Echium vulgare ssp. granatense*		
Elaeoselinum asclepium		
≡ *Thapsia asclepium* = *Elaeoselinum meoides var. hispanica* = *Elaeoselinum hispanicum* – *Elaeoselinum meoides*		

Elaeoselinum tenuifolium	Julivert marí	Hinojo marino
≡ *Thapsia tenuifolia*		
≡ *Distichoselinum tenuifolium*		
= *Elaeoselinum lagascae*		
Ephedra fragilis		
– *Ephedra altissima*		
Eragrostis papposa		
≡ *Poa papposa*		
Erodium chium		
≡ *Geranium chium*		
Erodium ciconium		
≡ *Geranium ciconium*		
Erodium cicutarium		
≡ *Geranium cicutarium*		
Erodium malacoides	Agulletes	Filamaría
≡ *Geranium malacoides*		
Eruca vesicaria ssp. sativa		
≡ *Eruca sativa*		
= *Eruca longirostris*		
= *Eruca sativa ssp. longirostris*		
= *Eruca vesicaria ssp. longirostris*		
Eryngium campestre	Panical	Cardo corredor
Euphorbia exigua ssp. exigua		
Euphorbia flavicoma	Lletera	Lechera
= *Euphorbia mariolensis*		
= *Euphorbia flavicoma ssp. mariolensis*		
= *Euphorbia polygalifolia ssp. mariolensis*		
– *Euphorbia verrucosa*		
– *Euphorbia epithymoides*		
Euphorbia helioscopia ssp. helioscopia		
Euphorbia serrata	Lletera de vinya	Lechetrezna serrada
Euphorbia squamigera		
= *Euphorbia rupicola*		
= *Euphorbia carthaginensis*		
– *Euphorbia monchiquensis*		
Fagonia cretica		
Filago fuscescens		
≡ *Filago pyramidata ssp. fuscescens*		

Fissidens bryoides		
Foeniculum vulgare		Hinojo amargo
≡ *Anethum foeniculum*		
= *Anethum piperitum*		
Fossombronia caespitiformis		
Frankenia pulverulenta		
Fumana ericifolia		
= *Fumana spachii*		
= *Fumana montana*		
= *Fumana spachii ssp. montana*		
= *Fumana ericoides ssp. montana*		
Fumana ericoides	Jarilla	Esteperola
≡ *Cistus ericoides*		
= *Fumana spachii ssp. robusta*		
Fumana laevipes		
≡ *Cistus laevipes*		
Fumana laevis		
≡ *Cistus laevis*		
≡ *Fumana glutinosa var. laevis*		
≡ *Fumana thymifolia ssp. laevis*		
Fumana thymifolia		
≡ *Cistus thymifolius*		
= *Cistus glutinosus*		
= *Fumana viscida*		
= *Helianthemum glutinosum*		
= *Fumana glutinosa*		
Fumaria melillaica		
≡ *Fumaria capreolata ssp. melillaica*		
– *Fumaria macrosepala*		
Galactites duriaei		
Galactites tomentosa	Card blanc	Cardota
≡ *Centaurea galactites*		
Galium setaceum		
= *Galium capillare*		
Genista valentina	Ginestell	Retama amarilla
Genista valentina ssp. valentina	Ginestell, ginesta fina	Retama, hiniesta
≡ *Spartium valentinum*		
≡ *Genista cinerea ssp. valentina*		
= *Genista murcica*		
= *Genista cinerea ssp. murcica*		
= *Genista valentina ssp. murcica*		

Geranium purpureum

≡ *Geranium robertianum ssp. purpureum*

Gladiolus communis

Globularia alypum — Coroneta de frare — Coronilla de fraile

Grimmia orbicularis

Hammada articulata

≡ *Caroxylon articulatum*
≡ *Haloxylon articulatum*
= *Salsola articulata*
– *Haloxylon tamariscifolium*
– *Hammada tamariscifolia*
– *Anabasis tamariscifolia*

Hedysarum spinosissimum

Helianthemum violaceum

≡ *Cistus violaceus*
≡ *Helianthemum apenninum ssp. violaceum*
≡ *Helianthemum pilosum ssp. violaceum*
= *Cistus racemosus*
= *Cistus pilosus*
= *Helianthemum lavandulifolium*
= *Cistus strictus*
= *Cistus linearis*
= *Helianthemum racemosum*
= *Helianthemum pilosum*
= *Helianthemum lineare*
= *Helianthemum strictum*

Helichrysum serotinum — Sempreviva — Siempreviva

≡ *Helichrysum italicum*
≡ *Gnaphalium italicum*
≡ *Helichrysum italicum ssp. serotinum*

Helichrysum stoechas — Sempreviva borda — Siempreviva de monte

≡ *Gnaphalium stoechas*
= *Gnaphalium decumbens*
= *Helichrysum decumbens*

Helictotrichon filifolium

≡ *Avena filifolia*

Herniaria cinerea

≡ *Herniaria hirsuta ssp. cinerea*
= *Herniaria annua*

Heteropogon contortus

≡ *Andropogon contortus*
= *Andropogon allionii*
= *Heteropogon glaber*
= *Heteropogon allionii*

Hippocrepis ciliata

≡ *Hippocrepis multisiliquosa ssp. ciliata*
= *Hippocrepis annua*

Hordeum murinum ssp. leporinum — Margall bord — Cebadilla de ratón

≡ *Hordeum leporinum*

Hyparrhenia hirta — Fenàs — Cebrillo

≡ *Andropogon hirtus*
= *Hyparrhenia podotricha*

Hyparrhenia sinaica

≡ *Andropogon sinaicus*
≡ *Hyparrhenia hirta ssp. pubescens*
= *Andropogon pubescens*

Inula crithmoides

Jasonia glutinosa

≡ *Erigeron glutinosus*
≡ *Chiliadenus glutinosus*
= *Inula saxatilis*
= *Chrysocoma verticalis*
= *Jasonia saxatilis*
= *Chiliadenus saxatilis*

Jasonia tuberosa

≡ *Erigeron tuberosus*
≡ *Inula tuberosa*
= *Jasonia obtusifolia*

Juniperus phoenicea ssp. phoenicea

Lamarckia aurea — Cua de gos — Cepillitos

≡ *Cynosurus aureus*

Lantana camara — Banderita española

Lapiedra martinezii

Launaea arborescens *

≡ *Zollikoferia arborescens*

Launaea fragilis

≡ *Lactuca fragilis*
= *Rhabdotheca chondrilloides*
– *Zollikoferia resedifolia*
– *Launaea resedifolia*

Launaea nudicaulis

≡ *Chondrilla nudicaulis*
≡ *Microrhynchus nudicaulis*
= *Prenanthes runcinata*

Launaea pumila	Llicsó bord	Falsa escorzonerilla
≡ *Scorzonera pumila* ≡ *Launaea fragilis ssp. pumila* ≡ *Zollikoferia pumila* = *Sonchus scorzoneraeformis*		
Lavandula multifida		
Lavatera maritima		
= *Lavatera africana*		
Leontodon longirrostris		
≡ *Leontodon taraxacoides ssp. longirrostris* = *Leontodon saxatilis ssp. rothii* = *Thrincia nudicalyx* = *Leontodon saxatilis ssp. hispidus* = *Leontodon taraxacoides ssp. hispidus* – *Thrincia hispida* – *Leontodon rothii*		
Leucanthemum decipiens		
≡ *Leucanthemum paludosum ssp. decipiens* ≡ *Mauranthemum decipiens*		
Limonium echioides	Lletugueta menuda	Limonio enano
≡ *Statice echioides*		
Linum strictum		
= *Linum corymbulosum* = *Linum strictum ssp. corymbulosum*		
Lobularia maritima		
≡ *Clypeola maritima* ≡ *Alyssum maritimum* ≡ *Koniga maritima*		
Lobularia maritima ssp. maritima	Caps blancs	Mastuerzo marino
Lygeum spartum	Espart	Albardín
Malva parviflora	Malva	Malva de flor pequeña
= *Malva microcarpa*		
Matthiola parviflora		
≡ *Cheiranthus parviflorus*		
Medicago littoralis		
Medicago minima		
≡ *Medicago polymorpha var. minima*		
Melica minuta		

Mercurialis ambigua	Melcoratge	Malcoraje
≡ *Mercurialis annua ssp. ambigua* – *Mercurialis annua*		
Misopates microcarpum		
≡ *Antirrhinum microcarpum* = *Misopates orontium var. pusillus* = *Misopates orontium ssp. pusillus*		
Misopates orontium		
≡ *Antirrhinum orontium*		
Moricandia arvensis	Colletxó	Collejón
≡ *Brassica arvensis*		
Nerium oleander	Baladre	Adelfa
Nicotiana glauca	Tabac de jardí	Tabaco moro
Nigella damascena		
Olea europaea ssp. europaea		
Olea europaea ssp. sylvestris		
≡ *Olea sylvestris* = *Olea oleaster*		
Ononis minutissima	Gavó menut	Anonis menor
= *Ononis barbata*		
Ononis sicula		
= *Ononis leptocarpa*		
Ophrys speculum	Mosques blaves	Espejo de Venus
= *Ophrys ciliata*		
Orobanche cernua		
Osyris lanceolata	Ginestó valencià	Bayón
= *Osyris quadripartita*		
Oxalis corniculata		
Oxalis pes-caprae	Agret	Agrios
= *Oxalis cernua*		
Parietaria judaica	Blet de paret	Albahaca de río
= *Parietaria diffusa* – *Parietaria officinalis*		
Parietaria lusitanica		

Paronychia argentea	Herba de neu	Nevadilla
≡ *Illecebrum paronychia* = *Paronychia saguntina*		
Paronychia capitata		
≡ *Illecebrum capitatum* = *Paronychia nivea*		
Paronychia suffruticosa	Herbeta de la sang	Sanguinaria mayor
≡ *Illecebrum suffruticosum* ≡ *Herniaria suffruticosa* = *Herniaria paniculata* = *Paronychia brevistipulata* = *Herniaria polygonoides*		
Periploca angustifolia		
≡ *Periploca laevigata ssp. angustifolia* ≡ *Periploca laevigata*		
Phagnalon rupestre		
≡ *Conyza rupestris*		
Phagnalon saxatile	Botgeta	Manzanilla yesquera
≡ *Gnaphalium saxatile* = *Conyza intermedia*		
Phlomis lychnitis	Orella de llebre	Oreja de liebre
Picris echioides	Arpell	Lengua de gato
≡ *Helminthia echioides*		
Pinus halepensis	Pi blanc	Pino carrasco
Piptatherum coerulescens		
≡ *Milium coerulescens* ≡ *Oryzopsis coerulescens*		
Piptatherum miliaceum ssp. miliaceum		
Plagiochasma rupestre		
Plantago afra		
Plantago albicans	Penosella	Llantén blanquecino
Plantago amplexicaulis		
Plantago lagopus	Herba de cinc nervis	Pie de liebre
= *Plantago lagopus ssp. cylindrica*		
Plantago sempervirens	Matafoc	Zaragatona
– *Plantago cynops*		

Polycarpon tetraphyllum ssp. tetraphyllum	Policarp	
Polygala rupestris	Polígala	Hierba amarga
≡ *Lerrouxia ifniensis* = *Polygala juniperina* – *Polygala comosa* – *Polygala saxatilis*		
Polygala vulgaris		
Psoralea bituminosa		
≡ *Bituminaria bituminosa* = *Psoralea plumosa*		
Reichardia tingitana		
≡ *Scorzonera tingitana* ≡ *Picridium tingitanum* = *Picridium pinnatifidum*		
Reseda phyteuma		
– *Reseda phyteuma ssp. media* – *Reseda media*		
Reseda undata		
Reseda undata ssp. leucantha		
≡ *Reseda leucantha* – *Reseda gayana* – *Reseda alba ssp. gayana*		
Reseda undata ssp. undata	Fraret	Reseda
Retama sphaerocarpa		
≡ *Spartium sphaerocarpos* ≡ *Lygos monosperma*		
Rhamnus alaternus	Aladern	Aladiern
Rhamnus lycioides		

Sanguisorba minor ssp. spachiana
≡ *Poterium spachianum*
= *Poterium verrucosum*
= *Poterium magnolii*
= *Sanguisorba mauritanica*
= *Sanguisorba minor ssp. magnolii*
= *Poterium mauritanicum*
= *Sanguisorba verrucosa*

Satureja obovata
≡ *Satureja cuneifolia ssp. obovata*

Satureja obovata ssp. canescens — Cendrosa — Saborija blanca
≡ *Satureja cuneifolia var. canescens*

Scabiosa atropurpurea — Cardeta marítima — Bella dama
≡ *Sixalix atropurpurea*
= *Scabiosa maritima var. sabuletorum*
= *Scabiosa maritima var. albida*
= *Scabiosa maritima*

Scabiosa stellata
≡ *Lomelosia stellata*
= *Scabiosa monspeliensis*
= *Scabiosa monspeliensis var. subacaulis*
= *Scabiosa stellata ssp. monspeliensis*

Schismus barbatus
≡ *Festuca barbata*
= *Festuca calycina*
= *Schismus marginatus*
= *Schismus calycinus*

Scorpiurus subvillosus — Orella de ratolí — Hierba del escorpión
≡ *Scorpiurus muricatus ssp. subvillosus*

Scorzonera laciniata
≡ *Podospermum laciniatum*
= *Scorzonera calcitrapifolia*
= *Podospermum calcitrapifolium*

Sedum album — Raïmet de Pastor — Uva de gato

Sanguisorba minor ssp. spachiana
≡ *Poterium spachianum*
= *Poterium verrucosum*
= *Poterium magnolii*
= *Sanguisorba mauritanica*
= *Sanguisorba minor ssp. magnolii*
= *Poterium mauritanicum*
= *Sanguisorba verrucosa*

Satureja obovata
≡ *Satureja cuneifolia ssp. obovata*

Satureja obovata ssp. canescens — Cendrosa — Saborija blanca
≡ *Satureja cuneifolia var. canescens*

Scabiosa atropurpurea — Cardeta marítima — Bella dama
≡ *Sixalix atropurpurea*
= *Scabiosa maritima var. sabuletorum*
= *Scabiosa maritima var. albida*
= *Scabiosa maritima*

Scabiosa stellata
≡ *Lomelosia stellata*
= *Scabiosa monspeliensis*
= *Scabiosa monspeliensis var. subacaulis*
= *Scabiosa stellata ssp. monspeliensis*

Schismus barbatus
≡ *Festuca barbata*
= *Festuca calycina*
= *Schismus marginatus*
= *Schismus calycinus*

Scorpiurus subvillosus — Orella de ratolí — Hierba del escorpión
≡ *Scorpiurus muricatus ssp. subvillosus*

Scorzonera laciniata
≡ *Podospermum laciniatum*
= *Scorzonera calcitrapifolia*
= *Podospermum calcitrapifolium*

Sedum album — Raïmet de Pastor — Uva de gato

Rhamnus lycioides

Rhamnus lycioides ssp. lycioides — Arçot — Espino negro
= *Rhamnus aragonensis*

Rosa agrestis
= *Rosa graveolens*
= *Rosa sepium*

Rosmarinus officinalis — Romaní — Romero

Rosmarinus officinalis ssp. officinalis

Sanguisorba minor ssp. spachiana
- ≡ *Poterium spachianum*
- = *Poterium verrucosum*
- = *Poterium magnolii*
- = *Sanguisorba mauritanica*
- = *Sanguisorba minor ssp. magnolii*
- = *Poterium mauritanicum*
- = *Sanguisorba verrucosa*

Satureja obovata
- ≡ *Satureja cuneifolia ssp. obovata*

Satureja obovata ssp. canescens — Cendrosa — Saborija blanca
- ≡ *Satureja cuneifolia var. canescens*

Scabiosa atropurpurea — Cardeta marítima — Bella dama
- ≡ *Sixalix atropurpurea*
- = *Scabiosa maritima var. sabuletorum*
- = *Scabiosa maritima var. albida*
- = *Scabiosa maritima*

Scabiosa stellata
- ≡ *Lomelosia stellata*
- = *Scabiosa monspeliensis*
- = *Scabiosa monspeliensis var. subacaulis*
- = *Scabiosa stellata ssp. monspeliensis*

Schismus barbatus
- ≡ *Festuca barbata*
- = *Festuca calycina*
- = *Schismus marginatus*
- = *Schismus calycinus*

Scorpiurus subvillosus — Orella de ratolí — Hierba del escorpión
- ≡ *Scorpiurus muricatus ssp. subvillosus*

Scorzonera laciniata
- ≡ *Podospermum laciniatum*
- = *Scorzonera calcitrapifolia*
- = *Podospermum calcitrapifolium*

Sedum album — Raïmet de Pastor — Uva de gato
- = *Sedum micranthum*
- = *Sedum teretifolium*

Sedum dasyphyllum ssp. dasyphyllum

Sedum dasyphyllum ssp. glanduliferum
- ≡ *Sedum glanduliferum*

Sedum rubens
- ≡ *Crassula rubens*

Sedum sediforme — Raïmet de pastor — Uña de gato
- ≡ *Sempervivum sediforme*
- = *Sedum altissimum*
- = *Sempervivum anomalum*
- = *Sedum nicaeense*

Sedum sediforme ssp. dianium
- ≡ *Sedum sediforme var. dianium*
- ≡ *Sedum nicaeense ssp. dianium*

Serratula nudicaulis
- ≡ *Centaurea nudicaulis*
- ≡ *Klasea nudicaulis*
- = *Carduus glaucus*
- = *Serratula albarracinensis*

Sideritis glauca * — Rabet de gat — Rabo de gato rosado
- ≡ *Sideritis incana ssp. glauca*

Sideritis leucantha ssp. leucantha — Rabet de gat — Rabo de gato
- = *Sideritis leucantha ssp. illicitana*

Sideritis murgetana

Silene diversifolia
- = *Silene rubella*
- = *Silene segetalis*
- = *Silene rubella ssp. segetalis*

Silene inaperta

Sisymbrium irio — Apagallums — Matacandil

Sonchus asper ssp. asper
- ≡ *Sonchus arvensis var. asper*

Sonchus asper ssp. glaucescens
- ≡ *Sonchus glaucescens*

Sonchus tenerrimus ssp. tenerrimus

Spergularia rubra
- ≡ *Arenaria rubra*
- = *Spergularia campestris*

Stipa capensis
- = *Stipa tortilis*
- = *Stipa retorta*

Stipa parviflora

Stipa tenacissima ≡ *Macrochloa tenacissima*	Espart	Esparto
Suaeda vera – *Suaeda altissima* – *Suaeda fruticosa*		
Tamarix canariensis = *Tamarix segobricensis*		
Tanacetum parthenium ≡ *Matricaria parthenium* ≡ *Leucanthemum parthenium* ≡ *Pyrethrum parthenium* ≡ *Chrysanthemum parthenium*		
Teucrium buxifolium = *Teucrium saxatile*		
Teucrium buxifolium ssp. rivasii ≡ *Teucrium rivasii*	Poliol de roca	Poleo de roca
Teucrium capitatum ssp. gracillimum ≡ *Teucrium capitatum var. gracillimum*	Timó blanc	Tomillo macho
Teucrium freynii = *Teucrium quadratulum var. ambiguum*	Trencapedres	Poleo de roca
Teucrium pseudochamaepitys	Cresta de gall	Falso pinillo
Teucrium ronnigeri ssp. lagunae		
Thesium humifusum ≡ *Thesium divaricatum* = *Thesium humifusum ssp. divaricatum* – *Thesium linophyllum*		
Thesium humile – *Thesium arvense*		
Thymelaea hirsuta ≡ *Passerina hirsuta*	Bufalaga hirsuta	Borja marina
Thymus hyemalis = *Thymus glandulosus* = *Thymus reuteri*		Tomillo fino
Thymus vulgaris ssp. aestivus ≡ *Thymus aestivus*	Timonet, timó, farigola	Tomillo, tomillo borde
Thymus vulgaris ssp. vulgaris		

Timmiella barbuloides		
Tortella nitida		
Tortula muralis ssp. obcordata		
Trichostomum brachydontium		
Trichostomum crispulum		
Trigonella polyceratia ssp. polyceratia		
Umbilicus gaditanus = *Umbilicus rupestris ssp. gaditanus* – *Umbilicus rupestris ssp. horizontalis* – *Umbilicus horizontalis*		
Urospermum picroides ≡ *Tragopogon picroides*	Amargot	Barba de viejo
Valantia hispida		
Verbascum sinuatum	Herba plorosa	Gordolobo ccenicero
Weissia condensa		
Withania frutescens ≡ *Atropa frutescens* = *Physalis suberosa*		Oroval
Zygophyllum fabago		

** especies prioritarias*

*** especies restringidas*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

LISTADO FLORA Nº6: REDOVÁN

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Allium melananthum	All negre	Ajo de flor negra	
Aptenia cordifolia ≡ *Mesembryanthemum cordifolium*			
Apteranthes munbyana ssp. hispanica * ≡ *Boucerosia munbyana var. hispanica* ≡ *Caralluma munbyana ssp. hispanica* ≡ *Boucerosia hispanica*		Chumberillo de lobo	
Athalamia spathysii			
Barbula convoluta			
Brasiliopuntia brasiliensis ≡ *Cactus brasiliensis* ≡ *Opuntia brasiliensis*			
Brassica fruticulosa ssp. cossoniana ≡ *Brassica cossoniana*			
Bryum bicolor			
Centaurea saxicola ≡ *Centaurea ornata ssp. saxicola*			
Cheilanthes acrostica ≡ *Pteris acrosticha* ≡ *Cheilanthes pteridioides ssp. acrosticha* = *Cheilanthes odora* – *Cheilanthes fragrans* – *Cheilanthes pteridioides*			
Commicarpus africanus * ≡ *Boerhavia africana* = *Boerhavia plumbaginea* = *Commicarpus plumbagineus*			
Cosentinia vellea ≡ *Acrostichum velleum* ≡ *Cheilanthes vellea* ≡ *Notholaena vellea* = *Acrostichum lanuginosum* = *Cheilanthes catanensis* = *Notholaena lanuginosa*		Doradilla vellosa	
Delphinium gracile ≡ *Delphinium peregrinum ssp. gracile* = *Delphinium junceum* – *Delphinium peregrinum*			
Didymodon vinealis			
Echium creticum ssp. coincyanum ≡ *Echium coincyanum* ≡ *Echium vulgare ssp. coincyanum* = *Echium lagascae* = *Echium granatense* = *Echium vulgare ssp. granatense*	Viperina	Viborera	
Fissidens bryoides			
Genista valentina	Ginestell	Retama amarilla	
Genista valentina ssp. valentina ≡ *Spartium valentinum* ≡ *Genista cinerea ssp. valentina* = *Genista murcica* = *Genista cinerea ssp. murcica* = *Genista valentina ssp. murcica*	Ginestell, ginesta fina	Retama, hiniesta	
Kalanchoe daigremontiana			
Lafuentea rotundifolia	Orelleta de penya	Orejilla de roca	
Lavandula multifida			
Lavatera maritima = *Lavatera africana*			
Lycium intricatum			
Maytenus senegalensis ssp. europaea * ≡ *Celastrus europaeus* ≡ *Gymnosporia europaea* ≡ *Catha europaea*			
Misopates microcarpum ≡ *Antirrhinum microcarpum* = *Misopates orontium var. pusillus* = *Misopates orontium ssp. pusillus*			
Orobanche portoilicitana ≡ *Phelipanche portoilicitana*			
Osyris lanceolata = *Osyris quadripartita*	Ginestó valencià	Bayón	
Parietaria judaica = *Parietaria diffusa* – *Parietaria officinalis*	Blet de paret	Albahaca de río	

Periploca angustifolia ≡ *Periploca laevigata ssp. angustifolia* ≡ *Periploca laevigata*		
Pinus halepensis	Pi blanc	Pino carrasco
Plagiochasma rupestre		
Plantago amplexicaulis		
Pottia lanceolata		
Rhamnus lycioides		
Rhodalsine geniculata ≡ *Arenaria geniculata* ≡ *Minuartia geniculata* = *Arenaria procumbens* = *Arenaria extensa* = *Alsine procumbens*		
Sarcocapnos enneaphylla ≡ *Fumaria enneaphylla*	Herba freixurera	Zapatitos de la Virgen
Sedum rubens ≡ *Crassula rubens*		
Sideritis glauca * ≡ *Sideritis incana ssp. glauca*	Rabet de gat	Rabo de gato rosado
Teucrium ronnigeri ssp. lagunae		
Tortula atrovirens		
Trichostomum brachydontium		
Urospermum picroides ≡ *Tragopogon picroides*	Amargot	Barba de viejo

** especies prioritarias*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

*** especies restringidas*

LISTADO FLORA Nº7: CALLOSA DE SEGURA

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Acacia farnesiana ≡ *Mimosa farnesiana*		Mimosa	
Acacia retinodes		Acacia verde	
Allium melananthum	All negre	Ajo de flor negra	
Aloina ambigua			
Amaranthus viridis ≡ *Euxolus viridis* = *Amaranthus gracilis*	Blet	Bledo	
Ammoides pusilla * ≡ *Seseli pusillum* = *Seseli ammoides* = *Ptychotis ammoides*			
Anacyclus valentinus	Panigroc valencià	Manzanilla valenciana	
Anagallis arvensis	Morrons	Murajes	
Arenaria montana ≡ *Willwebera montana*			
Arenaria montana ssp. intricata ≡ *Arenaria montana var. intricata* ≡ *Arenaria intricata* = *Arenaria segobricensis* = *Arenaria montana ssp. linearifolia*	Herba pixadora	Arenaria	
Artemisia barrelieri	Botja de saladar	Ontina	
Artemisia lucentica ≡ *Artemisia hispanica* – *Artemisia reptans*	Donzell	Ontina	
Arthrocnemum macrostachyum ≡ *Salicornia macrostachya* = *Arthrocnemum glaucum* – *Salicornia glauca*			
Asparagus acutifolius	Esparraguera	Esparraguera silvestre	
Asparagus albus			

Asphodelus fistulosus	Gamonet	Gamoncillo
Asphodelus fistulosus ssp. fistulosus		
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens	Herba del cordó negre	Culantrillo bastardo
Atractylis cancellata		
Atriplex halimus = *Atriplex serrulata*		
Atriplex tornabenei = *Atriplex tarraconensis* = *Atriplex rosea ssp. tarraconensis* – *Atriplex tatarica* – *Atriplex laciniata*		
Barbula unguiculata		
Biscutella lucentina	Llunetes	Anteojos
Blackstonia imperfoliata ≡ *Chlora imperfoliata* ≡ *Blackstonia perfoliata ssp. imperfoliata*		
Blackstonia perfoliata ≡ *Gentiana perfoliata*		
Bombycilaena erecta ≡ *Micropus erectus*		
Brachypodium phoenicoides ≡ *Festuca phoenicoides* = *Brachypodium mucronatum*		
Brassica fruticulosa ssp. cossoniana ≡ *Brassica cossoniana*		
Brassica tournefortii		
Bufonia tenuifolia		
Calendula arvensis	Ungla de gat	Hierba del podador
= *Calendula parviflora* = *Calendula arvensis ssp. macroptera*		
Calendula tripterocarpa		
Carrichtera annua ≡ *Vella annua* = *Carrichtera vellae*		

Centaurea saxicola ≡ *Centaurea ornata ssp. saxicola*		
Centaurea seridis = *Centaurea maritima* = *Centaurea cruenta* = *Centaurea homeoscevos* = *Centaurea seridis ssp. cruenta* = *Centaurea seridis ssp. maritima* – *Centaurea sonchifolia* – *Centaurea sphaerocephala*		
Centaurium quadrifolium ssp. barrelieri ≡ *Erythraea barrelieri* ≡ *Centaurium barrelieri*	Herba de Santa Margarida	Centaurea menor
Commicarpus africanus * ≡ *Boerhavia africana* = *Boerhavia plumbaginea* = *Commicarpus plumbagineus*		
Convolvulus althaeoides	Corretjola	Corregüela grande
Convolvulus arvensis = *Convolvulus segobricensis*	Corretjola	Corregüela menor
Conyza bonariensis ≡ *Erigeron bonariensis* = *Conyza ambigua* = *Erigeron crispus*		
Cosentinia vellea ≡ *Acrostichum velleum* ≡ *Cheilanthes vellea* ≡ *Notholaena vellea* = *Acrostichum lanuginosum* = *Cheilanthes catanensis* = *Notholaena lanuginosa*		Doradilla vellosa
Cotyledon macrantha		
Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia ≡ *Crepis taraxacifolia* = *Crepis recognita* = *Barkhausia haenseleri* = *Crepis hackeli* = *Crepis vesicaria ssp. haenseleri*		
Crossidium laevipilum		
Cuscuta approximata		
Cuscuta campestris		

Cuscuta epithymum	Cabells de la Mare de Déu	Cuscuta
≡ *Cuscuta europaea var. epithymum* = *Cuscuta kotschyi* = *Cuscuta epithymum ssp. kotschyi*		
Cynodon dactylon	Gespa	Césped
≡ *Panicum dactylon*		
Datura innoxia		
– *Datura metel*		
Dianthus broteri	Clavellinera de pastor	Clavellinas de pluma
= *Dianthus malacitanus* = *Dianthus serrulatus ssp. barbatus*		
Dianthus broteri ssp. valentinus	Clavellinera de pastor	Clavellinas de pluma
= *Dianthus valentinus*		
Didymodon fallax		
Didymodon luridus		
Dipcadi serotinum	Marcet	Falso narciso
≡ *Hyacinthus serotinus* ≡ *Uropetalum serotinum* = *Hyacinthus fulvus* = *Dipcadi fulvum*		
Diplotaxis ilorcitana	Ravenissa peluda	Jaramago de secarral
≡ *Pendulina ilorcitana* = *Diplotaxis gomez-campoi*		
Diplotaxis lagascana	Ravenissa groga	Jaramago de yesar
≡ *Diplotaxis harra ssp. lagascana* ≡ *Pendulina lagascana* = *Pendulina intricata* = *Pendulina webbiana* = *Diplotaxis harra ssp. intricata* – *Diplotaxis crassifolia*		
Dittrichia graveolens		
≡ *Erigeron graveolens* ≡ *Inula graveolens* ≡ *Cupularia graveolens* = *Inula quadridentata*		
Ecballium elaterium ssp. elaterium		
Echium creticum ssp. coincyanum	Viperina	Viborera
≡ *Echium coincyanum* ≡ *Echium vulgare ssp. coincyanum* = *Echium lagascae* = *Echium granatense* = *Echium vulgare ssp. granatense*		

Elaeoselinum tenuifolium	Julivert marí	Hinojo marino	
≡ *Thapsia tenuifolia* ≡ *Distichoselinum tenuifolium* = *Elaeoselinum lagascae*			
Erodium malacoides	Agulletes	Filamaría	
≡ *Geranium malacoides*			
Erucastrum virgatum ssp. baeticum	Ravenissa de roca	Jaramago de monte	
≡ *Sinapis baetica*			
Euphorbia boetica *	Lletera	Lechetrezna de arenal	
Euphorbia segetalis	Lletera	Lechera	
= *Euphorbia pinea* = *Euphorbia segetalis ssp. pinea*			
Euphorbia squamigera			
= *Euphorbia rupicola* = *Euphorbia carthaginensis* – *Euphorbia monchiquensis*			
Eurhynchium meridionale			
Fagonia cretica			
Filago pyramidata	Herba del borm	Hierba algodonera	
= *Filago spathulata*			
Fissidens bryoides			
Fumana thymifolia			
≡ *Cistus thymifolius* = *Cistus glutinosus* = *Fumana viscida* = *Helianthemum glutinosum* = *Fumana glutinosa*			
Fumaria densiflora			
= *Fumaria micrantha*			
Fumaria melillaica			
≡ *Fumaria capreolata ssp. melillaica* – *Fumaria macrosepala*			
Fumaria reuteri			
Funaria hygrometrica			
Funariella curviseta			

Genista valentina	Ginestell	Retama amarilla
Genista valentina ssp. valentina	Ginestell, ginesta fina	Retama, hiniesta
≡ *Spartium valentinum*		
≡ *Genista cinerea ssp. valentina*		
= *Genista murcica*		
= *Genista cinerea ssp. murcica*		
= *Genista valentina ssp. murcica*		
Glycyrrhiza glabra		
Gymnostomum lanceolatum		
Gymnostomum viridulum		
Halogeton sativus		
≡ *Salsola sativa*		
= *Salsola setifera*		
Helianthemum violaceum		
≡ *Cistus violaceus*		
≡ *Helianthemum apenninum ssp. violaceum*		
≡ *Helianthemum pilosum ssp. violaceum*		
= *Cistus racemosus*		
= *Cistus pilosus*		
= *Helianthemum lavandulifolium*		
= *Cistus strictus*		
= *Cistus linearis*		
= *Helianthemum racemosum*		
= *Helianthemum pilosum*		
= *Helianthemum lineare*		
= *Helianthemum strictum*		
Heliotropium europaeum	Herba berruguera	Verrucaria
Hibiscus rosa-sinensis		
Hirschfeldia incana		
≡ *Sinapis incana*		
≡ *Erucastrum incanum*		
= *Hirschfeldia adpressa*		
= *Hirschfeldia incana ssp. adpressa*		
Hordeum murinum ssp. leporinum	Margall bord	Cebadilla de ratón
≡ *Hordeum leporinum*		
Hyoseris scabra		
Hyparrhenia hirta	Fenàs	Cebrillo
≡ *Andropogon hirtus*		
= *Hyparrhenia podotricha*		
Imperata cylindrica	Xiscla	Cisca
≡ *Lagurus cylindricus*		
≡ *Saccharum cylindricum*		
= *Saccharum sisca*		
Lactuca serriola	Enciam bord	Lechuga borde
= *Lactuca scariola*		
Lactuca viminea ssp. ramosissima		
≡ *Prenanthes viminea*		
= *Lactuca chondrillifolia*		
= *Prenanthes ramosissima*		
= *Lactuca ramosissima*		
= *Lactuca viminea ssp. chondrilliflora*		
– *Lactuca viminea*		
Lafuentea rotundifolia	Orelleta de penya	Orejilla de roca
Lamarckia aurea	Cua de gos	Cepillitos
≡ *Cynosurus aureus*		
Lapiedra martinezii		
Lavandula multifida		
Lavatera cretica	Malva	Malva
Lavatera maritima		
= *Lavatera africana*		
Leucaena leucocephala		
Leucanthemum decipiens		
≡ *Leucanthemum paludosum ssp. decipiens*		
≡ *Mauranthemum decipiens*		
Lobularia maritima		
≡ *Clypeola maritima*		
≡ *Alyssum maritimum*		
≡ *Koniga maritima*		
Lobularia maritima ssp. maritima	Caps blancs	Mastuerzo marino
Maytenus senegalensis ssp. europaea *		
≡ *Celastrus europaeus*		
≡ *Gymnosporia europaea*		
≡ *Catha europaea*		
Medicago arborea		
Misopates orontium		
≡ *Antirrhinum orontium*		

Moricandia arvensis ≡ *Brassica arvensis*	Colletxó	Collejón
Nicotiana glauca	Tabac de jardí	Tabaco moro
Notoceras bicorne * ≡ *Erysimum bicorne*		Patagallina, trébol reventón
Ononis natrix ssp. natrix		
Ophrys speculum = *Ophrys ciliata*	Mosques blaves	Espejo de Venus
Opuntia ficus-indica = *Opuntia maxima* = *Opuntia amyclaea* = *Opuntia ficus-barbarica*		
Orobanche gracilis = *Orobanche cruenta*		
Osyris lanceolata = *Osyris quadripartita*	Ginestó valencià	Bayón
Oxalis pes-caprae = *Oxalis cernua*	Agret	Agrios
Parietaria judaica = *Parietaria diffusa* – *Parietaria officinalis*	Blet de paret	Albahaca de río
Paronychia suffruticosa ≡ *Illecebrum suffruticosum* ≡ *Herniaria suffruticosa* = *Herniaria paniculata* = *Paronychia brevistipulata* = *Herniaria polygonoides*	Herbeta de la sang	Sanguinaria mayor
Periploca angustifolia ≡ *Periploca laevigata ssp. angustifolia* ≡ *Periploca laevigata*		
Phagnalon rupestre ≡ *Conyza rupestris*		
Phagnalon saxatile ≡ *Gnaphalium saxatile* = *Conyza intermedia*	Botgeta	Manzanilla yesquera
Phlomis lychnitis	Orella de llebre	Oreja de liebre

Phoenix dactylifera		
Phragmites australis ssp. australis		
Pinus halepensis	Pi blanc	Pino carrasco
Piptatherum miliaceum ssp. miliaceum		
Pistacia lentiscus	Llentiscle	Lentisco
Plagiochasma rupestre		
Plantago albicans	Penosella	Llantén blanquecino
Plantago amplexicaulis		
Plantago coronopus	Cervina	Cuerno de ciervo
Polygala rupestris ≡ *Lerrouxia ifniensis* = *Polygala juniperina* – *Polygala comosa* – *Polygala saxatilis*	Polígala	Hierba amarga
Polygonum equisetiforme	Passacamins equisetiforme	Hierba de la sangre
Psoralea bituminosa ≡ *Bituminaria bituminosa* = *Psoralea plumosa*		
Pterygoneurum lamellatum		
Pulicaria sicula ≡ *Erigeron siculum*		
Reboulia hemisphaerica		
Reseda alba ssp. alba		
Reseda phyteuma – *Reseda phyteuma ssp. media* – *Reseda media*		
Reseda undata		
Rhamnus lycioides		
Rhamnus lycioides ssp. borgiae	Aranyoner	Espino negro

Rhamnus lycioides ssp. lycioides = *Rhamnus aragonensis*	Arçot	Espino negro
Rhodalsine geniculata ≡ *Arenaria geniculata* ≡ *Minuartia geniculata* = *Arenaria procumbens* = *Arenaria extensa* = *Alsine procumbens*		
Rumex bucephalophorus ssp. gallicus ≡ *Rumex bucephalophorus var. gallicus* = *Bucephalophora aculeata*		
Salsola genistoides ≡ *Caroxylon genistoides* = *Caroxylon tamariscifolium*		
Salsola oppositifolia – *Salsola longifolia* – *Salsola verticillata* – *Salsola fruticosa*		
Sanguisorba minor ssp. spachiana ≡ *Poterium spachianum* = *Poterium verrucosum* = *Poterium magnolii* = *Sanguisorba mauritanica* = *Sanguisorba minor ssp. magnolii* = *Poterium mauritanicum* = *Sanguisorba verrucosa*		
Sarcocapnos enneaphylla ≡ *Fumaria enneaphylla*	Herba freixurera	Zapatitos de la Virgen
Satureja obovata ≡ *Satureja cuneifolia ssp. obovata*		
Satureja obovata ssp. canescens ≡ *Satureja cuneifolia var. canescens*	Cendrosa	Saborija blanca
Scorpiurium circinatum		
Sedum album = *Sedum micranthum* = *Sedum teretifolium*	Raïmet de Pastor	Uva de gato
Sedum sediforme ≡ *Sempervivum sediforme* = *Sedum altissimum* = *Sempervivum anomalum* = *Sedum nicaeense*	Raïmet de pastor	Uña de gato
Sedum sediforme ssp. sediforme		

Senecio vulgaris	Citró	Hierba cana
Sherardia arvensis		
Sideritis glauca * ≡ *Sideritis incana ssp. glauca*	Rabet de gat	Rabo de gato rosado
Sideritis romana	Espinadella menuda	Zahareña
Silene inaperta		
Silene latifolia = *Lychnis macrocarpa* = *Lychnis alba* = *Gypsophila arenicola* = *Silene alba ssp. divaricata* = *Silene pratensis ssp. divaricata* = *Melandrium album* = *Silene latifolia ssp. alba* = *Silene pratensis* = *Melandrium macrocarpum*		
Silene pseudoatocion		
Silybum eburneum = *Silybum hispanicum* = *Silybum eburneum var. hispanicum*		
Sonchus oleraceus	Lletsó	Cerraja
Sonchus tenerrimus	Lletsó	Cerraja tierna
Sonchus tenerrimus ssp. tenerrimus		
Suaeda vera – *Suaeda altissima* – *Suaeda fruticosa*		
Succowia balearica ≡ *Bunias balearica*		
Targionia hypophylla		
Tetraclinis articulata ≡ *Thuja articulata* = *Callitris quadrivalvis*		
Teucrium buxifolium = *Teucrium saxatile*		
Teucrium buxifolium ssp. buxifolium	Poliol de penya, poliol amarg	Poleo de roca

Teucrium murcicum	Poliol mascle	Poleo macho
= *Teucrium polium ssp. aguilasense*		
Teucrium ronnigeri ssp. ronnigeri		
Thymus vulgaris	Timó	Tomillo
Thymus vulgaris ssp. vulgaris		
Tortula muralis ssp. obcordata		
Trichostomum brachydontium		
Trichostomum crispulum		
Umbilicus gaditanus		
= *Umbilicus rupestris ssp. gaditanus* – *Umbilicus rupestris ssp. horizontalis* – *Umbilicus horizontalis*		
Verbascum thapsus ssp. giganteum		
≡ *Verbascum giganteum* = *Verbascum thapsiforme* = *Verbascum valentinum* = *Verbascum phlomoides ssp. thapsiforme* = *Verbascum thapsus var. valentinum* – *Verbascum densiflorum*		
Weissia condensa		
Withania frutescens		Oroval
≡ *Atropa frutescens* = *Physalis suberosa*		
Withania somnifera		
≡ *Physalis somnifera*		
Ziziphus lotus		

** especies prioritarias*

nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)

*** especies restringidas*

LISTADO FLORA Nº8: ORIHUELA

Nombre Científico	Nombre Valenciano	Nombre Castellano	E. legal
Acacia cyclops			
Acacia farnesiana		Mimosa	
≡ *Mimosa farnesiana*			
Acacia retinodes		Acacia verde	
Acacia saligna			
≡ *Mimosa saligna* ≡ *Acacia cyanophylla*			
Acaulon dertosense			
Achillea ageratum			
Achillea santolinoides *			
Adonis microcarpa			
– *Adonis dentata*			
Agave americana	Pitera	Agave	
Agave ingens			
Agave sisalana		Sisal o Henequen	
Agrostis stolonifera			
= *Agrostis valentina* = *Agrostis adscendens* = *Agrostis scabriglumis*			
Aizoon hispanicum			
Ajuga iva			
≡ *Teucrium iva*			
Ajuga iva ssp. iva			
Alkanna tinctoria			
≡ *Buglossum tinctorium*			
Allium ampeloprasum	All porro	Ajo porro	
Allium melananthum	All negre	Ajo de flor negra	
Allium roseum			
= *Allium roseum var. valentinum*			

Aloe arborescens		Aloe candelabro, planta pulpo
Aloina aloides		
Aloina ambigua		
Amaranthus blitoides = *Amaranthus aragonensis*		
Amaranthus deflexus		
Amaranthus muricatus ≡ *Euxolus muricatus*	Amarant muricat	Bledo
Amaranthus retroflexus = *Amaranthus delilei*	Blet punxoset	Bledo
Amaranthus viridis ≡ *Euxolus viridis* = *Amaranthus gracilis*	Blet	Bledo
Ammochloa palaestina * = *Ammochloa subacaulis*		
Ammoides pusilla * ≡ *Seseli pusillum* = *Seseli ammoides* = *Ptychotis ammoides*		
Ammophila arenaria ssp. arundinacea		
Anabasis articulata ≡ *Salsola articulata* = *Salicornia mucronata* = *Anabasis hispanica* = *Anabasis mucronata*		
Anacyclus clavatus ≡ *Anthemis clavata*	Panigroc	Manzanilla de los campos
Anacyclus valentinus	Panigroc valencià	Manzanilla valenciana
Anagallis arvensis	Morrons	Murajes
Anagallis arvensis ssp. arvensis = *Anagallis arvensis ssp. phoenicea* = *Anagallis arvensis ssp. latifolia* = *Anagallis arvensis ssp. parviflora*		
Anagyris foetida		

Anchusa azurea = *Anchusa italica*	Buglossa	Alcaluces
Andryala ragusina = *Andryala lyrata*		
Anthyllis cytisoides	Albaida	Albaida
Anthyllis terniflora ≡ *Genista terniflora* ≡ *Anthyllis cytisoides ssp. terniflora* ≡ *Anthyllis cytisoides var. lagascana* = *Anthyllis genistae*	Albada	Albaida fina
Anthyllis tetraphylla ≡ *Tripodion tetraphyllum* ≡ *Physanthyllis tetraphylla*	Trèvol de mamella de vaca	Vulneraria de cuatro hojas
Anthyllis vulneraria ssp. gandogeri ≡ *Anthyllis vulneraria r. gandogeri* = *Anthyllis fontqueri* = *Anthyllis vulneraria ssp. fontqueri*	Vulnerària	Vulneraria
Antirrhinum controversum – *Antirrhinum hispanicum* – *Antirrhinum tortuosum*		
Apium nodiflorum ≡ *Sium nodiflorum* ≡ *Helosciadium nodiflorum*	Api de séquia	Apio bastardo
Aptenia cordifolia ≡ *Mesembryanthemum cordifolium*		
Apteranthes munbyana ssp. hispanica * ≡ *Boucerosia munbyana var. hispanica* ≡ *Caralluma munbyana ssp. hispanica* ≡ *Boucerosia hispanica*		Chumberillo de lobo
Arbutus unedo	Arbocer	Madroño
Arenaria leptoclados ≡ *Arenaria serpyllifolia var. leptoclados* ≡ *Arenaria serpyllifolia ssp. leptoclados* = *Arenaria minutiflora* = *Arenaria serpyllifolia ssp. tenuior* = *Arenaria leptoclados ssp. minutiflora*		
Arenaria montana ≡ *Willwebera montana*		

Arenaria montana ssp. intricata	Herba pixadora	Arenaria
≡ *Arenaria montana var. intricata* ≡ *Arenaria intricata* = *Arenaria segobricensis* = *Arenaria montana ssp. linearifolia*		
Argania spinosa		
≡ *Sideroxylon spinosum*		
Argyrolobium zanonii	Citís platejat	Hierba de la plata
Arisarum vulgare		
≡ *Arum arisarum*		
Aristida caerulescens		
≡ *Aristida adscensionis ssp. caerulescens* = *Aristida elatior*		
Aristolochia pistolochia		
Artemisia barrelieri	Botja de saladar	Ontina
Artemisia campestris		
Artemisia campestris ssp. glutinosa		
≡ *Artemisia glutinosa* = *Artemisia variabilis*		
Artemisia herba-alba		
Artemisia herba-alba ssp. herba-alba		
= *Artemisia aragonensis*		
Artemisia herba-alba ssp. valentina		
≡ *Artemisia valentina* = *Artemisia herba-alba var. glabrescens*		
Artemisia lucentica	Donzell	Ontina
≡ *Artemisia hispanica* – *Artemisia reptans*		
Arthrocnemum macrostachyum		
≡ *Salicornia macrostachya* = *Arthrocnemum glaucum* – *Salicornia glauca*		
Arundo donax	Canya	Caña
– *Arundo mauritanica*		
Arundo micrantha		Caña judía
≡ *Arundo donax ssp. plinii*		

Asparagus acutifolius	Esparraguera	Esparraguera silvestre
Asparagus acutifolius ssp. acutifolius		
– *Asparagus aphyllus*		
Asparagus albus		
Asparagus horridus	Esparreguera de menjar	Esparraguera
= *Asparagus stipularis*		
Asperula aristata ssp. scabra	Herba prima	Asperilla de flor roja
≡ *Asperula aristata var. scabra*		
Asphodelus cerasiferus		
– *Asphodelus albus* – *Asphodelus ramosus*		
Asphodelus fistulosus	Gamonet	Gamoncillo
Asphodelus fistulosus ssp. fistulosus		
Asphodelus tenuifolius		
≡ *Asphodelus fistulosus ssp. tenuifolius*		
Asplenium onopteris	Falzia de bosc	Culantrillo mayor
≡ *Asplenium adiantum-nigrum ssp. onopteris*		
Asplenium petrarchae		
≡ *Polypodium petrarchae*		
Asplenium trichomanes		
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens	Herba del cordó negre	Culantrillo bastardo
Aster squamatus	Àster americà	Rama negra
≡ *Conyza squamata* ≡ *Symphyotrichum squamatum*		
Asteriscus aquaticus		
≡ *Buphtalmum aquaticum* – *Asteriscus aquaticus ssp. pygmaeus*		
Asteriscus maritimus		
≡ *Buphtalmum maritimum*		
Asteriscus spinosus		
≡ *Buphtalmum spinosum* ≡ *Pallenis spinosa*		

Asterolinon linum-stellatum	Lli estelat	Lino de lagartijas
≡ *Lysimachia linum-stellatum* = *Asterolinon stellatum*		
Astragalus alopecuroides		
= *Astragalus narbonensis*		
Astragalus alopecuroides ssp. grosii *	Botja de muntanya	Boja amarilla
≡ *Astragalus grosii*		
Astragalus incanus ssp. incanus		
= *Astragalus incurvus* = *Astragalus incanus ssp. incurvus*		
Astragalus sesameus		
= *Astragalus saguntinus*		
Astragalus stella		
Athalamia spathysii		
Atractylis cancellata		
Atractylis humilis	Card hereu	Cardo heredero
≡ *Erigeron canadensis*		
Atriplex glauca		
Atriplex halimus		
= *Atriplex serrulata*		
Atriplex prostrata		
– *Atriplex hastata*		
Atriplex semibaccata		
Atriplex suberecta		
Austrocylindropuntia subulata	Agulles d'Eva	Alfileres de Eva
≡ *Cylindropuntia subulata* ≡ *Opuntia subulata* ≡ *Pereskia subulata*		
Avena barbata		
Avena barbata ssp. barbata		
Avena barbata ssp. hirtula		
≡ *Avena hirtula*		
Avena sterilis	Cúgula	Avena loca
Avenula bromoides ssp. bromoides	Avenula	Culilla
Ballota hirsuta	Marrubi hirsut	Flor rubí
≡ *Echeandia hirsuta* ≡ *Zapateria hirsuta* = *Ballota mollissima* – *Ballota hispanica*		
Barbula convoluta		
Barbula unguiculata		
Bartsia trixago		
≡ *Trixago apula* ≡ *Bellardia trixago*		
Bassia prostrata		
≡ *Salsola prostrata* ≡ *Kochia prostrata* = *Kochia sanguinea*		
Bassia scoparia ssp. scoparia		
Bellis annua		
= *Bellis annua ssp. microcephala*		
Beta macrocarpa		
= *Beta bourgaei*		
Beta maritima	Bleda borda	Acelga silvestre
≡ *Beta vulgaris ssp. maritima*		
Beta vulgaris ssp. vulgaris		
Biscutella dufourii	Llunetes	Anteojos
Biscutella lucentina	Llunetes	Anteojos
Bombycilaena erecta		
≡ *Micropus erectus*		
Borago officinalis		
Bougainvillea spectabilis		

Brachypodium distachyon ≡ *Bromus distachyos* ≡ *Trachynia distachya*		
Brachypodium retusum ≡ *Bromus retusus* = *Bromus plukenetii* = *Brachypodium plukenetii* = *Brachypodium ramosum*	Cerverol	Fenazo
Brassica fruticulosa ssp. cossoniana ≡ *Brassica cossoniana*		
Brassica tournefortii		
Bromus madritensis		
Bryonia dioica ≡ *Bryonia cretica ssp. dioica* – *Bryonia cretica*		
Bryum bicolor		
Bryum dunense		
Bryum gemmilucens		
Bryum radiculosum		
Bupleurum fruticescens	Ajocaperdius	Cuchilleja
Bupleurum gibraltaricum = *Bupleurum verticale*		Cuchilleja
Bupleurum semicompositum = *Bupleurum glaucum* = *Bupleurum semicompositum ssp. glaucum*		
Cachrys libanotis		
Cachrys sicula = *Hippomarathrum pterochlaenum*		
Cakile maritima ≡ *Bunias cakile* = *Cakile aegyptiaca* = *Cakile maritima ssp. aegyptiaca*		
Calendula arvensis = *Calendula parviflora* = *Calendula arvensis ssp. macroptera*	Ungla de gat	Hierba del podador

Calendula officinalis		
Calendula tripterocarpa		
Calystegia sepium ≡ *Convolvulus sepium*	Corretjola blanca	Correhuela mayor
Campanula erinus		
Campsis grandiflora ≡ *Bignonia grandiflora*		
Capparis spinosa ssp. spinosa		
Capsella bursa-pastoris ≡ *Thlaspi bursa-pastoris* = *Capsella rubella* = *Capsella bursa-pastoris ssp. rubella*	Bosses de pastor	Bolsa de pastor
Carduus bourgeanus = *Carduus reuterianus*		Cardo borriquero
Carduus pycnocephalus	Card	Cardo
Carduus tenuiflorus = *Carduus malacitanus*		
Carex halleriana		Lastoncillo
Carlina hispanica ≡ *Carlina corymbosa ssp. hispanica* – *Carlina corymbosa*		
Carpobrotus acinaciformis ≡ *Mesembryanthemum acinaciforme*		
Carpobrotus edulis ≡ *Mesembryanthemum edule*	Curatall	Uña de gato
Carrichtera annua ≡ *Vella annua* = *Carrichtera vellae*		
Carthamus arborescens ≡ *Kentrophyllum arborescens* = *Carthamus hircinus*		
Carthamus lanatus ≡ *Kentrophyllum lanatum*	Assotacrist	Cardo cabrero

Carthamus lanatus ssp. lanatus		
Carthamus tinctorius		
Carum foetidum *		
≡ *Selinopsis foetida*		
Centaurea aspera	Bracera	Tramaladro
Centaurea aspera ssp. aspera		
Centaurea aspera ssp. stenophylla	Margenera vera	Bracera
≡ *Centaurea stenophylla*		
Centaurea lagascae *		
≡ *Centaurea boissieri ssp. lagascae*		
≡ *Centaurea dufourii ssp. lagascae*		
= *Centaurea incana*		
Centaurea melitensis		
Centaurea nicaeensis		
Centaurea saxicola		
≡ *Centaurea ornata ssp. saxicola*		
Centaurea seridis		
= *Centaurea maritima*		
= *Centaurea cruenta*		
= *Centaurea homeoscevos*		
= *Centaurea seridis ssp. cruenta*		
= *Centaurea seridis ssp. maritima*		
– *Centaurea sonchifolia*		
– *Centaurea sphaerocephala*		
Centaurium pulchellum		
≡ *Gentiana pulchella*		
≡ *Erythraea pulchella*		
Centaurium quadrifolium		
≡ *Gentiana quadrifolia*		
Centaurium quadrifolium ssp. barrelieri	Herba de Santa Margarida	Centaurea menor
≡ *Erythraea barrelieri*		
≡ *Centaurium barrelieri*		
Centranthus calcitrapae		
≡ *Valeriana calcitrapae*		
= *Centranthus calcitrapae ssp. trichocarpus*		
= *Centranthus calcitrapae var. trichocarpus*		
Centranthus calcitrapae ssp. calcitrapae		

Cephalaria leucantha	Falla	Culilla
≡ *Scabiosa leucantha*		
Cephaloziella baumgartneri		
Cerastium glomeratum		
– *Cerastium viscosum*		
Ceratonia siliqua	Garrofer	Algarrobo
Ceterach officinarum	Dauradeta	Doradilla
≡ *Asplenium ceterach*		
Chaenorhinum crassifolium ssp. crassifolium		
≡ *Antirrhinum crassifolium*		
≡ *Chaenorhinum origanifolium ssp. crassifolium*		
≡ *Linaria crassifolia*		
Chamaerops humilis	Margalló	Palmito
≡ *Phoenix humilis*		
Chamaesyce serpens		
≡ *Euphorbia serpens*		
Cheilanthes acrostica		
≡ *Pteris acrosticha*		
≡ *Cheilanthes pteridioides ssp. acrosticha*		
= *Cheilanthes odora*		
– *Cheilanthes fragrans*		
– *Cheilanthes pteridioides*		
Cheirolophus intybaceus		
≡ *Centaurea intybacea*		
= *Centaurea virgata*		
= *Centaurea leucantha*		
Chenopodium album		
Chenopodium murale		
Chenopodium opulifolium		
≡ *Chenopodium album ssp. opulifolium*		
= *Microcnemum fastigiatum*		
Chrysanthemum coronarium		
Cistanche phelypaea		
≡ *Lathraea phelypaea*		
= *Phelipaea lutea*		
= *Cistanche lutea*		
Cistus albidus	Estepa blanca	Jara blanca

Cistus clusii – *Cistus libanotis* – *Cistus libanotis*	Esteperola	Jaguarzo
Cistus monspeliensis		Jaguarzo
Cistus salviifolius	Estepa borrera	Jaguarzo morisco
Citrus deliciosa		
Citrus limon ≡ *Citrus medica var. limon*		
Cladophora glomerata		
Clematis flammula = *Clematis maritima*		
Clypeola jonthlaspi		
Clypeola jonthlaspi ssp. jonthlaspi		
Commicarpus africanus * ≡ *Boerhavia africana* = *Boerhavia plumbaginea* = *Commicarpus plumbagineus*		
Convolvulus althaeoides	Corretjola	Corregüela grande
Convolvulus arvensis = *Convolvulus segobricensis*	Corretjola	Corregüela menor
Convolvulus lanuginosus = *Convolvulus capitatus*	Campanera capdellana	Campanilla lanuda
Convolvulus lineatus		
Convolvulus siculus		
Conyza bonariensis ≡ *Erigeron bonariensis* = *Conyza ambigua* = *Erigeron crispus*		
Conyza canadensis		
Coris monspeliensis		
Coris monspeliensis ssp. monspeliensis = *Coris monspeliensis ssp. fontqueri*		
Coris monspeliensis ssp. syrtica ≡ *Coris monspeliensis ssp. rivasiana* ≡ *Coris monspeliensis var. syrtica*		
Coronilla juncea	Ginestera	Coronilla de hoja fina
Coronilla minima ssp. lotoides ≡ *Coronilla lotoides* = *Coronilla clusii* = *Coronilla minima ssp. major* = *Coronilla minima ssp. clusii*	Coroneta valenciana	Coronilla de rey
Coronopus didymus ≡ *Lepidium didymum* ≡ *Senebiera didyma* = *Senebiera pinnatifida*		
Cortaderia selloana ≡ *Arundo sellowiana*		Plumeros, hierba de la Pampa
Cosentinia vellea ≡ *Acrostichum velleum* ≡ *Cheilanthes vellea* ≡ *Notholaena vellea* = *Acrostichum lanuginosum* = *Cheilanthes catanensis* = *Notholaena lanuginosa*		Doradilla vellosa
Crambe hispanica = *Crambe glabrata*		
Crassula tillaea ≡ *Tillaea muscosa* = *Crassula muscosa*		
Crepis vesicaria		
Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia ≡ *Crepis taraxacifolia* = *Crepis recognita* = *Barkhausia haenseleri* = *Crepis hackeli* = *Crepis vesicaria ssp. haenseleri*		
Crithmum maritimum		
Crossidium aberrans		
Crossidium laevipilum		
Crucianella angustifolia		
Crucianella maritima		

Crupina vulgaris
- ≡ *Centaurea crupina*

Cuscuta approximata

Cuscuta epithymum — Cabells de la Mare de Déu — Cuscuta
- ≡ *Cuscuta europaea var. epithymum*
- = *Cuscuta kotschyi*
- = *Cuscuta epithymum ssp. kotschyi*

Cutandia maritima
- ≡ *Triticum maritimum*
- ≡ *Scleropoa maritima*

Cylindropuntia pallida
- – *Cylindropuntia rosea*
- – *Opuntia rosea*
- – *Cylindropuntia tunicata*
- – *Opuntia tunicata*
- – *Cactus tunicatus*

Cymodocea nodosa *
- ≡ *Zostera nodosa*
- = *Phucagrostis major*
- = *Cymodocea major*

Cynanchum acutum

Cynodon dactylon — Gespa — Césped
- ≡ *Panicum dactylon*

Cynoglossum cheirifolium
- = *Cynoglossum cheirifolium ssp. heterocarpum*
- = *Cynoglossum heterocarpum*

Cynoglossum creticum — Besneula — Viniebla
- = *Cynoglossum pictum*

Cynomorium coccineum

Cyperus capitatus
- = *Cyperus schoenoides*
- = *Schoenus mucronatus*
- = *Cyperus kallii*
- = *Cyperus mucronatus*
- = *Galilea mucronata*

Cystoseira algeriensis

Cystoseira compressa

Dactylis glomerata ssp. hispanica
- ≡ *Dactylis hispanica*

Datura innoxia
- – *Datura metel*

Daucus carota ssp. carota
- = *Daucus maritimus*
- = *Daucus carota ssp. maritimus*

Delphinium gracile
- ≡ *Delphinium peregrinum ssp. gracile*
- = *Delphinium junceum*
- – *Delphinium peregrinum*

Desmazeria rigida ssp. hemipoa
- ≡ *Festuca hemipoa*
- ≡ *Catapodium rigidum ssp. hemipoa*
- ≡ *Scleropoa hemipoa*
- ≡ *Catapodium hemipoa*

Desmazeria rigida ssp. rigida
- ≡ *Desmazeria rigida*

Dianthus broteri — Clavellinera de pastor — Clavellinas de pluma
- = *Dianthus malacitanus*
- = *Dianthus serrulatus ssp. barbatus*

Dianthus broteri ssp. valentinus — Clavellinera de pastor — Clavellinas de pluma
- = *Dianthus valentinus*

Dianthus hispanicus
- ≡ *Dianthus pungens ssp. hispanicus*

Dicranella howei

Dictyopteris polypodioides

Didymodon acutus

Didymodon fallax

Didymodon luridus

Didymodon rigidulus

Didymodon vinealis

Dipcadi serotinum — Marcet — Falso narciso
- ≡ *Hyacinthus serotinus*
- ≡ *Uropetalum serotinum*
- = *Hyacinthus fulvus*
- = *Dipcadi fulvum*

Diplotaxis erucoides	Ravenell	Rabaniza blanca
≡ *Sinapis erucoides* = *Diplotaxis valentina* = *Diplotaxis platystylos*		
Diplotaxis ilorcitana	Ravenissa peluda	Jaramago de secarral
≡ *Pendulina ilorcitana* = *Diplotaxis gomez-campoi*		
Diplotaxis lagascana	Ravenissa groga	Jaramago de yesar
≡ *Diplotaxis harra ssp. lagascana* ≡ *Pendulina lagascana* = *Pendulina intricata* = *Pendulina webbiana* = *Diplotaxis harra ssp. intricata* – *Diplotaxis crassifolia*		
Diplotaxis virgata		
≡ *Sinapis virgata*		
Disphyma crassifolium		
≡ *Mesembryanthemum crassifolium*		
Dittrichia viscosa	Olivarda	Julivarda
≡ *Erigeron viscosus* ≡ *Cupularia viscosa* ≡ *Inula viscosa*		
Dorycnium pentaphyllum		
≡ *Lotus dorycnium*		
Dorycnium pentaphyllum ssp. pentaphyllum	Botgeta	Escobón
= *Dorycnium suffruticosum*		
Ecballium elaterium		
≡ *Momordica elaterium*		
Ecballium elaterium ssp. elaterium		
Echinops ritro	Panical blau	Cardo yesquero
Echinops strigosus		
Echium creticum		
Echium creticum ssp. coincyanum	Viperina	Viborera
≡ *Echium coincyanum* ≡ *Echium vulgare ssp. coincyanum* = *Echium lagascae* = *Echium granatense* = *Echium vulgare ssp. granatense*		
Echium humile		
= *Echium angustifolium*		

Echium humile ssp. pycnanthum		
≡ *Echium pycnanthum*		
Echium plantagineum		
Echium sabulicola		
= *Echium decipiens* = *Echium confusum* = *Echium sabulicola ssp. decipiens* – *Echium maritimum*		
Echium vulgare		
Elaeoselinum asclepium		
≡ *Thapsia asclepium* = *Elaeoselinum meoides var. hispanica* = *Elaeoselinum hispanicum* – *Elaeoselinum meoides*		
Elaeoselinum tenuifolium	Julivert marí	Hinojo marino
≡ *Thapsia tenuifolia* ≡ *Distichoselinum tenuifolium* = *Elaeoselinum lagascae*		
Elymus athericus		
≡ *Triticum pycnanthum* ≡ *Agropyron littorale* ≡ *Elymus pycnanthus* = *Agropyron pycnanthum*		
Emex spinosa	Bleda borda	Romaza espinosa
≡ *Rumex spinosa*		
Encalypta vulgaris		
Ephedra fragilis		
– *Ephedra altissima*		
Equisetum ramosissimum	Trencanua	Cola de rata
= *Equisetum ramosum* = *Equisetum campanulatum*		
Eragrostis papposa		
≡ *Poa papposa*		
Eriobotrya japonica		
≡ *Mespilus japonica*		
Erodium chium		
≡ *Geranium chium*		
Erodium cicutarium		
≡ *Geranium cicutarium*		

Erodium laciniatum ≡ *Geranium laciniatum* ≡ *Erodium triangulare ssp. laciniatum*		
Erodium malacoides ≡ *Geranium malacoides*	Aguletes	Filamaría
Erodium neuradifolium = *Erodium aragonense* = *Erodium malacoides ssp. aragonense*		
Erodium pulverulentum ≡ *Geranium pulverulentum* ≡ *Erodium laciniatum ssp. pulverulentum* ≡ *Erodium cavanillesii*		
Erophaca baetica * ≡ *Phaca baetica* = *Astragalus lusitanicus*	Astràgal lusitànic	Garbancillo del diablo
Eruca vesicaria ≡ *Brassica vesicaria*		
Erucastrum virgatum ssp. baeticum ≡ *Sinapis baetica*	Ravenissa de roca	Jaramago de monte
Erucastrum virgatum ssp. brachycarpum ≡ *Erucastrum brachycarpum*	Cabeso d´or, ravenissa major	Jaramago de roca
Eryngium campestre	Panical	Cardo corredor
Eryngium ilicifolium		
Eryngium maritimum		
Eucalyptus camaldulensis		Eucalipto rojo
Euphorbia boetica *	Lletera	Lechetrezna de arenal
Euphorbia exigua		
Euphorbia falcata = *Euphorbia acuminata* = *Euphorbia rubra* = *Euphorbia falcata ssp. rubra*		
Euphorbia helioscopia	Lletera	Lechera
Euphorbia hirsuta = *Euphorbia pubescens*	Lletera	Lechera

Euphorbia lagascae		
Euphorbia nicaeensis		
Euphorbia peplus = *Euphorbia peploides* = *Euphorbia peplus ssp. peploides*	Lletera	Lechera
Euphorbia segetalis = *Euphorbia pinea* = *Euphorbia segetalis ssp. pinea*	Lletera	Lechera
Euphorbia serrata	Lletera de vinya	Lechetrezna serrada
Euphorbia squamigera = *Euphorbia rupicola* = *Euphorbia carthaginensis* – *Euphorbia monchiquensis*		
Euphorbia sulcata = *Euphorbia retusa*		
Euphorbia terracina = *Euphorbia valentina*		
Eurhynchium meridionale		
Fagonia cretica		
Ferula communis ssp. catalaunica ≡ *Ferula communis var. catalaunica* = *Ferula nodiflora* = *Ferula hispanica* – *Ferula tingitana*		
Festuca arundinacea ssp. fenas ≡ *Festuca fenas*		
Ficus carica	Figuera	Higuera
Filago congesta = *Filago bianori*		
Filago fuscescens ≡ *Filago pyramidata ssp. fuscescens*		
Filago micropodioides		
Filago pyramidata = *Filago spathulata*	Herba del borm	Hierba algodonera

Fissidens bryoides		
Fissidens celticus		
Foeniculum vulgare		Hinojo amargo
≡ *Anethum foeniculum* = *Anethum piperitum*		
Foeniculum vulgare ssp. vulgare		
= *Foeniculum piperitum* – *Foeniculum officinale*		
Fossombronia caespitiformis		
Frankenia corymbosa		
= *Frankenia webbii*		
Frankenia laevis		
≡ *Frankenia hirsuta var. laevis*		
Frankenia pulverulenta		
Fumana ericifolia		
= *Fumana spachii* = *Fumana montana* = *Fumana spachii ssp. montana* = *Fumana ericoides ssp. montana*		
Fumana ericoides	Jarilla	Esteperola
≡ *Cistus ericoides* = *Fumana spachii ssp. robusta*		
Fumana hispidula	Fals timó	Tomillo moruno
≡ *Fumana glutinosa var. hispidula* ≡ *Fumana thymifolia var. hispidula* ≡ *Fumana laevis var. hispidula* ≡ *Fumana viscida ssp. hispidula*		
Fumana laevipes		
≡ *Cistus laevipes*		
Fumana scoparia		
= *Fumana racemosa* = *Fumana ericoides var. glandulosa*		
Fumana thymifolia		
≡ *Cistus thymifolius* = *Cistus glutinosus* = *Fumana viscida* = *Helianthemum glutinosum* = *Fumana glutinosa*		
Fumaria agraria		
Fumaria capreolata	Julivert bord	Conejitos de las vallas
Fumaria densiflora		
= *Fumaria micrantha*		
Fumaria officinalis		
Fumaria parviflora		
Gagea wilczekii		
Galactites tomentosa	Card blanc	Cardota
≡ *Centaurea galactites*		
Galium fruticescens	Herba mosquera	Galio blanco
≡ *Galium lucidum ssp. fruticescens*		
Galium murale		
≡ *Sherardia muralis*		
Galium setaceum		
= *Galium capillare*		
Galium verrucosum		
= *Galium saccharatum*		
Gastridium ventricosum		
≡ *Agrostis ventricosa* = *Gastridium lendigerum*		
Genista valentina	Ginestell	Retama amarilla
Genista valentina ssp. jimenezii		
≡ *Genista jimenezii*		
Genista valentina ssp. valentina	Ginestell, ginesta fina	Retama, hiniesta
≡ *Spartium valentinum* ≡ *Genista cinerea ssp. valentina* = *Genista murcica* = *Genista cinerea ssp. murcica* = *Genista valentina ssp. murcica*		
Geranium molle		
Geranium purpureum		
≡ *Geranium robertianum ssp. purpureum*		
Geranium rotundifolium		
Gladiolus communis		

Gladiolus illyricus ≡ *Gladiolus communis ssp. illyricus* = *Gladiolus reuteri* – *Gladiolus dubius*			
Glaucium corniculatum ≡ *Chelidonium corniculatum*			
Glaucium flavum ≡ *Chelidonium glaucium* = *Glaucium luteum*	Carxofera de prat	Amapola	
Globularia alypum	Coroneta de frare	Coronilla de fraile	
Gomphocarpus fruticosus ≡ *Asclepias fruticosa*			
Gossypium herbaceum			
Grimmia crinita			
Grimmia orbicularis			
Grimmia pulvinata			
Grimmia tergestina			
Guillonea scabra ≡ *Laserpitium scabrum*	Fenoll bord	Fenollosa	
Guiraoa arvensis	Ravanissa fina	Jaramago menor	
Gymnostomum viridulum			
Halogeton sativus ≡ *Salsola sativa* = *Salsola setifera*			
Hammada articulata ≡ *Caroxylon articulatum* ≡ *Haloxylon articulatum* = *Salsola articulata* – *Haloxylon tamariscifolium* – *Hammada tamariscifolia* – *Anabasis tamariscifolia*			
Haplophyllum linifolium ssp. rosmarinifolium ≡ *Ruta rosmarinifolia* = *Haplophyllum angustifolium*	Ruda mascle	Ruda silvestre	
Hedera helix		Hiedra	
Hedera helix ssp. helix			

Hedypnois cretica ≡ *Hyoseris cretica* = *Hyoseris rhagadioloides* = *Hedypnois tuberaeformis* = *Hedypnois polymorpha* = *Hedypnois pygmaea* = *Hedypnois rhagadioloides*			
Hedysarum boveanum ssp. europaeum = *Hedysarum fontanesii* – *Hedysarum confertum* – *Hedysarum humile*	Estaca-rossins	Zulla silvestre	
Helianthemum almeriense	Esteperola morada	Jarilla	
Helianthemum almeriense ssp. scopulorum ≡ *Helianthemum lineare var. scopulorum* ≡ *Helianthemum almeriense var. scopulorum*			
Helianthemum asperum ssp. asperum			
Helianthemum caput-felis *	Esteperola cap de gat	Jarilla de cabeza de gato	
Helianthemum cinereum ≡ *Cistus cinereus*	Herba del setge	Jarilla	
Helianthemum cinereum ssp. cinereum	Herba del setge	Jarilla	
Helianthemum hirtum ≡ *Cistus hirtus*			
Helianthemum ledifolium ≡ *Cistus ledifolius*			
Helianthemum marminorense	Esteperola	Jarilla, tamarilla	
Helianthemum rotundifolium ≡ *Helianthemum cinereum ssp. rotundifolium* ≡ *Helianthemum marifolium ssp. rotundifolium* = *Helianthemum paniculatum* – *Helianthemum rubellum* – *Helianthemum cinereum ssp. rubellum*			
Helianthemum salicifolium ssp. salicifolium			
Helianthemum squamatum ≡ *Cistus squamatus*			

Helianthemum syriacum	Romer blanc	Romero blanco
≡ *Cistus syriacus* = *Helianthemum thibaudii* = *Helianthemum syriacum ssp. thibaudii* – *Helianthemum racemosum* – *Helianthemum lavandulifolium*		
Helianthemum violaceum		
≡ *Cistus violaceus* ≡ *Helianthemum apenninum ssp. violaceum* ≡ *Helianthemum pilosum ssp. violaceum* = *Cistus racemosus* = *Cistus pilosus* = *Helianthemum lavandulifolium* = *Cistus strictus* = *Cistus linearis* = *Helianthemum racemosum* = *Helianthemum pilosum* = *Helianthemum lineare* = *Helianthemum strictum*		
Helianthemum viscarium		
= *Helianthemum viscarium ssp. hispidulum*		
Helichrysum serotinum	Sempreviva	Siempreviva
≡ *Helichrysum italicum* ≡ *Gnaphalium italicum* ≡ *Helichrysum italicum ssp. serotinum*		
Helichrysum stoechas	Sempreviva borda	Siempreviva de monte
≡ *Gnaphalium stoechas* = *Gnaphalium decumbens* = *Helichrysum decumbens*		
Helictotrichon filifolium		
≡ *Avena filifolia*		
Heliotropium curassavicum		Verruguera
Heliotropium europaeum	Herba berruguera	Verrucaria
Herniaria cinerea		
≡ *Herniaria hirsuta ssp. cinerea* = *Herniaria annua*		
Herniaria fruticosa	Herba del renyó	Matilla de la orina
Heteropogon contortus		
≡ *Andropogon contortus* = *Andropogon allionii* = *Heteropogon glaber* = *Heteropogon allionii*		
Hibiscus rosa-sinensis		

Hippocrepis ciliata		
≡ *Hippocrepis multisiliquosa ssp. ciliata* = *Hippocrepis annua*		
Hippocrepis fruticescens		
– *Hippocrepis glauca* – *Hippocrepis comosa ssp. scorpioides* – *Hippocrepis scorpioides* – *Hippocrepis comosa ssp. glauca*		
Hippocrepis multisiliquosa		
Hippocrepis scabra	Ferradura	Hierba de la herradura
≡ *Hippocrepis comosa ssp. scabra*		
Homalothecium sericeum		
Hordeum murinum ssp. leporinum	Margall bord	Cebadilla de ratón
≡ *Hordeum leporinum*		
Hymenolobus procumbens ssp. procumbens		
Hyoscyamus albus		
Hyoscyamus niger		
Hyoseris scabra		
Hyparrhenia hirta	Fenàs	Cebrillo
≡ *Andropogon hirtus* = *Hyparrhenia podotricha*		
Hyparrhenia sinaica		
≡ *Andropogon sinaicus* ≡ *Hyparrhenia hirta ssp. pubescens* = *Andropogon pubescens*		
Hypecoum procumbens ssp. grandiflorum		
≡ *Hypecoum grandiflorum* = *Hypecoum imberbe*		
Hypericum ericoides	Trencapedres	Pinillo de oro
Hypericum perforatum ssp. perforatum		
Hypochoeris glabra		
≡ *Hypochoeris radicata ssp. glabra*		

Inula crithmoides		
Ipomoea indica	Campanetes de jardí	Enredadera
≡ *Convolvulus indicus*		
= *Ipomoea acuminata*		
Iris sisyrinchium		
≡ *Gynandriris sisyrinchium*		
Jasonia glutinosa		
≡ *Erigeron glutinosus*		
≡ *Chiliadenus glutinosus*		
= *Inula saxatilis*		
= *Chrysocoma verticalis*		
= *Jasonia saxatilis*		
= *Chiliadenus saxatilis*		
Juncus acutus	Jonc agut	Junco
Juniperus oxycedrus		
Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus	Càdec	Enebro
Juniperus phoenicea		Sabina mora
Juniperus phoenicea ssp. phoenicea		
Kalanchoe daigremontiana		
Lactuca serriola	Enciam bord	Lechuga borde
= *Lactuca scariola*		
Lactuca tenerrima		
≡ *Cicerbita tenerrima*		
Lafuentea rotundifolia	Orelleta de penya	Orejilla de roca
Lagurus ovatus		
Lamarckia aurea	Cua de gos	Cepillitos
≡ *Cynosurus aureus*		
Lamium amplexicaule	Peu de gall	Gallitos
Lantana camara		Banderita española
Lapiedra martinezii		

Launaea arborescens *		
≡ *Zollikoferia arborescens*		
Launaea fragilis		
≡ *Lactuca fragilis*		
= *Rhabdotheca chondrilloides*		
– *Zollikoferia resedifolia*		
– *Launaea resedifolia*		
Launaea lanifera *		
– *Sonchus spinosus*		
Launaea nudicaulis		
≡ *Chondrilla nudicaulis*		
≡ *Microrhynchus nudicaulis*		
= *Prenanthes runcinata*		
Launaea pumila	Llicsó bord	Falsa escorzonerilla
≡ *Scorzonera pumila*		
≡ *Launaea fragilis ssp. pumila*		
≡ *Zollikoferia pumila*		
= *Sonchus scorzoneraeformis*		
Lavandula latifolia	Espigol	Espliego
Lavandula multifida		
Lavatera arborea		
Lavatera cretica	Malva	Malva
Lavatera maritima		
= *Lavatera africana*		
Lavatera triloba *		
= *Lavatera micans*		
Leontodon longirrostris		
≡ *Leontodon taraxacoides ssp. longirrostris*		
= *Leontodon saxatilis ssp. rothii*		
= *Thrincia nudicalyx*		
= *Leontodon saxatilis ssp. hispidus*		
= *Leontodon taraxacoides ssp. hispidus*		
– *Thrincia hispida*		
– *Leontodon rothii*		
Lepidium draba		
≡ *Cardaria draba*		
Lepidium graminifolium ssp. iberideum		
= *Lepidium suffruticosum*		
= *Lepidium graminifolium ssp. suffruticosum*		
Leucaena leucocephala		

Leucanthemum decipiens ≡ *Leucanthemum paludosum ssp. decipiens* ≡ *Mauranthemum decipiens*		
Leuzea conifera ≡ *Centaurea conifera* ≡ *Rhaponticum coniferum*	Carxofeta	Cuchara de pastor
Limodorum abortivum ≡ *Orchis abortiva*		
Limonium angustebracteatum ≡ *Limonium delicatulum ssp. angustebracteatum* = *Limonium delicatulum ssp. valentinum*	Ensopeguera	Saladilla fina
Limonium caesium ≡ *Statice caesia*		Sopaenvino
Limonium cossonianum	Trenca olla blanca	Limonio de flor blanca
Limonium delicatulum ≡ *Statice delicatula*	Ensopeguera	Espantazorras
Limonium echioides ≡ *Statice echioides*	Lletugueta menuda	Limonio enano
Limonium furfuraceum ≡ *Statice furfuracea*	Saladella	Limonio
Limonium girardianum ≡ *Statice girardiana*	Ensopeguera de flor densa	Limonio de Girard
Limonium lobatum * ≡ *Statice lobata* = *Statice thouinii* = *Limonium thouinii*		Siempreviva azul menor
Limonium parvibracteatum	Ensopeguera alacantina	Limonio alicantino
Limonium santapolense	Trenca l'olla de Santa Pola	Limonio
Limonium sinuatum ≡ *Statice sinuata*		Siempreviva azul
Limonium supinum ≡ *Statice supina*	Acelga de salobrar	Ensopeguera manxega
Limonium thiniense ≡ *Limonium duriusculum ssp. thiniense*	Ensopeguera menuda	Saladilla menor
Linaria arabiniana	Esperonet	Palomilla

Linaria depauperata ssp. hegelmaieri ≡ *Linaria hegelmaieri*	Gallet, gallets morats	Palomilla
Linaria oligantha ssp. oligantha * ≡ *Linaria flava ssp. oligantha*		
Linaria simplex ≡ *Antirrhinum simplex* ≡ *Linaria arvensis ssp. simplex*		
Linum strictum = *Linum corymbulosum* = *Linum strictum ssp. corymbulosum*		
Linum strictum ssp. strictum		
Lithodora fruticosa ≡ *Lithospermum fruticosum*	Herbeta de la sang	Sanguinaria
Lobularia maritima ≡ *Clypeola maritima* ≡ *Alyssum maritimum* ≡ *Koniga maritima*		
Lobularia maritima ssp. maritima	Caps blancs	Mastuerzo marino
Lonicera biflora * = *Lonicera canescens*	Lligabosc valencià	Madreselva
Lonicera implexa = *Lonicera valentina*	Lligabosc	Madreselva
Lonicera japonica		Madreselva
Lotus creticus = *Lotus salzmannii* = *Lotus commutatus*		
Lotus creticus ssp. creticus		
Lotus edulis		
Lycium intricatum		
Lygeum spartum	Espart	Albardín
Malcolmia africana ≡ *Hesperis africana*		

Malva parviflora = *Malva microcarpa*	Malva	Malva de flor pequeña
Malva sylvestris = *Malva ambigua*	Malvera	Malva común
Maresia nana ≡ *Sisymbrium nanum* ≡ *Malcolmia nana* = *Malcolmia confusa*		
Marrubium alysson		
Marrubium vulgare	Marrubí	Marrubio
Matthiola fruticulosa ≡ *Cheiranthus fruticulosus* = *Cheiranthus tristis* = *Matthiola varia* = *Matthiola tristis*	Violer trist	Alhelí de campo
Matthiola parviflora ≡ *Cheiranthus parviflorus*		
Medicago littoralis		
Medicago minima ≡ *Medicago polymorpha var. minima*		
Medicago polymorpha = *Medicago lappacea* = *Medicago hispida ssp. microcarpa* = *Medicago polycarpa* = *Medicago denticulata* = *Medicago apiculata* = *Medicago nigra* = *Medicago hispida* = *Medicago hispida ssp. lappacea* = *Medicago nigra ssp. microcarpa* = *Medicago polymorpha ssp. polycarpa* = *Medicago polymorpha ssp. microcarpa* = *Medicago polymorpha ssp. reticulata*	Melgó de llapassa	Alfalfa de secano
Medicago truncatula = *Medicago tribuloides*		
Melica minuta		
Mercurialis ambigua ≡ *Mercurialis annua ssp. ambigua* – *Mercurialis annua*	Melcoratge	Malcoraje
Mercurialis tomentosa	Orella de rata	Mercurial blanca

Mesembryanthemum crystallinum ≡ *Gasoul crystallinum*		
Mesembryanthemum nodiflorum ≡ *Gasoul nodiflorum*		
Micromeria fruticosa ≡ *Melissa fruticosa* ≡ *Satureja fruticosa* ≡ *Clinopodium serpyllifolium ssp. fruticosum* = *Micromeria marifolia* = *Nepeta marifolia*	Poliol	Poleo de monte
Mirabilis jalapa	Flor de nit	Dondiego de noche
Misopates microcarpum ≡ *Antirrhinum microcarpum* = *Misopates orontium var. pusillus* = *Misopates orontium ssp. pusillus*		
Misopates orontium ≡ *Antirrhinum orontium*		
Moricandia arvensis ≡ *Brassica arvensis*	Colletxó	Collejón
Moricandia moricandioides ≡ *Brassica moricandioides*		
Muscari neglectum – *Muscari racemosum*	All de bruixa	Nazarenos
Myoporum laetum – *Myoporum acuminatum* – *Myoporum tenuifolium*		
Narcissus serotinus		
Neatostema apulum ≡ *Myosotis apula* ≡ *Lithospermum apulum*		
Nepeta amethystina ssp. amethystina		
Nepeta amethystina ssp. mallophora		
Nepeta mallophora		
Nerium oleander	Baladre	Adelfa

Nicotiana glauca	Tabac de jardí	Tabaco moro
Nigella damascena		
Nonea echioides ≡ *Lycopsis echioides* = *Nonea ventricosa*		
Nonea micrantha		
Notoceras bicorne * ≡ *Erysimum bicorne*		Patagallina, trébol reventón
Olea europaea	Olivera	Olivo
Olea europaea ssp. europaea		
Olea europaea ssp. sylvestris ≡ *Olea sylvestris* = *Olea oleaster*		
Onobrychis stenorhiza	Trepadella	Esparceta montés
Ononis minutissima = *Ononis barbata*	Gavó menut	Anonis menor
Ononis natrix = *Ononis pyrenaica* = *Ononis hispanica*		
Ononis natrix ssp. ramosissima ≡ *Ononis ramosissima* – *Ononis crispa* – *Ononis natrix ssp. crispa* – *Ononis natrix ssp. hispanica*		
Ononis ornithopodioides		
Ononis pusilla = *Ononis columnae* = *Ononis brachyantha* = *Ononis parviflora* = *Ononis capitata*		
Ononis sicula = *Ononis leptocarpa*		
Ononis tridentata ssp. tridentata	Arnall	Arnacho
Ononis viscosa		
Ononis viscosa ssp. subcordata * ≡ *Ononis subcordata*		
Onopordum macracanthum ssp. micropterum ≡ *Onopordum micropterum* = *Onopordum murcicum*	Card borriquer	Cardo borriquero
Ophrys apifera ≡ *Ophrys fuciflora* = *Ophrys arachnites* = *Arachnites fuciflora*		
Ophrys fusca	Mosques negres	Monjas
Ophrys speculum = *Ophrys ciliata*	Mosques blaves	Espejo de Venus
Ophrys tenthredinifera = *Ophrys rosea*	Mosques roges	Flor de abeja
Opuntia ficus-indica = *Opuntia maxima* = *Opuntia amyclaea* = *Opuntia ficus-barbarica*		
Orchis collina * ≡ *Orchis saccata*		
Ornithogalum bourgeanum – *Ornithogalum collinum* – *Ornithogalum baeticum* – *Ornithogalum gussonei* – *Ornithogalum tenuifolium*		
Orobanche amethystea = *Orobanche eryngii*		
Orobanche artemisiae-campestris	Orobanque	Orobanque
Orobanche cernua		
Orobanche gracilis = *Orobanche cruenta*		
Orobanche latisquama ≡ *Boulardia latisquama* = *Ceratocalyx fimbriata* = *Ceratocalyx macrolepis*	Frare del romaní	Orobanca

Orobanche mutelii		
≡ *Orobanche ramosa ssp. mutelii* ≡ *Phelipaea ramosa ssp. mutelii* ≡ *Phelipanche mutelii* ≡ *Phelipaea mutelii* = *Orobanche mutelii ssp. spissa*		
Orobanche portoilicitana		
≡ *Phelipanche portoilicitana*		
Osteospermum ecklonis		
≡ *Dimorphoteca ecklonis*		
Osyris alba		Retama loca
Osyris lanceolata	Ginestó valencià	Bayón
= *Osyris quadripartita*		
Oxalis pes-caprae	Agret	Agrios
= *Oxalis cernua*		
Padina pavonica		
Pancratium maritimum		
Papaver hybridum		
= *Papaver hispidum*		
Papaver rhoeas	Rosella	Amapola
Papaver somniferum ssp. setigerum		
≡ *Papaver setigerum*		
Parapholis incurva		
≡ *Aegilops incurva* ≡ *Pholiurus incurvus* = *Aegilops incurvata* = *Lepturus incurvatus*		
Parietaria judaica	Blet de paret	Albahaca de río
= *Parietaria diffusa* – *Parietaria officinalis*		
Parietaria lusitanica		
Parietaria mauritanica		
Paronychia aretioides	Herba de la sang	Sanguinaria
Paronychia argentea	Herba de neu	Nevadilla
≡ *Illecebrum paronychia* = *Paronychia saguntina*		

Paronychia capitata		
≡ *Illecebrum capitatum* = *Paronychia nivea*		
Paronychia suffruticosa	Herbeta de la sang	Sanguinaria mayor
≡ *Illecebrum suffruticosum* ≡ *Herniaria suffruticosa* = *Herniaria paniculata* = *Paronychia brevistipulata* = *Herniaria polygonoides*		
Peganum harmala		
Pelargonium zonale		
≡ *Geranium zonale*		
Pennisetum clandestinum		Césped kikuyu
Pennisetum setaceum		
≡ *Phalaris setacea*		
Periploca angustifolia		
≡ *Periploca laevigata ssp. angustifolia* ≡ *Periploca laevigata*		
Phagnalon rupestre		
≡ *Conyza rupestris*		
Phagnalon saxatile	Botgeta	Manzanilla yesquera
≡ *Gnaphalium saxatile* = *Conyza intermedia*		
Phagnalon x domingoi		
Phalaris brachystachys		
≡ *Phalaris canariensis ssp. brachystachys* = *Phalaris quadrivalvis*		
Phalaris canariensis		
Phalaris minor		
Phillyrea angustifolia		Labiernago
Phlomis lychnitis	Orella de llebre	Oreja de liebre
Phoenix dactylifera		
Phoenix x intermedia		

Phragmites australis	Senill	Carrizo
≡ *Arundo australis* = *Arundo phragmites* = *Phragmites communis*		
Phragmites australis ssp. altissima		
≡ *Arundo altissima* = *Phragmites isiaca* = *Phragmites pumila* = *Phragmites gigantea* = *Phragmites loscosii* = *Phragmites australis ssp. chrysantha*		
Phragmites australis ssp. australis		
Picnomon acarna		
≡ *Carduus acarna* ≡ *Cirsium acarna*		
Picris echioides	Arpell	Lengua de gato
≡ *Helminthia echioides*		
Pimpinella villosa *		
Pinus halepensis	Pi blanc	Pino carrasco
Pinus pinea		Pino piñonero o pino doncel
Piptatherum coerulescens		
≡ *Milium coerulescens* ≡ *Oryzopsis coerulescens*		
Piptatherum miliaceum	Ripoll	Mijo mayor
≡ *Agrostis miliacea* ≡ *Oryzopsis miliacea* = *Milium multiflorum* = *Piptatherum multiflorum*		
Piptatherum miliaceum ssp. miliaceum		
Pistacia lentiscus	Llentiscle	Lentisco
Pistacia terebinthus	Cornicabra	Cornicabra
Pittosporum tobira		
≡ *Evonymus tobira*		
Plagiochasma rupestre		
Plantago afra		

Plantago albicans	Penosella	Llantén blanquecino
Plantago amplexicaulis		
Plantago bellardii		
= *Plantago pilosa*		
Plantago coronopus	Cervina	Cuerno de ciervo
Plantago lagopus	Herba de cinc nervis	Pie de liebre
= *Plantago lagopus ssp. cylindrica*		
Plantago lanceolata		
Plantago ovata		
Platycapnos spicata		
≡ *Fumaria spicata* = *Platycapnos echeandiae* = *Platycapnos spicata ssp. echeandiae*		
Pleurochaete squarrosa		
Poa bulbosa		
= *Poa bulbosa var. vivipara*		
Poa infirma		
= *Poa annua var. exilis* = *Poa annua ssp. exilis* = *Poa exilis*		
Polycarpon tetraphyllum		
≡ *Mollugo tetraphylla*		
Polycarpon tetraphyllum ssp. tetraphyllum	Policarp	
Polygala rupestris	Polígala	Hierba amarga
≡ *Lerrouxia ifniensis* = *Polygala juniperina* – *Polygala comosa* – *Polygala saxatilis*		
Polygonum aviculare ssp. microspermum		
≡ *Polygonum microspermum* = *Polygonum aequale* = *Polygonum arenastrum* = *Polygonum aviculare ssp. aequale*		
Polygonum equisetiforme	Passacamins equisetiforme	Hierba de la sangre

Polygonum lapathifolium ≡ *Persicaria lapathifolia* = *Polygonum pallidum* = *Polygonum brittingeri* = *Polygonum lapathifolium ssp. pallidum* = *Polygonum lapathifolium ssp. brittingeri*		
Polygonum persicaria ≡ *Persicaria maculosa*	Herba presseguera	Persicaria
Polygonum salicifolium ≡ *Persicaria salicifolia* = *Polygonum serrulatum*		
Polypodium cambricum ≡ *Polypodium cambricum ssp. cambricum* = *Polypodium australe* = *Polypodium vulgare var. serratum* = *Polypodium vulgare ssp. serrulatum* = *Polypodium vulgare ssp. serratum* = *Polypodium cambricum ssp. australe* = *Polypodium serratum*	Polipodi	Polipodio
Populus alba		
Populus nigra = *Populus nigra var. italica* = *Populus pyramidalis*	Xop	Chopo
Portulaca oleracea	Verdolaga	Verdolaga
Portulaca oleracea ssp. granulatostellulata		
Posidonia oceanica * ≡ *Zostera oceanica* = *Posidonia caulini*		
Pottia lanceolata		
Prunus dulcis ≡ *Amygdalus dulcis* = *Prunus amygdalus* = *Amygdalus communis*		
Pseudocrossidium hornschuchianum		
Pseudorlaya pumila ≡ *Caucalis pumila* = *Caucalis maritima* = *Orlaya maritima* = *Pseudorlaya maritima*		
Psoralea bituminosa ≡ *Bituminaria bituminosa* = *Psoralea plumosa*		
Pterygoneurum ovatum		
Pulicaria dysenterica ≡ *Inula dysenterica*	Herba de Sant Roc	Pulicaria
Pulicaria sicula ≡ *Erigeron siculum*		
Punica granatum	Magraner	Granado
Quercus coccifera	Coscoll	Coscoja
Quercus ilex ssp. rotundifolia ≡ *Quercus rotundifolia* = *Quercus ballota* = *Quercus ilex ssp. smilax* = *Quercus ilex ssp. ballota*		Carrasca
Raphanus raphanistrum		
Rapistrum rugosum ssp. rugosum		
Reboulia hemisphaerica		
Reichardia intermedia ≡ *Picridium intermedium* ≡ *Reichardia picroides ssp. intermedia*		
Reichardia tingitana ≡ *Scorzonera tingitana* ≡ *Picridium tingitanum* = *Picridium pinnatifidum*		
Reseda alba		
Reseda barrelieri ≡ *Reseda fruticulosa ssp. barrelieri* = *Reseda macrostachya*	Frarot	Reseda mayor
Reseda lanceolata *		
Reseda lutea – *Reseda ramosissima*	Bufadors	Gualdón
Reseda phyteuma – *Reseda phyteuma ssp. media* – *Reseda media*		
Reseda undata		

Reseda undata ssp. leucantha ≡ *Reseda leucantha* – *Reseda gayana* – *Reseda alba ssp. gayana*		
Reseda undata ssp. undata	Fraret	Reseda
Retama sphaerocarpa ≡ *Spartium sphaerocarpos* ≡ *Lygos monosperma*		
Rhamnus alaternus	Aladern	Aladiern
Rhamnus lycioides		
Rhamnus lycioides ssp. borgiae	Aranyoner	Espino negro
Rhamnus lycioides ssp. lycioides = *Rhamnus aragonensis*	Arçot	Espino negro
Rhamnus oleoides ssp. angustifolia ≡ *Rhamnus oleoides var. angustifolia*		
Rhodalsine geniculata ≡ *Arenaria geniculata* ≡ *Minuartia geniculata* = *Arenaria procumbens* = *Arenaria extensa* = *Alsine procumbens*		
Rhynchostegium megapolitanum		
Riccia atromarginata		
Riccia lamellosa		
Ricinus communis		Ricino, higuera del infierno
Riella cossoniana		
Robinia pseudacacia		Acacia blanca
Roemeria hybrida ≡ *Chelidonium hybridum* ≡ *Roemeria violacea*		
Romulea columnae		
Rorippa nasturtium-aquaticum ≡ *Sisymbrium nasturtium-aquaticum* = *Nasturtium officinale*	Creixen	Berro
Rosa pouzinii = *Rosa hispanica* = *Rosa segobricensis* – *Rosa eglanteria*		
Rosmarinus officinalis	Romaní	Romero
Rosmarinus officinalis ssp. officinalis		
Rostraria cristata ≡ *Festuca cristata* ≡ *Koeleria cristata* ≡ *Lophochloa cristata* = *Koeleria phleoides*		
Rostraria pumila ≡ *Avena pumila* ≡ *Trisetaria pumila* ≡ *Lophochloa pumila* ≡ *Trisetum pumilum*		
Rubia peregrina ssp. longifolia ≡ *Rubia longifolia*		
Rubia peregrina ssp. peregrina		
Rumex bucephalophorus ssp. gallicus ≡ *Rumex bucephalophorus var. gallicus* = *Bucephalophora aculeata*		
Rumex conglomeratus		
Rumex crispus	Arengada de porc	Romaza crespa
Rumex pulcher ssp. pulcher		
Rumex pulcher ssp. woodsii ≡ *Rumex woodsii* – *Rumex pulcher ssp. divaricatus*		
Rumex roseus * = *Rumex tingitanus*		Acedera morisca
Ruscus aculeatus	Galzeran	Rusco
Ruta angustifolia ≡ *Ruta chalepensis ssp. angustifolia*	Ruda	Ruda menor

Ruta chalepensis
= *Ruta bracteosa*

Sagina apetala
= *Sagina apetala ssp. erecta*

Salix alba
= *Salix alba ssp. vitellina*

Salsola genistoides
≡ *Caroxylon genistoides*
= *Caroxylon tamariscifolium*

Salsola kali
= *Salsola ruthenica*
= *Salsola kali ssp. ruthenica*

Salsola oppositifolia
– *Salsola longifolia*
– *Salsola verticillata*
– *Salsola fruticosa*

Salsola vermiculata — Barrella — Caramillo
= *Salsola microphylla*
= *Salsola flavescens*

Salvia verbenaca ssp. controversa
≡ *Salvia controversa*
= *Salvia multifida*
= *Salvia clandestina*
= *Salvia verbenaca ssp. clandestina*
= *Salvia verbenaca ssp. multifida*

Salvia verbenaca ssp. verbenaca
= *Salvia horminoides*
= *Salvia verbenaca ssp. horminoides*

Samolus valerandi — Dolceta — Pamplina

Sanguisorba minor ssp. spachiana
≡ *Poterium spachianum*
= *Poterium verrucosum*
= *Poterium magnolii*
= *Sanguisorba mauritanica*
= *Sanguisorba minor ssp. magnolii*
= *Poterium mauritanicum*
= *Sanguisorba verrucosa*

Santolina viscosa

Sarcocapnos enneaphylla — Herba freixurera — Zapatitos de la Virgen
≡ *Fumaria enneaphylla*

Satureja obovata
≡ *Satureja cuneifolia ssp. obovata*

Satureja obovata ssp. canescens — Cendrosa — Saborija blanca
≡ *Satureja cuneifolia var. canescens*

Satureja obovata ssp. valentina
≡ *Satureja obovata var. valentina*

Scabiosa atropurpurea — Cardeta marítima — Bella dama
≡ *Sixalix atropurpurea*
= *Scabiosa maritima var. sabuletorum*
= *Scabiosa maritima var. albida*
= *Scabiosa maritima*

Scabiosa stellata
≡ *Lomelosia stellata*
= *Scabiosa monspeliensis*
= *Scabiosa monspeliensis var. subacaulis*
= *Scabiosa stellata ssp. monspeliensis*

Schinus molle

Schismus barbatus
≡ *Festuca barbata*
= *Festuca calycina*
= *Schismus marginatus*
= *Schismus calycinus*

Scirpus holoschoenus
≡ *Holoschoenus vulgaris*
≡ *Scirpoides holoschoenus*
= *Scirpus romanus*
= *Scirpus australis*
= *Holoschoenus romanus*
= *Scirpus holoschoenus ssp. romanus*

Scolymus maculatus

Scorpiurium circinatum

Scorzonera angustifolia — Escurçonera barballera — Tetas de vaca
= *Scorzonera macrocephala*
– *Scorzonera graminifolia*

Scorzonera laciniata
≡ *Podospermum laciniatum*
= *Scorzonera calcitrapifolia*
= *Podospermum calcitrapifolium*

Scrophularia auriculata ssp. auriculata
= *Scrophularia balbisii*

Scrophularia tanacetifolia — Conillets rojos — Escrofularia de sombra
= *Scrophularia sciophila*
= *Scrophularia grenieri*

Sedum album = *Sedum micranthum* = *Sedum teretifolium*	Raïmet de Pastor	Uva de gato
Sedum dasyphyllum	Crespinell	Uña de gato
Sedum dasyphyllum ssp. dasyphyllum		
Sedum dasyphyllum ssp. glanduliferum ≡ *Sedum glanduliferum*		
Sedum sediforme ≡ *Sempervivum sediforme* = *Sedum altissimum* = *Sempervivum anomalum* = *Sedum nicaeense*	Raïmet de pastor	Uña de gato
Sedum sediforme ssp. sediforme		
Senecio angulatus		
Senecio cineraria ≡ *Senecio bicolor ssp. cineraria* = *Jacobaea maritima*		
Senecio malacitanus ≡ *Senecio nevadensis ssp. malacitanus* = *Senecio linifoliaster* = *Senecio linifolius*		
Senecio minutus ≡ *Cineraria minuta* ≡ *Jacobaea minuta* ≡ *Willkommia minuta*		
Senecio vulgaris	Citró	Hierba cana
Serratula flavescens ssp. leucantha ≡ *Carduus leucanthus* ≡ *Klasea leucantha* ≡ *Klasea flavescens ssp. leucantha* ≡ *Serratula leucantha*	Clacida fina	Cardillo blanco
Seseli tortuosum = *Seseli littorale*		
Sherardia arvensis		
Sideritis glauca * ≡ *Sideritis incana ssp. glauca*	Rabet de gat	Rabo de gato rosado
Sideritis leucantha	Rabet de gat	Rabo de gato
Sideritis leucantha ssp. leucantha = *Sideritis leucantha ssp. illicitana*	Rabet de gat	Rabo de gato
Sideritis montana ssp. ebracteata ≡ *Sideritis ebracteata*		
Sideritis murgetana		
Sideritis murgetana ssp. littoralis	Rabet de gat mascle	Rabo de gato
Sideritis murgetana ssp. murgetana	Rabo de gat	Rabo de gato
Sideritis romana	Espinadella menuda	Zahareña
Silene diversifolia = *Silene rubella* = *Silene segetalis* = *Silene rubella ssp. segetalis*		
Silene inaperta		
Silene latifolia = *Lychnis macrocarpa* = *Lychnis alba* = *Gypsophila arenicola* = *Silene alba ssp. divaricata* = *Silene pratensis ssp. divaricata* = *Melandrium album* = *Silene latifolia ssp. alba* = *Silene pratensis* = *Melandrium macrocarpum*		
Silene pseudoatocion		
Silene ramosissima = *Silene graveolens* = *Silene fallax*		
Silene sclerocarpa – *Silene cerastoides*		
Silene secundiflora = *Silene setabensis* = *Silene glauca*		
Silene tridentata = *Silene coarctata*		
Silybum eburneum = *Silybum hispanicum* = *Silybum eburneum var. hispanicum*		

Sinapis alba ssp. dissecta ≡ *Sinapis dissecta*		
Sinapis alba ssp. mairei ≡ *Sinapis mairei*		
Sisymbrium irio	Apagallums	Matacandil
Sisymbrium officinale ≡ *Erysimum officinale*		
Sisymbrium runcinatum = *Sisymbrium hirsutum* = *Sisymbrium lagascae* – *Sisymbrium polyceratium*		
Smilax aspera	Arítjol	Zarzaparrilla
Solanum bonariense		Naranjillo
Solanum linnaeanum – *Solanum sodomaeum*		
Solanum nigrum	Herba mora	Hierba mora
Sonchus asper ssp. asper ≡ *Sonchus arvensis var. asper*		
Sonchus bulbosus ≡ *Leontodon bulbosus* ≡ *Crepis bulbosa* ≡ *Aetheorhiza bulbosa*		
Sonchus maritimus ssp. maritimus = *Sonchus loscosii* – *Sonchus crassifolius*		
Sonchus oleraceus	Lletsó	Cerraja
Sonchus tenerrimus	Lletsó	Cerraja tierna
Sonchus tenerrimus ssp. tenerrimus		
Southbya nigrella		
Spergularia bocconei ≡ *Alsine bocconei*		
Spergularia diandra ≡ *Arenaria diandra* = *Spergularia salsuginea*		
Sporobolus pungens ≡ *Agrostis pungens* = *Sporobolus arenarius* = *Sporobolus virginicus*		
Spyridia filamentosa		
Stapelia variegata		
Stenotaphrum secundatum ≡ *Ischaemum secundatum* = *Stenotaphrum americanum*		
Stipa capensis = *Stipa tortilis* = *Stipa retorta*		
Stipa offneri = *Stipa fontanesii* – *Stipa juncea*		
Stipa parviflora		
Stipa tenacissima ≡ *Macrochloa tenacissima*	Espart	Esparto
Suaeda pruinosa ≡ *Suaeda vera ssp. pruinosa* = *Cochliospermum cavanillesii*		
Suaeda spicata ≡ *Salsola spicata* = *Cochliospermum hispanicum* – *Suaeda maritima*		
Suaeda vera – *Suaeda altissima* – *Suaeda fruticosa*		
Succowia balearica ≡ *Bunias balearica*		
Tamarix africana		
Tamarix boveana		
Tamarix canariensis = *Tamarix segobricensis*		

Tamarix dalmatica		
Tanacetum annuum *		
Targionia hypophylla		
Teucrium buxifolium = *Teucrium saxatile*		
Teucrium buxifolium ssp. rivasii ≡ *Teucrium rivasii*	Poliol de roca	Poleo de roca
Teucrium capitatum		
Teucrium capitatum ssp. gracillimum ≡ *Teucrium capitatum var. gracillimum*	Timó blanc	Tomillo macho
Teucrium carolipaui ≡ *Teucrium pumilum ssp. carolipaui* = *Teucrium carolipaui ssp. fontqueri*		
Teucrium dunense ≡ *Teucrium polium ssp. dunense* = *Teucrium polium var. maritimum* = *Teucrium puechiae* – *Teucrium belion* – *Teucrium lusitanicum*		
Teucrium dunense ssp. dunense		
Teucrium freynii = *Teucrium quadratulum var. ambiguum*	Trencapedres	Poleo de roca
Teucrium murcicum = *Teucrium polium ssp. aguilasense*	Poliol mascle	Poleo macho
Teucrium pseudochamaepitys	Cresta de gall	Falso pinillo
Teucrium ronnigeri ssp. lagunae		
Teucrium ronnigeri ssp. ronnigeri		
Teucrium x alvarezii		
Teucrium x bicoloreum	Herba cuquera	Zamarilla amarilla
Teucrium x robledoi		

Thalictrum speciosissimum = *Thalictrum glaucum* = *Thalictrum flavum ssp. glaucum*		
Thapsia villosa		
Thesium humifusum ≡ *Thesium divaricatum* = *Thesium humifusum ssp. divaricatum* – *Thesium linophyllum*		
Thesium humile – *Thesium arvense*		
Thymelaea argentata ≡ *Daphne argentata* = *Daphne nitida* = *Passerina segobricensis* = *Thymelaea pseudodioica* = *Passerina nitida* = *Thymelaea nitida*		
Thymelaea hirsuta ≡ *Passerina hirsuta*	Bufalaga hirsuta	Borja marina
Thymelaea tartonraira ssp. valentina ≡ *Passerina tartonraira var. valentina* ≡ *Thymelaea valentina* – *Passerina thomasii*	Bufalaga	Salamunda
Thymelaea tinctoria ≡ *Passerina tinctoria*		
Thymus hyemalis = *Thymus glandulosus* = *Thymus reuteri*		Tomillo fino
Thymus membranaceus ≡ *Thymus longiflorus ssp. membranaceus* = *Thymus murcicus*		Cantahueso
Thymus vulgaris	Timó	Tomillo
Thymus vulgaris ssp. vulgaris		
Thymus x diazii		
Thymus zygis		
Thymus zygis ssp. gracilis ≡ *Thymus tenuifolius var. gracilis*		
Tortella flavovirens var. papillosissima		

Tortella nitida		
Tortula atrovirens		
Tortula muralis		
Trachelium caeruleum		
Trichostomum brachydontium		
Trichostomum crispulum		
Trigonella monspeliaca		
Typha domingensis	Bova	Enea
= *Typha australis*		
Umbilicus gaditanus		
= *Umbilicus rupestris ssp. gaditanus* – *Umbilicus rupestris ssp. horizontalis* – *Umbilicus horizontalis*		
Umbilicus rupestris		
≡ *Cotyledon rupestris* = *Umbilicus pendulinus*		
Urospermum picroides	Amargot	Barba de viejo
≡ *Tragopogon picroides*		
Urtica urens		
= *Rhamnus hispanorum*		
Valantia hispida		
Verbascum sinuatum	Herba plorosa	Gordolobo ccenicero
Verbascum thapsus ssp. giganteum		
≡ *Verbascum giganteum* = *Verbascum thapsiforme* = *Verbascum valentinum* = *Verbascum phlomoides ssp. thapsiforme* = *Verbascum thapsus var. valentinum* – *Verbascum densiflorum*		
Verbesina encelioides		
≡ *Ximenesia encelioides*		
Viola arborescens	Violeta de la tardor	Violeta de otoño
Viola rupestris		
≡ *Viola canina ssp. rupestris* = *Viola arenaria*		

Volutaria tubuliflora			
≡ *Amberboa tubuliflora* – *Centaurea lippi* – *Volutaria lippi*			
Vulpia fasciculata			
≡ *Festuca fasciculata* ≡ *Vulpia membranacea ssp. fasciculata*			
Washingtonia filifera			
≡ *Pritchardia filifera*			
Weissia condensa			
Withania frutescens		Oroval	
≡ *Atropa frutescens* = *Physalis suberosa*			
Withania somnifera			
≡ *Physalis somnifera*			
Xanthium spinosum	Enganxa gossos	Cachurrera menor	
Yucca aloifolia		Yuca pinchuda	
Zannichellia peltata			
≡ *Zannichellia palustris ssp. peltata* = *Zannichellia macrostemon*			
Ziziphora aragonensis *			
≡ *Ziziphora hispanica ssp. aragonensis* – *Ziziphora acinoides*			
Ziziphus lotus			
Zygophyllum fabago			

** especies prioritarias* *nivel de sinonimia (≡ Relación de Identidad, = Relación de Igualdad, – Uso incorrecto)*

*** especies restringidas*

ANEJO Nº3.2 FICHAS DE ESPECIES CON FIGURA DE PROTECCIÓN

ANEJO Nº3.2.1 FICHAS DE ESPECIES DE FAUNA CON FIGURA DE PROTECCIÓN

Nombre científico: **Accipiter gentilis**
Nombre valenciano: Astor
Nombre castellano: Azor común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 50 cm, P 500-1.350 g. Ave rapaz de tamaño medio, de alas anchas y cola larga. Partes superiores gris oscuro bastante uniforme y partes inferiores blancas, profusamente barradas. Presenta una lista blanca extendida por encima del ojo muy característica. Las hembras son mucho más grandes que los machos. Las aves inmaduras son similares a los adultos, pero su plumaje es de color marrón.

Distribución:

La subespecie presente en España se distribuye por el oeste del continente Eurasiático. Está ampliamente repartida por toda España, aunque con una ocupación más fragmentada en la mitad meridional de la Península y estando ausente en las zonas menos boscosas. Ausente como nidificante en los archipiélagos Balear y Canario. Durante la invernada se reciben efectivos de origen europeo.

Hábitat:

Especie eminentemente forestal que también ocupa medios heterogéneos con presencia de zonas abiertas donde cazar. Nidifica habitualmente sobre árboles

Situación actual:

Nidificante extendido, con bajas densidades, por las principales masas forestales de las tres provincias y al parecer prefiriendo bosques por encima de los 400 metros de altitud, ocupando algo menos del 30 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. Es una especie poco común como nidificante y su población total se estimó algo superior a las 100 parejas en los años ochenta, con más de la mitad localizadas en la provincia de Castellón. En esta provincia, se han estimado 60-70 parejas en el año 2000, lo que permite pensar que su población no mostraría una tendencia clara y fluctuaría según las condiciones del hábitat forestal. También puede ser vista fuera de las áreas de cría durante la época de invernada.

Amenazas:

Entre las causas que parecen explicar la baja densidad de la especie en la Comunidad Valenciana se encontraría la deforestación, en buena parte causada por los incendios de grandes dimensiones ocurridos en las últimas décadas, así como por la carencia de presas de la especie debido a una intensa presión cinegética, a lo que se añade los efectos de la mixomatosis en el caso del conejo. Su densidad también puede obedecer a la competencia ejercida por otras rapaces más favorecidas por medios poco forestados, como el Búho Real (Bubo bubo). La proliferación de palomares con fines deportivos en zonas del interior puede causar conflictos entre esta especie y los colombófilos, además de verse afectada por la Tricomoniasis que transmiten las palomas. Las masas forestales donde la especie nidifica pueden verse afectadas por alteraciones del paisaje derivadas de la actividad humana o incendios.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial. Existen programas oficiales y voluntarios de censo de sus poblaciones nidificantes en la Comunidad Valenciana.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Accipiter nisus**
Nombre valenciano: Esparver
Nombre castellano: Gavilán común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 50 cm, P 100-350 g. Ave rapaz de pequeño tamaño, de alas redondeadas y cola larga. Partes superiores gris oscuro bastante uniforme y partes inferiores profusamente barradas. Las hembras son mucho más grandes y presentan las partes inferiores con fondo blanco, mientras que las de los machos tienen un tinte rojizo característico. Las aves inmaduras son similares a los adultos, pero su plumaje es de color marrón.

Distribución:

La subespecie presente en España se distribuye por el continente Eurasiático. Está ampliamente repartida por toda España, aunque con una ocupación algo fragmentada. Ausente como nidificante en Baleares. En las Canarias nidifica una subespecie diferente, ocupando las islas más occidentales. Durante la invernada se reciben efectivos de origen europeo.

Hábitat:

Especie forestal que se ve favorecida por la presencia de masas jóvenes, alternadas con áreas agrícolas y pueblos, también en bosques islas en zonas poco forestadas. Nidifica habitualmente sobre árboles.

Situación actual:

Nidificante extendido, con densidades moderadas o bajas, por las principales masas forestales de las tres provincias, ocupando un 45 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. Es una especie algo común como nidificante, pero no se conocen estimas precisas de su población. En los años ochenta se estableció una población que tendría un mínimo de 150 parejas, siendo más escaso en la provincia de Alicante. Más recientemente, se han estimado unas 80 parejas en la provincia de Castellón durante los años 2000. También puede ser vista fuera de las áreas de cría durante la época de invernada.

Amenazas:

Al ser una especie próxima a medios antropizados, los bosques donde nidifica pueden verse afectados por incendios, talas, urbanización, limpiezas forestales en época de cría, etc. Puntualmente pueden ser abatidos por disparos.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial. Existen programas oficiales y voluntarios de censo de sus poblaciones nidificantes en la Comunidad Valenciana.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Acrocephalus arundinaceus**
Nombre valenciano: Busquerot
Nombre castellano: Carricero tordal

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 19 cm, P 25-37 g. Pájaro insectívoro de tamaño medio y de coloración uniforme bastante discreta, pardo con tintes rojizos, con las partes inferiores más pálidas. Tiene una cola larga algo redondeada, una ceja por encima del ojo poco distinguida y un pico bastante robusto, como únicos detalles destacados. Tiene una estructura corporal fusiforme característica, con la frente plana huidiza. Su canto es ronco, pausado y prolongado, "carra-carra, cri-cri, ñec-ñec...", bastante monótono, emitido entre la vegetación palustre, generalmente en lo alto de un carrizo.

Distribución:

En España se presenta la subespecie nominal que se distribuye por Eurásia y por el norte de África. Se extiende de forma discontinua por toda la península, vinculado con la presencia de sus hábitats en todas las cuencas fluviales y a lo largo del litoral, evitando los sistemas montañosos y las regiones más agrestes. Nidifica en las islas Baleares, pero

está ausente de las islas Canarias. Es un migrador estival que se desplaza a los cuarteles invernales en África tras la temporada de cría.

Hábitat:

Ocupa principalmente carrizales, generalmente de cierta extensión, pero también otros tipos de vegetación palustre, por lo general con presencia de agua en las inmediaciones. Nidifica en una gran taza de materia vegetal cosida a varios carrizos. En migración puede aparecer en otros ambientes, generalmente vinculados con zonas palustres.

Situación actual:

Nidifica extendido por las tres provincias, ocupando las principales zonas húmedas litorales y adentrándose en algunas comarcas interiores por los cursos de los principales cauces fluviales. Ocupa en torno al 17 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una superficie similar a la obtenida en los años ochenta. Durante la migración puede ser visto en localidades donde no nidifica.

Amenazas:

Muestra dependencia a la presencia de la vegetación palustre, por lo que se ve desplazado por la destrucción o la alteración de los carrizales de los que depende, particularmente en los humedales de menor tamaño. La limpieza de cauces, la destrucción de riberas fluviales y las obras de encauzamiento destruyen sus hábitats. Sus poblaciones se ven gravemente afectadas por alteraciones ambientales en sus áreas de invernada.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Acrocephalus melanopogon**
Nombre valenciano: Xitxarra bigotuda
Nombre castellano: Carricerín real

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 13 cm, P 10-13 g. Pájaro insectívoro pequeño de alas cortas. Tiene una coloración pardo olivácea oscura con tintes rojizos, con las partes superiores finamente listadas de negruzco y las inferiores lisas y más pálidas. Tiene un diseño fuerte en la cabeza, con una lista blanca extendida sobre el ojo, contrastada con un capirote negruzco y tiene una gargantilla blanca. Suele recorrer la vegetación palustre, moviéndose por la base, cerca del agua, como si fuera un ratón.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Acrocephalus scirpaceus**
Nombre valenciano: Xitxarra de canyar
Nombre castellano: Carricero común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 12,5 cm, P 10-15 g. Pájaro insectívoro de coloración uniforme bastante discreta, pardo con tintes rojizos, con las partes inferiores más pálidas. Tiene una ceja por encima del ojo muy poco distinguida, como único detalle destacado. Estructura corporal fusiforme característica, con la frente plana huidiza. Su canto es áspero, rápido y prolongado, "tret, tret, tret, chírri, chírri, chá, chá, chí, chi...", bastante monótono, emitido entre la vegetación palustre.

Distribución:

En España se presenta la subespecie nominal que se distribuye por Europa y el norte de África. Es una especie extendida de forma discontinua por toda la península, vinculado con la presencia de sus hábitats en todas las cuencas fluviales y a lo largo del litoral, evitando los sistemas montañosos. Nidifica en las islas Baleares, pero está ausente de las islas Canarias. Es un migrador estival que se desplaza a los cuarteles invernales en África tras la temporada de cría.

Hábitat:

Ocupa principalmente carrizales de cualquier extensión, tanto en grandes superficies como en pequeñas masas, a lo largo de los cauces fluviales o en pequeñas lagunas endorreicas. Generalmente asociado con la presencia de agua, pero menos exigente que otros paseriformes palustres. Nidifica en una taza de materia vegetal cosida a varios carrizos. En migración puede aparecer en otros ambientes, generalmente vinculados con zonas palustres.

Situación actual:

Nidifica extendido por las tres provincias, ocupando las zonas húmedas litorales y los cursos de los principales cauces fluviales, alcanzando las comarcas interiores de las tres provincias, remontando los ríos, siempre que cuenten con la presencia de sus hábitats palustres. Ocupa cerca del 33 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una superficie similar a la obtenida en los años ochenta. Durante la migración puede ser visto en localidades donde no nidifica.

Amenazas:

Muestra una mayor adaptación a los cambios en las masas de vegetación palustre que otros paseriformes nidificantes en estos ambientes, pero se ve desplazado por la destrucción o la alteración excesiva de los carrizales de los que depende, particularmente en los humedales de menor tamaño. La limpieza de cauces, la destrucción de riberas fluviales y las obras de encauzamiento, destruyen sus hábitats. Cuando ocupa hábitats colindantes con terrenos agrícolas, se ve amenazada por el uso de pesticidas agrícolas. Sus poblaciones se ven afectadas por alteraciones ambientales en sus áreas de invernada.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal y algunas de las localidades que ocupa para nidificar en la Comunidad Valenciana se encuentran amparadas por figuras de protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Aegithalos caudatus**
Nombre valenciano: Senyoreta
Nombre castellano: Mito común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 14 cm, P 7-9 g. Pájaro insectívoro pequeño de cola extremadamente larga. Tiene una cabeza grande en comparación al cuerpo. Las partes superiores son de color pardusco, con alas y cola negruzcos. El resto del cuerpo, incluyendo la cara, es de color blanco sucio, con tintes rosados. Pico muy corto. Recorre las copas de los árboles, generalmente en pequeños grupos, mientras emite su voz, "srih-srih-srih", generalmente trisilábica.

Distribución:

En la península Ibérica se presentan dos subespecies, en el norte y los Pirineos aparece una subespecie que también se extiende por el sur de Francia, mientras que el resto peninsular está ocupado por una subespecie endémica. Presenta áreas de ausencia en las áreas deforestadas de los diferentes valles fluviales, en ambas mesetas y en las zonas más áridas. Está ausente de ambos archipiélagos. Es una especie sedentaria, aunque puede desarrollar movimientos de fuga ante situaciones desfavorables en sus áreas de presencia

Hábitat:

Ocupa terrenos forestales muy diversos, prefiriendo formaciones abiertas, utilizando incluso en áreas de arbustos densos. Puede aparecer tanto en zonas altas como en bajas. En las zonas más deforestadas ocupa bosques de ribera y sotos fluviales, a lo largo de los cursos de los ríos. También aparece en parques urbanos. Nido entre arbustos o en árbol, formado por una bolsa cerrada de plumas tejido con telarañas y cubierto de líquenes.

Situación actual:

Nidifica muy extendido por las tres provincias, sin embargo parece más vinculado a las comarcas montañosas y a las forestales, siendo más escaso en las zonas bajas o más deforestadas. Así, es común en toda la provincia de Castellón, excepto en la comarca de La Plana Alta y en la franja litoral, y muestra grandes discontinuidades en la provincia de Valencia y en las comarcas del sur de la provincia de Alicante. Ocupa en torno al 62 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una extensión algo superior a la registrada en los años

ochenta, que situaba se presencia en el 56 % de las cuadrículas UTM. Fuera de la época de reproducción puede ser observado en localidades donde no nidifica, particularmente en épocas muy frías.

Amenazas:

Muestra bastante plasticidad a la transformación de sus ambientes, pero se ve desplazado de las zonas excesivamente deforestadas, como es el caso de la acción de los incendios.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1985 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Alectoris rufa**
Nombre valenciano: Perdiu
Nombre castellano: Perdiz roja

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Datos insuficientes

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Directiva de Aves
· Anexo III.1
· Anexo II.1

Autor Foto: Carlos Pache

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 34 cm, P 400-550 g. Ave tamaño medio y porte característico. El plumaje de las aves adultas presenta las partes superiores marrón grisáceo. Posee una garganta blanca enmarcada por una banda negra que, a diferencia de otras perdices, presenta un intenso moteado de plumas negras extendido por el pecho. Los flancos presentan unas plumas tricolor características. El pico y las patas son de color rojo. Los jóvenes tienen un plumaje críptico que mudan muy pronto, pareciéndose entonces a los adultos.

Distribución:

Especie mediterránea endémica del sudoeste de Europa. Se encuentra ampliamente extendida por España, aunque aparece raramente por encima de los 1.500 metros de altitud, y se enrarece en la cornisa cantábrica. Presente en Baleares y aparentemente introducida en la isla de La Palma. Se trata de una especie sedentaria.

Hábitat:

Puede ocupar gran variedad de hábitats, pero prefiere paisajes abiertos con agricultura poco intensiva o con cobertura vegetal arbustiva. Localmente se mantienen poblaciones en hábitats menos típicos por motivos cinegéticos. Nidifica en el suelo, entre vegetación herbácea.

Situación actual:

Nidificante ampliamente repartido por las tres provincias, ocupando más del 95 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. Como únicas discontinuidades de presencia aparecen zonas de las comarcas de l.Horta, la Ribera Baixa, el Baix Vinalopó y el Baix Segura, relacionadas con las grandes conurbaciones. La especie parece mostrar indicios de regresión gradual de sus efectivos ibéricos, pese a intensas repoblaciones, y es de suponer una coyuntura similar en la Comunidad Valenciana. No obstante, la especie ocupaba el 89 % de las cuadrículas UTM del territorio a finales de los años ochenta, lo que podría indicar una expansión en su área de presencia en la Comunidad Valenciana durante las últimas décadas.

Amenazas:

Aparece afectada por la alteración de sus hábitats típicos de presencia, por intensificación agrícola o cambios en los usos del suelo (reforestación, urbanización). La especie está altamente influenciada por la gestión cinegética de los cotos de caza, con un incremento de la demanda y la aparición de cotos intensivos, donde se abandona la gestión tradicional en favor del desarrollo de sueltas masivas y de una elevada presión cinegética.

Acciones de conservación:

La especie requiere planes técnicos de caza y el seguimiento de sus poblaciones. También aparece beneficiada por actuaciones del manejo del hábitat que promueva paisajes abiertos heterogéneos.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Anas platyrhynchos**
Nombre valenciano: Collverd
Nombre castellano: Ánade azulón

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo III.1
· Anexo II.1

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 58 cm, P 850-1.400 g. Anátida nadadora de tamaño medio, de coloración ♂grisácea con capuchón verdoso, collarín blanco y plumas negras en forma de ♂caracolillo en la parte trasera del cuerpo en los machos y coloración ♂general pardusca en las hembras. La presencia de un espejuelo púrpura en las ♂alas de ambos sexos es muy característica de la especie.♂

Distribución:

La subespecie presente en España se distribuye por la mayor parte del ♂continente eurasiático y por Norteamérica. Nidificante muy común en España, ♂estando ampliamente repartido, aunque algo más ausente en las regiones más ♂montañosas y las más áridas.♂♂

Hábitat:

Ocupa una gran variedad de hábitats palustres, desde humedales de extensión ♂variable a cursos fluviales, incluyendo vegas irrigadas, arrozales, y ♂embalses. Puede aparecer de manera espontánea en grandes parques y en otros ♂medios antropizados con presencia de agua. Nidifica entre vegetación ♂herbácea.♂

Situación actual:

Nidifica bastante disperso por el territorio, ocupando algo más del 20 % de ♂las cuadrículas UTM de la Comunidad Valenciana. Los efectivos nidificantes ♂totales son difíciles de cuantificar y las estimas existentes sitúan una ♂población entre las 1.000 y las 2.500 parejas, con las mayores ♂concentraciones en las principales zonas húmedas de las tres provincias. No ♂se conoce con precisión la tendencia de la especie, sin embargo parece ♂evidente un aumento paulatino de sus efectivos. Tras la cría, se concentra ♂en las principales zonas húmedas, particularmente en las que se practica el ♂cultivo del arroz, aprovechando el grano que permanece en los campos tras la ♂cosecha. Así, los

efectivos concentrados en l'Albufera de Valencia en ♂septiembre pueden superar los 15.000 ejemplares. Durante la invernada las ♂cifras se moderan un poco y el total invernante en la Comunidad Valenciana ♂se sitúa en torno a los 7.000 ejemplares, con máximos superiores a los ♂12.000.♂

Amenazas:

El deterioro o la desaparición de los humedales supone una importante ♂amenaza. La pérdida de la calidad de la cubierta vegetal en sus hábitats de ♂cría limita su reproducción. Se trata de una especie cinegética y aparece ♂afectado por plumbismo. La contaminación de los medios acuáticos puede ♂afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta.♂♂

Acciones de conservación:

La protección y conservación de los humedales que ocupa y de su entorno, ♂garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la ♂depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de ♂agua continentales. La prohibición del uso de munición de plomo en los ♂humedales es una medida tendente a minimizar el problema del plumbismo.♂ ♂

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1983 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Anas strepera**
Nombre valenciano: Ascle
Nombre castellano: Ánade friso

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo II.1

Autor Foto: J. J. Rico

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 51 cm, P 700-900 g. Anátida nadadora de tamaño medio, de coloración ♂general grisácea con negro en la parte trasera del cuerpo en los machos y ♂pardusca en las hembras. La presencia de un extenso espejuelo blanco en las ♂alas de ambos sexos es una característica diagnóstica de la especie.♂♂

Distribución:

La subespecie presente en España se distribuye por el oeste y centro del ♂continente eurasiático. Nidificante poco común en España, repartido por la ♂meseta, la cuenca del Guadalquivir y algunas localidades del Mediterráneo. ♂En invierno se reciben efectivos extraibéricos de origen europeo.♂♂

Hábitat:

Ocupa humedales someros y eutróficos, preferentemente de aguas dulces, como ♂lagunas endorreicas y litorales, así como tramos fluviales con remansos o ♂cabeceras de embalses. En invierno en grandes láminas de agua con vegetación ♂palustre♂

Situación actual:

Nidifica casi exclusivamente en los marjales de Xeresa y Xeraco, donde se ♂estima una población algo superior a las 20 parejas nidificantes que parece ♂mostrar una tendencia positiva desde los años ochenta. Nidifica más ♂raramente en otros humedales, particularmente en el marjal de El Moro y el ♂Prat de Cabanes-Torreblanca. Durante la invernada es algo más común pero ♂sigue siendo relativamente escaso y los efectivos totales pueden oscilar ♂entre los 100 y 300 ejemplares, principalmente concentrados en l.Albufera de ♂Valencia.♂♂

Amenazas:

La localización del grueso de la población reproductora en una única ♂localidad de cría le hace extremadamente sensible a posibles amenaza. El ♂deterioro o la desaparición de los humedales supone una importante amenaza. ♂Pese a tratarse de una especie relativamente escasa, está considerada ♂cinegética. La contaminación de los medios acuáticos puede afectarle ♂directamente o a las especies de las que se alimenta.♂♂

Acciones de conservación:

La protección y conservación de los humedales que ocupa y de su entorno, ♂garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la ♂depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de ♂agua continentales♂

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1999 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Anguilla anguilla**
Nombre valenciano: Anguila
Nombre castellano: Anguila

Origen: Autóctono
Medio: Ambos

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable

Estados Legales

Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM
· Anexo III

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Cuerpo cilíndrico cuya parte posterior está comprimida. Cabeza algo alargada. Ojo redondeado, pequeño en ejemplares juveniles, y grande en ejemplares plateados. La mandíbula inferior es prominente. Dientes muy pequeños, dispuestos en series en ambas mandíbulas y en el vómer. Las aberturas branquiales son pequeñas y verticales. Aletas pectorales bien desarrolladas y sin aletas pelvianas. La aleta dorsal, caudal y anal forman una sola aleta continua. El origen de la aleta dorsal está bastante alejado de las pectorales. La línea lateral es visible. Los adultos en agua dulce tienen la parte dorsal negruzca y la ventral amarillenta, tomándose plateada durante la migración reproductora. La larva es transparente y la angula pardo verdosa.Se trata de una especie catadroma, cuya reproducción tiene lugar solamente en el mar de los Sargazos y en las Islas Bermudas a grandes profundidades. De la eclosión de los huevos emerge una larva denominada leptocéfalo que inicia una migración por el océano Atlántico durante un periodo de tiempo que varía entre 1 y 7 años, dependiendo del lugar de destino. Poco antes de llegar a las costas de los ríos la morfología de esta larva cambia y se hacen cilíndricas pasando a convertirse en angulas. Es en este momento en el que se producen importantes capturas comerciales, desde octubre hasta la primavera, con máximos en los meses de diciembre y enero

Distribución:

Se distribuye por las costas del Atlántico norte, desde Escandinavia hasta Marruecos, por sus ríos y afluentes. En España se encuentra en todas las cuencas hidrográficas aunque limitada por la presencia de grandes presas, habiendo desaparecido de la mayor parte del Ebro, Duero, Tajo y Guadiana. Presente también en albuferas de las islas Baleares y en las islas Canarias.En la Comunidad Valenciana su distribución original incluía todos los ríos y zonas húmedas, sobre todo la Albufera de Valencia donde era muy abundante. En la actualidad podemos encontrar la especie en todos los marjales y lagunas litorales de la Comunidad, y prácticamente en todas las cuencas fluviales, si exceptuamos el río Bergantes y el Vinalopó donde no ha sido citada en los últimos años.

Hábitat:

Vive en los ríos y en el mar. Las larvas y los adultos viven en el océano, en aguas profundas, y la anguila amarilla, estado en el que se alimenta, vive en los ríos. En éstos prefieren sustratos de arena y fango.

Situación actual:

Aunque se conoce muy poco sobre sus poblaciones en el mar, parece haber sufrido una drástica regresión en los últimos años. Muy rara en la Comunidad Valenciana.

Amenazas:

La principal amenaza la constituyen las presas, que le impiden alcanzar sus frezaderos óptimos. La contaminación y destrucción de hábitat tiene una influencia muy negativa sobre la especie así como la sobrepesca.

Acciones de conservación:

Para paliar los principales factores de amenaza es imprescindible realizar una regulación efectiva de la pesca en determinadas zonas, particularmente donde se producen las entradas de angula del mar, y la instalación de pasos o escalas en las presas que permitan la migración de la especie. Es preciso controlar la contaminación de los estuarios y tramos bajos de los ríos. También es importante recuperar las vías de migración, adecuando las presas para que puedan ser remontadas por los reproductores. Es necesario estudiar y seguir las poblaciones para determinar su distribución geográfica espacial y temporal, y ver si sufre algún tipo de alteración o regresión.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1985 - 2017

Autor ficha: Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. Universidad de Alicante
Año ficha: 2008

Nombre científico: **Aphanius iberus**
Nombre valenciano: Fartet
Nombre castellano: Fartet

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· En peligro de extinción
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - En peligro de extinción
Convenio de Berna
· Anexo III
Directiva de Hábitats
· Anexo II
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM
· Anexo II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Muestra un cuerpo corto y macizo (de 3 a 5 cms.). La boca es pequeña, protáctil, y las mandíbulas están provistas de dientes tricúspides dispuestos en una sola fila. El dicromatismo sexual es muy acusado y permanente, los machos presentan los flancos provistos de una veintena de bandas plateadas; la aleta caudal es rayada, con 3-5 bandas azuladas oscuras; durante la fase reproductora el vientre y los contornos de las aletas adquieren un tono amarillo dorado. Las hembras son grises, con los flancos punteados de negro de forma irregular. La reproducción tiene lugar entre marzo y septiembre siendo los huevos de menor tamaño que los del samaruc y las puestas más abundantes. Su régimen de alimentación se considera omnívoro, ya que si bien normalmente se alimentan de invertebrados del medio en determinadas ocasiones pueden ingerir fitoplancton y detritos.

Distribución:

Endemismo de España cuya área de distribución conocida abarca por una parte el litoral mediterráneo ibérico, desde los Aigüamolls del Empordá (Girona) hasta la Albufera de Adra (Almería), y por otra las costas atlánticas sudoccidentales de la península, con las marismas del Guadalquivir y Guadiana. En la Comunidad Valenciana el fartet se ha localizado recientemente en el Marjal de Peñíscola, Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, Marjal de ¿Els Moros' (Sagunto-Puzol), humedales sudalicantinos (Salinas de Santa Pola y Hondo de Elche) y laguna endorréica de Villena (población mantenida en cautividad), aunque podría aparecer en otras localidades insuficientemente prospectadas.

Hábitat:

Muestran una alta adaptabilidad a condiciones ambientales extremas. Aunque clasificados como peces de agua dulce, son capaces de sobrevivir en aguas hipersalinas. Canales de aguas influenciados por el mar, ríos costeros, estuarios, albuferas, salinas, etc, son sus hábitats favoritos y lugares de alimentación.

Situación actual:

Las poblaciones costeras se encuentran generalmente en buen estado de conservación, especialmente las localizadas en los humedales sudalicantinos, sin embargo hay que destacar la situación de la población de Villena, actualmente extinta en su hábitat natural, y de la que solamente quedan ejemplares en ¿stock¿ en cautividad a la espera de ser reintroducidos en áreas de reserva ubicadas en la antigua laguna de Villena. Como en el caso del samaruc, hay constancia de la extinción de la población del antiguo marjal de Albuixech desecado a finales de 1991. Ejemplares de esta población pudieron ser rescatados y utilizados como reproductores para la cría en cautividad.

Amenazas:

Las poblaciones más importantes de fartet en la Comunidad Valenciana se encuentran localizadas en zonas protegidas, bien como Parques Naturales (Prat de Cabanes-Torreblanca, Salinas de Santa Pola y Hondo de Elche) o bien dentro del Catálogo de Zonas Húmeda como es el caso del marjal ¿dels Moros' de Sagunto, por tanto la degradación del hábitat por vertidos en estas localidades es bastante improbable. Cabe sin embargo destacar como principales causas de la regresión de esta especie en la Comunidad la presencia de especies competidoras, como la gambusia, y las alteraciones del nivel freático que en algunos casos pueden llegar a ocasionar la desecación del hábitat.

Acciones de conservación:

Las acciones de conservación llevadas a cabo por la Consellería de Medio Ambiente han sido muy similares a las desarrolladas para el samaruc: - Caracterización genética de las principales poblaciones naturales. Como consecuencia de este estudio se llego a la conclusión de que la población de fartet de Villena debe ser considerada como una ESU independiente (Evolutionary Significant Unit o unidad mínima de conservación) de otra ESU que estaría integrada por el resto de poblaciones costeras de la especie (Peñíscola, Cabanes, Albuixech y Santa Pola). - Determinación de los requerimientos bio-ecológicos de la especie. - Programa de cría en cautividad y de reintroducción en el medio natural. Desde que se inició este programa en 1993 se han reintroducido alrededor de 7.000 ejemplares en el Racó de l´Olla y en las malladas de El Saler (P.N. de L´Albufera), en el marjal dels Moros de Sagunto, en el marjal de Peñíscola, en el Hondo de Elche y en algunas acequias de Villena. - Restauración y recreación de ecosistemas que funcionen como áreas de reserva. En la actualidad se está llevando a cabo la adecuación de un área de reserva para la especie en el término municipal de Villena. Dadas las características especiales de la especie en esta población y el interés que existe desde el punto de vista conservacionista se ha firmado recientemente un Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Villena. - Campaña de divulgación y educación ambiental.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1985 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Apodemus sylvaticus**
Nombre valenciano: Ratolí de bosc
Nombre castellano: Ratón de campo

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Ver más imágenes

Descripción y biología:

El ratón de campo en el territorio valenciano se adscribe a la subespecie Apodemus sylvaticus dichrurus, bajo la denominación de ratón de campo mediterráneo (Torre et al., 2002), la cual difiere morfológicamente, pero de forma no demasiado evidente, de otras cuatro subespecies que habitan el norte de la península, las islas Pitiusas y el norte de África. Su carácter generalista y el amplio rango de alimentación le proporcionan una gran capacidad de adaptación a multitud de condiciones ambientales, convirtiéndose en una especie muy abundante en la mayoría de hábitats. El ratón de campo es una especie de talla media, inferior a otras especies de múridos bien conocidos como las ratas del género Rattus y superior a las de los pequeños ratones del género Mus. Morfológicamente se caracteriza por su cabeza voluminosa y alargada, el hocico puntiagudo, los ojos negros y saltones ¿que le confieren una viveza única entre los múridos¿, y las orejas grandes ¿característica que también los diferencia con evidencia de las especies de Mus¿. La cola es bicolor, marrón en la parte dorsal y blanca en la ventral, delgada, de longitud igual o superior a la de la cabeza y el cuerpo juntos, está prácticamente desprovista de pelos. El pelaje posee una coloración pardo-amarillenta en la parte dorsal y blanquecina en la parte ventral. Sin embargo, la coloración corporal varía con la edad del ratón, siendo más grisácea entre los individuos juveniles y más rojiza, la coloración dorsal, y blanca y amarillenta, la coloración ventral, entre los individuos subadultos y adultos.Las extremidades posteriores son proporcionalmente largas, permitiéndole desplazarse a pequeños saltos. Prospecciones llevadas a cabo en la comarca del Maestrat y los parques naturales de la Serra Calderona, de l¿Albufera de València y del Carrascar de la Font Roja d¿Alcoi, han permitido conocer con mayor precisión datos morfológicos y pautas biológicas del ratón de campo en la Comunitat Valenciana. Su peso, desde que abandona la madriguera, oscila entre los 7 y los 40 gramos aproximadamente. La longitud de la cola está entre 58 y 125 milímetros, la de la cabeza-cuerpo entre 48 y 170 milímetros, la de la oreja entre 13 y 23 milímetros, y la del pie posterior entre 18 y 27 milímetros (Fuentes y Galán-Puchades, 1994; Fuentes et al., 1998; Sainz-Elipe, 2009). La actividad de este múrido es esencialmente nocturna, con un máximo de actividad crepuscular y otro al alba. Su alimentación, de carácter omnívoro, presenta cambios estacionales en función de la disponibilidad del alimento. Está basada fundamentalmente en semillas y frutos, razón por la cual el ratón de campo contribuye significativamente tanto a su depredación como a su dispersión, desempeñando un papel importante en la dinámica y en la regeneración de ecosistemas forestales. Además, durante la primavera y el verano incluye en su dieta pequeños invertebrados (insectos, arácnidos, gusanos, caracoles¿) e incluso algún pequeño vertebrado. La presencia de dos incisivos y de 6 molares en cada mandíbula le permite roer las semillas y triturar el alimento. El crecimiento limitado y el desgaste de las piezas dentales son uno de los indicadores de la edad de cada individuo. Los machos son polígamos, siendo, sin embargo, la proporción entre machos y hembras prácticamente 1:1 (1,3:1,0 en el PN de la Serra Calderona, n=1.906).

Distribución:

Su distribución geográfica abarca desde el noroeste de África al sur de la Península Escandinava, llegando también a parte del continente asiático y la cordillera del Himalaya. En la Península Ibérica se encuentra distribuido por la totalidad del territorio, y en todas las grandes Islas Baleares, a excepción de Cabrera. En la Comunitat Valenciana se encuentra distribuido a lo largo de prácticamente todo el territorio, faltando únicamente en los medios acuáticos como ríos, lagos, embalses, albuferas y marjales, siendo el micromamífero más abundante en los bosques mediterráneos de la Comunitat Valenciana.

Hábitat:

Su hábitat preferencial lo constituyen las masas boscosas, muros de piedras de pinares y carrascales litorales ¿sobre todo a altitudes superiores a los 500 metros¿, cultivos abandonados, y zonas en regeneración post-incendio con suficiente masa arbustiva que proporcione cobijo y protección. En todo caso, su carácter generalista le permite habitar en la Comunitat Valenciana desde el nivel del mar a cotas superiores a 1.500 metros de altitud. Las madrigueras se sitúan habitualmente entre los muros de piedra de zonas abancaladas, pero también pueden estar excavadas bajo el suelo o a partir de orificios en árboles y entre las rocas. La territorialidad existe en ambos sexos, si bien el territorio de los machos es superior al de las hembras, variando su amplitud en función de la disponibilidad de alimento. En hábitats desfavorables, como los dunares de la Devesa de l¿Albufera, representa menos del 30 % de la población total de pequeños mamíferos (Faus, 1990a)

Situación actual:

Pese a la elevada tasa de depredación que puede sufrir el ratón de campo, y por tanto una baja tasa de supervivencia, su alta capacidad reproductora, así como su gran capacidad colonizadora, hacen que este múrido sea una especie abundante. Además, su dieta omnívora y su capacidad adaptativa a variaciones ambientales, permiten que la especie presente una amplia distribución (véase mapa) en toda la Comunitat Valenciana, disminuyendo su densidad poblacional en aquellos hábitats menos favorables que habitualmente ocupan otros pequeños mamíferos. La población del ratón de campo está regulada principalmente, además de por factores extrínsecos, por su densidad, llegándose a inhibir en ocasiones la reproducción de las hembras durante los períodos de incremento poblacional. Un estudio llevado a cabo sobre el ratón de campo en el Parc Natural de la Serra Calderona ha permitido demostrar que la población de este pequeño mamífero está regulada por sus propios helmintos parásitos, siendo estos, a su vez, capaces de ejercer un diferente efecto regulador entre poblaciones estables y poblaciones cuya dinámica se ha visto alterada por un impacto ambiental, como por ejemplo un incendio forestal (Sainz-Elipe, 2009; Fuentes et al., 2010).

Amenazas:

Las poblaciones del ratón de campo pueden sufrir grandes fluctuaciones estacionales e interanuales provocadas por factores tanto bióticos como abióticos (clima, disponibilidad alimentaria, depredación, estado inmunológico, autorregulación de la densidad poblacional, parasitosis y otras patologías,¿). Por ejemplo, la disminución de la densidad poblacional en verano y el aumento en otoño-invierno, adaptada a la disponibilidad alimenticia; la mayor presión de depredación sobre individuos debilitados por patógenos propios de la especie; grandes cambios de temperatura y alteraciones de los regímenes de lluvias (Sainz- Elipe et al., 2012). La alteración del medio forestal por silvicultura a ras de suelo y sobrepastoreo, así como las alteraciones producidas por los incendios forestales y la extracción de madera, quemada o no, utilizando medios mecánicos que impactan sobre el hábitat natural.

Acciones de conservación:

Debido a su amplia distribución y abundancia en la Comunitat Valenciana, no parece necesario tomar ninguna acción preventiva respecto a la conservación de esta especie de múrido. No obstante, ante la continua degradación de los ecosistemas forestales y otras potenciales amenazas, se hace recomendable el seguimiento poblacional del ratón de campo en los diferentes hábitats que ocupa, con la finalidad de seguir confirmando su amplia distribución y cualquier posible indicio de recesión.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2017

Autor ficha: Màrius V. Fuentes
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Apus apus**
Nombre valenciano: Falcia
Nombre castellano: Vencejo común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Descripción y biología:

L 16 cm, P 36-50 g. Insectívoro aéreo de silueta característica, con alas largas, finas y curvadas, y cola ahorquillada y apuntada. Su color es marrón ahumado oscuro, aparentando negro, con una gargantilla blanquecina poco visible. Las aves inmaduras tiene bordes pálidos en las plumas, poco perceptibles en la distancia. Forma grandes bandos escandalosos que desarrollan rápidos giros sobre edificios, patios deslunados y cantiles, mientras emiten chirridos agudos.

Distribución:

En la península Ibérica se encuentra la subespecie nominal, distribuida por el oeste del continente Eurasiático. Se extiende prácticamente por toda España, incluyendo las islas Baleares, pero es muy raro en las islas Canarias. Es un migrante transahariano estricto que se desplaza a sus cuarteles invernales africanos tras la reproducción.

Hábitat:

Especie de hábitos aéreos que, aparentemente, sólo se posa durante la época de reproducción. Ocupa principalmente cavidades de edificios para nidificar, aunque también utiliza huecos en cantiles naturales, en árboles o en palmeras, entre otros.

Situación actual:

Nidifica en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, incluyendo la isla de Nova Tabarca, pero no lo hace en las islas Columbretes. Puede llegar a ser muy numeroso localmente y durante sus pasos migratorios. Es algo menos común en los barrios nuevos de las ciudades y pueblos, donde las casas y otras construcciones suelen tener menos cavidades que permitan su nidificación. Pese a que se ausenta por completo durante el otoño, se han producido avistamientos aislados plenamente invernales, particularmente en localidades de la costa.

Amenazas:

Las principales amenazas vienen representadas por el uso de plaguicidas, así como por la contaminación atmosférica urbana. La carencia de cavidades óptimas para la nidificación en edificios de nueva construcción o la desaparición de las utilizadas en edificios viejos tras su rehabilitación, pueden causar una paulatina disminución de espacios para instalar sus nidos.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Aquila chrysaetos**
Nombre valenciano: Àguila reial
Nombre castellano: Águila real

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Benjamín Albiach Galán

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 80 cm, P 2.850-6.700 g. Ave rapaz de gran tamaño, con una envergadura alar algo superior a los 200 centímetros. Plumaje de coloración marrón oscuro bastante uniforme, con plumas leonadas en la nuca crestada y de forma variable en las partes superiores. Las aves inmaduras son similares a los adultos aunque más oscuras en general, con presencia de blanco en la base de las plumas del ala y de la cola durante sus primeros años de vida.

Distribución:

La subespecie que nidifica en España se distribuye por el sur del continente Eurasiático y por el norte de África. Está distribuida por toda España, estando más ausente de las mesetas, Galicia y depresión del Guadalquivir. Ausente de los archipiélagos. Especie eminentemente sedentaria.

Hábitat:

Ocupa ambientes rupícolas de montaña pero se muestra bastante generalista, pudiendo aparecer en otros ambientes abiertos, evitando grandes masas forestales. Nidifica en cantiles rocosos y más raramente sobre árboles.

Situación actual:

Nidificante en zonas de montaña de las tres provincias, generalmente por encima de los 400 metros de altitud, ocupando algo menos del 30 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. A finales de los años ochenta se estimó una población total de 68 parejas (20 en Castellón, 25 en Valencia y 23 en Alicante). En los años noventa, esta cifra se mantenía en las 66 parejas (23 en Castellón, 27 en Valencia y 16 en Alicante) y en un total de 62 parejas a final de esta década.¿? Esto parece indicar una lenta pérdida gradual de efectivos nidificantes. Algunos ejemplares pueden ser vistos en áreas donde no nidifica fuera de la época de cría.

Amenazas:

Se ha detectado una baja productividad (0,69 pollos/pareja), similar a la encontrada en otras zonas mediterráneas ecológicamente degradadas y antropizadas. La escasa productividad de la especie podría favorecer el descenso de efectivos. Los grandes incendios de las últimas décadas no parecen haberle afectado negativamente, al suponer la apertura de grandes cazaderos abiertos en zonas forestales. La apertura de pistas forestales afecta negativamente cuando discurren próximas a los cantiles rocosos donde nidifica, con el consiguiente incremento de las molestias. Puede verse afectada por la carencia de presas debido a una intensa presión cinegética, a lo que se añade los efectos de la mixomatosis y neumonía en el caso del conejo. La proliferación de palomares con fines deportivos en zonas del interior causa un conflicto entre esta especie y los colombófilos, además de verse afectada por la Tricomoniasis que transmiten las palomas. Aparece afectada por electrocución y colisiones con tendidos.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial. Existen programas oficiales de censo de sus poblaciones nidificantes en la Comunidad Valenciana.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000

Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Aquila fasciata**
Nombre valenciano: Aguila de panxa blanca
Nombre castellano: Águila-azor perdicera

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I

Autor Foto: Sergio Morán

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Rapaz de mediano tamaño, entre 150 y 180 cms de envergadura y 65-72 cm de longitud con la cabeza pequeña pero prominente. Ambos sexos son iguales en coloración aunque la hembra es más grande en tamaño.♂Los adultos presentan el dorso marrón oscuro con una mancha blanquecina en el centro de la espalda y la cola con una banda negra terminal. En las partes inferiores las alas son oscuras, el abdomen es blanco con manchas longuitudinales negras. ♂En los jóvenes, el dorso es de color marrón y la cabeza marrón. Las partes inferiores son de color castaño rojizo y la cola presenta unas bandas transversales mal definidas. ♂Es un ave sedentaria, si bien los jóvenes realizan movimientos dispersivos de radio y dirección irregulares. Los adultos viven asociados en parejas que regentan un territorio de extensión variable, donde encuentran lugares adecuados para nidificar y presas para satisfacer sus necesidades tróficas.Se alimentan de aves, mamíferos medianos y lagartos. ♂ Ponen entre 1 y 3 huevos a principios de febrero, siendo la puesta más temprana cuanto más meridional sea la situación del nido.♂

Distribución:

Especie de amplia distribución. La subespecie europea ocupa el sur de Europa, Norte de Africa, Próximo y Medio Oriente, el subcontinente indio y el sur de China. En Europa se encuentra sin embargo restringida a la península ibérica y sur de Francia, encontrándose en España el 90% de sus efectivos.♂En la Comunidad valenciana ocupa casi todas las sierras litorales y prelitorales, estando solo ausente de los llanos litorales y las sierras de mayor altitud.♂

Hábitat:

Nidifica en cortados rocosos de mediana altitud (el 50% se distribuyen entre los 300 y 700 ms. de altitud). Es rara la nidificación en árbol. Las zonas de dispersión son aún poco conocidas; sin embargo se trata de zonas relativamente llanas, donde no existen parejas reproductoras y abundantes en presas.

Situación actual:

Se considera una especie amenazada a nivel europeo, debido a la reducción de sus poblaciones en Francia y norte de la Península Ibérica. Sin embargo, resulta abundante en Andalucía y parece estable en Extremadura y Comunidad Valenciana. La población española se estima en 700-800 parejas y la de la Comunidad Valenciana en 100-110.

Amenazas:

Son numerosas; desde la transformación de su hábitat y reducción de presas, principalmente el conejo, hasta la persecución directa y el choque ó electrocución con tendidos eléctricos.

Acciones de conservación:

En los últimos años se ha iniciado un programa de prospección y seguimiento de la especie en la Comunidad Valenciana, con el fin de determinar la evolución de su población, el éxito reproductor y eliminar impactos que pudieran afectar al mismo. Igualmente, se ha iniciado la tramitación de un decreto para evitar el impacto de los tendidos eléctricos sobre ésta y otras aves y se informa habitualmente la instalación de tendidos y otras infraestructuras que pudieran afectar a la especie. Igualmente se han construído algunos palomares-barrera para minimizar los daños por predación sobre palomos deportivos y, en consecuencia, mejorar la "actitud social" hacia la especie.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1984 - 2017

Autor ficha: Paloma Mateache Sacristán
Año ficha: 2003

[imprimir]

Nombre científico: **Ardea purpurea**
Nombre valenciano: Agró roig
Nombre castellano: Garza imperial

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 80 cm, P 600-1.200 g. Garza de gran tamaño con plumaje de coloración ♂general castaño grisáceo. Los adultos desarrollan unas listas negras en la ♂cabeza y el cuello, así como un penacho negro en la cabeza. Las aves ♂inmaduras carecen de las marcas negras y son de coloración general más ♂claro. Pico largo y vuelo algo raquítico.♂♂

Distribución:

La subespecie presente en la península Ibérica se distribuye por el oeste del continente Eurasiático y Africa. En España se presenta algo localizada, ocupando el valle del Ebro, el litoral mediterráneo, las mesetas y el valle del Guadalquivir. En invierno se desplaza a sus cuarteles africanos.

Hábitat:

Bastante vinculada con las zonas húmedas y las vegas fluviales que mantienen vegetación palustre. Nidifica en masas de vegetación palustre y más raramente en bosques de ribera. En migración puede aparecer en otros humedales de menor entidad.

Situación actual:

Nidificante habitual en los principales humedales de las tres provincias que mantienen masas de vegetación palustre bien conservadas, incluyendo también a los marjales dels Moros, Xeresa-Xeraco y Pego-oliva. Sus efectivos parecen haber experimentado un importante retroceso desde los años 60, relacionado con el uso de pesticidas en el entorno agrícola de sus colonias de cría, del que todavía no se han recuperado. En la actualidad la población nidificante oscila entre las 100 y 200 parejas, según los años, y su tendencia podría ser estable o ligeramente regresiva. Durante sus migraciones puede ser vista en localidades donde no nidifica. Las citas durante el periodo invernal son raras.

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales donde nidifica supone la principal amenaza. La pérdida de la calidad de las masas de vegetación palustre limita su reproducción. La contaminación de los medios acuáticos y rural puede afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta. Al ser una especie migratoria se encuentra amenazada por el deterioro de las condiciones ambientales en las localidades de invernada en el África subsahariana.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. La protección y conservación de los humedales y de los cursos fluviales garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales. Sus colonias de cría en la Comunidad Valenciana son objeto de censo y control periódico. La especie aparece catalogada como Vulnerable en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 de febrero).

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1984 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Ardeola ralloides**
Nombre valenciano: Oroval
Nombre castellano: Garcilla cangrejera

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 46 cm, P 250-300 g. Garza de pequeño tamaño y hábitos algo retraídos. ♂Plumaje de coloración pardo cremoso, bastante críptico, que descubre unas ♂llamativas alas blancas al iniciar el vuelo. Las aves adultas presentan una ♂cresta larga y un pico de coloración azulada.♂

Distribución:

Especie distribuida por el sur del continente Eurasiático y el África ♂subsahariana. En España resulta muy local durante la cría, apareciendo ♂aisladamente en humedales de las mesetas, del litoral Mediterráneo y en las ♂marismas del Guadalquivir. Algo más regular durante la migración. En ♂invierno la población europea se desplaza mayoritariamente a África, pero ♂algunos ejemplares permanecen en la cuenca Mediterránea.♂

Hábitat:

Ocupa zonas húmedas que cuenten con vegetación palustre que posibilite su ♂cría. Puede ocupar cauces fluviales y embalses con vegetación de ribera. ♂Nidifica sobre vegetación palustre o en bosques de ribera.♂Parece exigir mayor calidad de hábitat que otras especies de garzas.♂

Situación actual:

Nidifica únicamente en las principales zonas húmedas, con colonias en ♂l.Albufera de Valencia y las salinas de Santa Pola. Su población se ha ♂recuperado en las últimas décadas, tras experimentar un importante declive ♂durante los años sesenta. Actualmente sus efectivos se mantienen entre las ♂100 y 300 parejas, oscilando según las condiciones hidrológicas. Existen ♂unos pequeños efectivos invernantes en la Comunidad Valenciana, ♂particularmente en zonas húmedas litorales, como las desembocaduras de ríos.♂

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales supone la principal amenaza. La ♂pérdida de la calidad de las masas de vegetación palustre limita su ♂reproducción. La contaminación de los medios acuáticos puede afectarle ♂directamente o a las especies de las que se alimenta.♂

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. La protección y conservación de los ♂humedales y de los cursos fluviales garantiza la pervivencia de sus ♂poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del ♂agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales. Sus colonias de ♂cría en la Comunidad Valenciana son objeto de censo y control periódico. La ♂especie aparece catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo ♂Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 de ♂febrero).♂♂

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1984 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Arvicola sapidus**
Nombre valenciano: Talpó d'aigua
Nombre castellano: Rata de agua

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo II - Protegidas

Descripción y biología:

La rata de agua es un roedor perteneciente a la subfamilia Arvicolinae, cuyos integrantes se caracterizan por presentar una dieta exclusivamente herbívora. Dentro de este grupo y para la Península Ibérica, es esta especie la que presenta un mayor tamaño, con una longitud cabeza-cuerpo de entre 17 y 23 centímetros y una longitud de la cola de entre 10 y 15 centímetros (aproximadamente unos dos tercios de la longitud cabeza-cuerpo). De aspecto similar a una rata, sus hábitos excavadores y su actividad ligada al medio acuático hacen que presente algunas adaptaciones características, tales como un cuerpo fusiforme, extremidades relativamente largas y una fisiología bien adaptada para el buceo (Román, 2010). Presenta además un pelaje denso, donde casi llegan a ocultarse las orejas, de color pardo en el dorso y grisáceoamarillento en la zona ventral. La vida media estimada en libertad se encuentra entre 12 y 18 meses. Se trata de una especie sociable, que vive formando colonias, si bien pueden encontrarse también núcleos formados por una única pareja. Sus territorios se caracterizan por presentar túneles y madrigueras subterráneas ¿algunas con entradas situadas bajo el agua¿ y suele ser fácil detectar las sendas utilizadas en sus desplazamientos, que son siempre las mismas. Además de madrigueras excavadas, la vegetación densa también puede ser utilizada como refugio, habiéndose localizado en Valencia algunas colonias ubicadas en zarzales. El indicio más característico para localizar la presencia de la especie son sus excrementos, inconfundibles por su contenido exclusivo de materia vegetal triturada, y que pueden aparecer formando letrinas en los cruces de las veredas por donde circulan estos animales, hecho que está relacionado con la comunicación entre los individuos que conforman la colonia. Presenta actividad tanto diurna como nocturna. En cuanto al periodo reproductor, éste puede abarcar casi todo el año, dependiendo de la disponibilidad de alimento. Los individuos son maduros sexualmente hacia las seis semanas de edad. Datos correspondientes a l¿Albufera de Valencia evidenciaron dos picos reproductivos en los meses de julio y septiembre, con tamaños medios de camada de cinco crías (Faus, 1993).

Distribución:

Se encuentra distribuida únicamente por el extremo sudoccidental de Europa, ocupando casi la totalidad de Francia y la Península Ibérica. En la Comunitat Valenciana la rata de agua aparece en las tres provincias. Un sondeo exhaustivo llevado a cabo en el año 2005 sobre 194 estaciones repartidas por ríos y otros tipos de masa de agua (Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad, 2005) dio un total de 97 puntos positivos para la presencia de la especie (un 66 % en la provincia de Valencia, un 49 % en la de Alicante y tan sólo un 19 % en la de Castellón). En 2011, aprovechando

la realización del I Sondeo Nacional para la especie ¿a iniciativa de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos¿ se volvió a muestrear en diferentes puntos del territorio valenciano, dando en general resultados similares a los del año 2005, con una baja presencia de la especie en Castellón (donde no se ha detectado en algunas de las cuencas principales: Palancia, Cérvol e incluso en gran parte del Mijares), ampliamente distribuida en la provincia de Valencia y con menor presencia en la provincia de Alicante (Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad, 2011).

Hábitat:

En la Comunitat Valenciana la encontramos ligada a los principales cursos de agua, así como a barrancos y canales, siempre condicionada a la presencia de vegetación de ribera (gramíneas y juncáceas) que utiliza como alimento. Está presente también en la mayoría de zonas húmedas y marjales litorales del territorio. Esta especie parece encontrar su óptimo en riberas que presenten caudales lentos, con lechos arcillosos o de sustrato blando que le permitan desarrollar túneles y madrigueras donde ubicar sus colonias. En el último sondeo llevado a cabo en la Comunitat Valenciana (Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad, 2011), la mayoría (63 %) de localizaciones de la especie tuvo lugar en cauces de anchura inferior a cinco metros, de orillas arcillosas y con presencia de helófitos (juncos, eneas y/o carrizos).

Situación actual:

No existen trabajos previos que permitan evaluar la dinámica poblacional reciente de esta especie en el conjunto de nuestro territorio, si bien es cierto que los pocos estudios locales llevados a cabo en los años noventa apuntaban ya a cierta disminución en sus poblaciones, consecuencia de la reducción y degradación del tipo de hábitat del que es estrechamente dependiente, las riberas. Así y todo, los sondeos llevados a cabo en estos últimos años indican un buen estado de sus poblaciones en la provincia de Valencia, un aparente declive en algunas cuencas alicantinas (ríos Serpis y Montnegre) y una distribución más restringida en la provincia de Castellón.

Amenazas:

La rata de agua lleva siglos capturándose con fines gastronómicos por toda la geografía española, considerándose una pieza muy apreciada desde el punto de vista culinario. En la Comunitat Valenciana ha formado parte del recetario de muchas poblaciones enclavadas en zonas arroceras, donde la especie era común. También se le han achacado daños en los cultivos de este cereal, tanto por consumo directo de los brotes como por los problemas ocasionados en las motas o paredes que separan los campos, que llegaban a derrumbarse debido a sus hábitos excavadores. Puntualmente se han comprobado daños en plantaciones de chopos en la comarca de Requena- Utiel (Sánchez, 1967). Así y todo, la persecución deliberada por parte del ser humano tiene hoy día carácter anecdótico y no puede considerarse una amenaza. De manera indirecta, en cambio, sí es el ser humano el principal responsable de la rarefacción actual de sus poblaciones, en particular en lo tocante a afecciones sobre las cuencas y cursos de agua, tales como destrucción y quema de riberas o desecación y contaminación de los cauces. Entre sus enemigos naturales se cuentan carnívoros y aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas. Sin embargo la verdadera amenaza guarda relación con la fauna exótica; la competencia con la rata parda (Rattus norvegicus) ¿que desplaza de su hábitat a la rata de agua¿ y la predación por parte del visón americano (Neovison vison) suponen un problema de envergadura para la conservación de esta especie. Diversos estudios llevados a cabo en los 80 en l¿Albufera de Valencia ya señalaban el aumento en las poblaciones de rata parda como principal responsable de la merma de esta especie en diferentes matas del lago (Docavo, 1983; Faus, 1990b).

Acciones de conservación:

La realización de sondeos periódicos, de esfuerzo similar y con la misma metodología, permitirá en los próximos años evaluar la tendencia poblacional de esta especie en nuestro territorio. Del mismo modo, todas las actuaciones de custodia fluvial y protección de hábitats ribereños desarrollados durante las últimas décadas habrían contribuido indirectamente a la conservación de la especie. La rata de agua está catalogada como ¿protegida¿ en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2016

Autor ficha: Jorge Crespo
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Asio otus**
Nombre valenciano: Duc petit
Nombre castellano: Búho chico

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Datos insuficientes

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 36 cm, P 210-330 g. Rapaz nocturna de tamaño medio y silueta alargada, con llamativas "orejas" alargadas que suele mantener erguidas. Tiene los ojos de color anaranjado. Adopta posturas miméticas en las ramas de los árboles, donde duerme durante el día, adoptando una postura estirada. En vuelo muestra unas largas alas, muy blancas por su cara inferior. Suele formar dormideros invernales comunales.

Distribución:

En la península Ibérica nidifica la subespecie extendida por Eurásia. Presenta una distribución dispersa y discontinua en España, siendo menos común en regiones litorales. Presente en ambos archipiélagos, con una subespecie propia en el de las Canarias. Especie sedentaria, aunque las aves juveniles pueden desarrollar dispersiones postgenerativas. Durante la época invernal se reciben efectivos europeos extraibéricos.

Hábitat:

Especie típicamente forestal, prefiriendo masas abiertas de coníferas, pero puede aparecer en otros ambientes mixtos, incluso en grandes parques urbanos. Nidifica ocupando nidos viejos de otras aves, generalmente de córvidos.

Situación actual:

Nidifica muy localmente en las tres provincias, preferentemente en localidades del interior. Ocupa poco más del 20 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. Está principalmente presente en las comarcas interiores de la provincia de Castellón, mostrando una presencia muy puntual en el resto del territorio. No se ha cuantificado su población, sin embargo se extiende actualmente por una superficie parecida a la ocupada a finales de los años ochenta, cuando aparecía en un número similar, o incluso algo inferior, de cuadrículas UTM.

Amenazas:

Las principales amenazas provienen de la alteración de sus hábitats de cría y de la escasez de plataformas donde nidificar en aquellas localidades donde los córvidos son perseguidos o escasos. Parece afectada por el uso de plaguicidas en la agricultura, en zonas colindantes a sus hábitats de cría. Sensible a la caza ilegal y particularmente a las molestias a dormideros comunales invernales.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Athene noctua**
Nombre valenciano: Mussol comú
Nombre castellano: Mochuelo europeo

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 22 cm, P 140-200 g. Rapaz nocturna de tamaño pequeño, de color marrón grisáceo profusamente moteado de blanco. Carece de las "orejas" típicas de los búhos, mostrando una cabeza redonda característica. Tiene hábitos muy conspicuos, incluyendo actividad diurna, acostumbrando a posarse al descubierto sobre postes, señales de tráfico y otros puntos destacados. Emite voces típicas, con maullidos cortos muy audibles.

Distribución:

En la península Ibérica nidifica una subespecie distribuida por Europa occidental. Se encuentra ampliamente extendida en España, siendo más irregular en los grandes sistemas montañosos. Muy local en las islas Baleares y ausente en las Canarias. Especie sedentaria, que se dispersa parcialmente tras la temporada reproductora, particularmente las aves juveniles.

Hábitat:

Ocupa una amplia variedad de hábitats, evitando masas forestales densas y terrenos montañosos. Aparece muy vinculada a los paisajes antropizados y rurales, incluso en ambientes urbanos. Nidifica en oquedades, tanto en las naturales como en las de edificaciones.

Situación actual:

Nidificante muy común en las tres provincias, ocupando prácticamente todo el territorio de la Comunidad Valenciana. No se ha cuantificado su población, pero no parece haber disminuido su área geográfica de presencia en las últimas décadas.

Amenazas:

Al ser una especie próxima a medios antropizados, las principales amenazas provienen de la alteración de sus hábitats de alimentación y las molestias y destrucción de sus lugares de nidificación. Parece afectada por el uso de plaguicidas en la agricultura y por la restauración de edificios viejos donde nidifica. Los atropellos representan un importante factor de mortalidad

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Aythya ferina**
Nombre valenciano: Boix
Nombre castellano: Porrón europeo

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo III.2
· Anexo II.1

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 46 cm, P 700-1.100 g. Anátida buceadora de tamaño medio. El macho presenta la cabeza color castaña sin cresta y el lomo y los flancos grises. La hembra es marrón grisáceo. Las aves inmaduras son similares a las hembras. Ambos sexos muestran alas grisáceas con una tenue franja alar en vuelo.

Distribución:

Especie distribuida por latitudes medias del continente Eurasiático. Los principales efectivos nidificantes en España se reparten por el litoral Mediterráneo, ambas mesetas y la cuenca del Guadalquivir. Muy local en Baleares. Durante la invernada se reciben efectivos europeos, llegando a ser una anátida muy común.

Hábitat:

Ocupa humedales con grandes láminas de aguas, dulces o salobres, ricas en vegetación acuática emergente y sumergida. Nidifica entre la vegetación palustre. Aparece en otros ambientes durante la migración e invernada, incluso en arrozales y en grandes embalses.

Situación actual:

Es un nidificante tradicional en El Hondo y las salinas de Santa Pola, cuya población puede oscilar anualmente entre uno o varios centenares, según las condiciones hidrológicas. Durante la década de los noventa, comenzó a criar en la reserva del Racó de l.Olla, en l.Albufera de Valencia, donde ha ido aumentado hasta la veintena de parejas en 2003. Durante el mismo periodo ha nidificado también en los marjales de El Moro y Almenara en bajo número. Durante la

invernada se hace más común en los principales humedales, con una media superior a los 4.000 ejemplares y máximos de 10.000, concentrados en El Hondo y l.Albufera de Valencia, principalmente.

Amenazas:

El deterioro o la desaparición de los humedales supone una importante amenaza. La pérdida de la calidad de la cubierta vegetal en sus hábitats de cría limita su reproducción. Se trata de una especie cinegética y parece afectado por plumbismo. La contaminación de los medios acuáticos puede afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta.

Acciones de conservación:

La protección y conservación de los humedales que ocupa y de su entorno, garantiza la pervivencia de sus poblaciones. En este sentido, la protección de humedales como los marjales de El Moro y Almenara, así como la gestión de la reserva del Racó de l.Olla, parecen haber favorecido su instalación en estas nuevas localidades de cría. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales. La prohibición del uso de munición de plomo en los humedales es una medida tendente a minimizar el problema del plumbismo.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1991 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Barbus sclateri**
Nombre valenciano: Barb del Segura
Nombre castellano: Barbo gitano

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· No amenzada

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Directiva de Hábitats
· Anexo V

Descripción y biología:

Barbo de mediano-gran tamaño, que puede alcanzar los 40 cm. El pedúnculo caudal es más corto y alto que en los demás barbos, tiene menor número de escamas a lo largo de la línea del cuerpo y presenta un marcado contraste de coloración en los adultos, con dorso oscuro y vientre claro. Se reproduce entre mayo y junio.

Distribución:

Se trata de una especie endémica de la Península Ibérica, distribuida por España y Portugal, desde las cuencas del Guadiana y Segura hacia el sur. En la Comunidad Valenciana aparece únicamente en el Segura.

Hábitat:

Prefiere aguas tranquilas en los cursos medios y bajos, apareciendo también en embalses y ocasionalmente en zonas húmedas y canales de riego litorales

Situación actual:

Existen muy pocos datos recientes sobre su presencia en aguas valencianas, salvo alguna cita en el embalse de El Hondo

Amenazas:

La situación del Segura, altamente contaminado y con escasez de agua por su utilización para el riego, constituye un serio peligro para la propia presencia de la especie en el territorio valenciano

Acciones de conservación:

No se realiza ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 2004 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Blanus cinereus**
Nombre valenciano: Serpeta cega
Nombre castellano: Culebrilla ciega

Autor Especie: **(Vandelli, 1797)**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Víctor Ciscar

Descripción y biología:

Reptil (hasta 28 cm de longitud) de morfología vermiforme, similar a la de una lombriz de tierra, a causa de su completa adaptación a la vida subterránea, como muestra su cuerpo cilíndrico carente de extremidades. Cabeza ligeramente ensanchada y diferenciada del tronco por un surco transversal. Tronco y cola presentan una característica disposición de las escamas en anillos regulares. Hocico romo y ojos atrofiados en forma de puntos negros apenas perceptibles bajo la piel. Color uniforme y poco definido con tonalidades grises o rojizas.♂♂Ponen uno o, excepcionalmente, dos huevos cilíndricos a principio de verano. Se alimenta principalmente de hormigas y otros pequeños artrópodos del suelo, siendo a su vez presa de diversos reptiles, aves y mamíferos.♂

Distribución:

Endemismo ibérico presente en los dos tercios meridionales de la Península. Su forma de vida hace que se trate de una especie mal prospectada. En la Comunidad Valenciana existen citas en las tres provincias, si bien son más escasas en la mitad septentrional.

Hábitat:

Especie mediterránea y termófila de hábitos cavadores y vida principalmente oculta en suelos blandos y orgánicos. Parece preferir áreas de clima benigno con suelos poco arcillosos, sueltos o profundos y cierta humedad. También se oculta frecuentemente bajo piedras como estrategia de termorregulación.

Situación actual:

Se desconoce; es una especie escasamente detectada, debido en parte al método específico que precisa su muestreo y las condiciones atmosféricas favorables que requiere su localización. Es preciso profundizar en el conocimiento de su distribución y abundancia.

Amenazas:

Transformaciones agrarias, sequía y depresión de niveles freáticos, proliferación de predadores como el jabalí, uso intensivo de agroquímicos.

Acciones de conservación:

Ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1981 - 2016

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Bubo bubo**
Nombre valenciano: Brúfol, duc
Nombre castellano: Búho real

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Benjamín Albiach Galán

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 70 cm, P 1.500-3.000 g. Rapaz nocturna de gran tamaño, con largas orejas y ojos de color anaranjado. Cuerpo masivo, de color marrón pardo dorado similar en todas las edades. Las hembras son de mayor tamaño que los machos. Garras poderosas. Emite una voz grave "bú-hu", característica.

Distribución:

La península Ibérica cuenta con una subespecie propia. En España nidifica ampliamente distribuido, a excepción de la cornisa cantábrica y el cuadrante noroeste, donde resulta más irregular. Ausente de ambos archipiélagos. Especie eminentemente sedentaria, aunque las aves juveniles pueden desarrollar importantes dispersiones postgenerativas.

Hábitat:

Ocupa una amplia gama de hábitats, prefiriendo sierras y zonas agrestes, con arbolado disperso o con matorrales. También aparece en otros ambientes, dependiendo de la disponibilidad de alimento. Nidifica en el suelo, generalmente en plataformas de cantiles rocosos, pero también en cavidades.

Situación actual:

Nidificante en zonas de montaña de las tres provincias, tanto del litoral como del interior, ocupando algo más del 50 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. Está más extendido en las provincias de Alicante y Castellón. A finales de los años ochenta, ocupaba el 45 % de las cuadrículas UTM. Entonces se estimó una población total situada entre las 250 y las 300 parejas, siendo más abundante en la provincia de Alicante. Los datos conocidos

podrían indicar cierta estabilidad de efectivos en las últimas décadas. Algunos ejemplares pueden ser vistos en áreas donde no nidifica fuera de la época de cría, particularmente aves inmaduras.

Amenazas:

Se ha descrito la escasez de presas típicas, como los conejos, como una amenaza importante. Esta escasez sería consecuencia de las enfermedades que afectan a esta presa, pero la disponibilidad de sus presas también disminuye con la degradación de sus hábitats. La persecución directa, la caza ilegal y el empleo de cebos envenenados, pueden ser amenazas puntuales. La especie se ve afectada de forma importante por colisión y electrocución con tendidos eléctricos, así como por atropello.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial. Existen algunos programas oficiales y voluntarios de censo de sus poblaciones nidificantes en la Comunidad Valenciana.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1985 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

Nombre científico: **Bubulcus ibis**
Nombre valenciano: Esplugabous
Nombre castellano: Garcilla bueyera

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 51 cm, P 300-400 g. Garza de tamaño medio y de hábitos sociables. Plumaje de coloración blanca. Los adultos desarrollan plumas ornamentales de color ante en la espalda, pecho y nuca, durante la época de cría. Pico corto y amarillento. Las aves inmaduras pueden tener el pico y las patas más oscuros que los adultos y carecen de plumas ornamentales.

Hábitat:

Aunque se vincula principalmente con las zonas húmedas, también ocupa el entorno de los humedales y se extiende por vegas fluviales y paisajes agrícolas o dehesas. También frecuenta ambientes antrópicos, como rebaños, instalaciones ganaderas e incluso basureros. Para nidificar ocupa vegetación palustre y de ribera.

Situación actual:

Nidifica únicamente en las principales zonas húmedas, con colonias en l.Albufera de Valencia, El Hondo y las salinas de Santa Pola. Su población ha experimentado un aumento durante las últimas décadas y parece situarse en torno a las 4.000 parejas, oscilando según las condiciones hidrológicas. Se trata de la garza más abundante de la Comunidad Valenciana donde se localiza unos de los principales núcleos de población de la especie en Europa. Durante la invernada aparece algo dispersa, frecuentando paisajes agrícolas y otros ambientes ajenos a los humedales, pudiendo censarse más de 5.000 ejemplares invernantes.

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales donde nidifica supone la principal amenaza. La pérdida de la calidad de las masas de vegetación palustre limita su reproducción. Se han registrado ejemplares abatidos por caza ilegal y

afectados por atropello. La contaminación de los medios acuáticos y rural puede afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta. Se han observado conflictos derivados del intenso uso que hacen de los vertederos.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. La protección y conservación de los humedales y de los cursos fluviales garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales. Sus colonias de cría y sus poblaciones invernantes en la Comunidad Valenciana son objeto de censo y control periódico.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1991 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Bucanetes githagineus**
Nombre valenciano: Pinsà trompeter
Nombre castellano: Camachuelo trompetero

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo III
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE



Descripción y biología:

L 12,5 cm, P 20-24 g. Pájaro de pico pálido, ancho y corto, cabeza grande y alas largas. Cuerpo de coloración lisa y pálida, los machos con tintes rosados en las alas, capuchón grisáceo y pico rojo pálido, mientras que las hembras y los juveniles tienen el cuerpo pardo grisáceo y el pico rosa pálido.

Distribución:

En la península Ibérica nidifica la subespecie presente en el norte de África que también aparece en las islas Canarias. Se trata de un colonizador reciente de la península, donde se ha detectado su nidificación en el sudeste desde los años setenta, en puntos de Almería y Murcia, recientemente extendidos hasta Granada y Alicante. Realiza dispersiones invernales, que en Almería son del interior hacia la costa.

Hábitat:

Es una especie propia de ambientes muy áridos, con suelos desnudos y una cubierta vegetal pobre, en terrenos abruptos, de barrancos y ramblas. Nidifica en una grieta entre las rocas, donde instala una copa de materia vegetal. En invierno aparece formando bandos en estepas y arenales costeros.

Situación actual:

Nidificante muy local en el interior y centro de la provincia de Alicante, donde desde 2000 se verifica su nidificación en la vertiente sur de la sierra de Crevillente y en las inmediaciones de Xixona. Esta población se ha estimado en 50-70 parejas y parece instalada en la zona desde varios años antes de su reciente descubrimiento. Su presencia como reproductor en Alicante se enmarca en una fase de expansión de la especie en el sudeste ibérico, iniciada en la década de los setenta y no se detectó durante la realización del Atlas de las Aves Nidificantes de la Comunidad Valenciana realizado durante los años ochenta. Existen citas de ejemplares aislados en distintas localidades de la provincia de Alicante e incluso de la de Valencia que obedecen a la presencia de ejemplares dispersivos en movimientos anteriores o posteriores a su reproducción.

Amenazas:

La extremada escasez de su población reproductora y la limitada localización de sus áreas de cría, hacen que esta especie sea altamente vulnerable a cualquier alteración del entorno ocupado actualmente para la reproducción. Entre las amenazas descritas en las poblaciones ibéricas se encuentran la destrucción y transformación de sus hábitats de cría e invernada, el desarrollo urbanístico, la reforestación de los ambientes áridos de los que dependen, la caza ilegal y la disminución de la disponibilidad de agua.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal y aparece catalogada como Vulnerable en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 de febrero). El área de cría en la sierra de Crevillente está catalogada como LIC.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 2002 - 2016

Autor ficha: Juan Antonio Gómez
Año ficha: 2005

[imprimir]

Nombre científico: **Burhinus oedicnemus**
Nombre valenciano: Torlit, alcaravà
Nombre castellano: Alcaraván común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Carlos Pache

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 41 cm, P 370-450 g. Limícola de tamaño medio-grande y largas patas amarillentas. Tiene un plumaje muy críptico y son difíciles de ver, debido al mimetismo con su entorno. Cuerpo pardusco. En vuelo muestra alas negras con llamativas marcas blancas. Pico largo y fuerte, amarillento con la punta negra. Los ojos son amarillos y considerablemente grandes. Los inmaduros son similares a los adultos.

Distribución:

La subespecie presente en la Península Ibérica se distribuye por el Oeste del continente Eurasiático. En España se extiende por el interior y su vertiente Mediterránea, estando ausente del norte y presentando una distribución más discontinua de los sistemas montañosos, así como de las provincias litorales. Aparece en Canarias, donde existen dos subespecies endémicas, y en Baleares. Durante la invernada se reciben efectivos de origen europeo.

Hábitat:

Ocupa terrenos llanos y desarbolados, con frecuencia áridos, apareciendo en pastizales secos, matorrales bajos, pastizales halófilos, así como en paisajes agrícolas de secano o en zonas de pastoreo. Nidifica en el suelo. Durante la migración e invernada puede aparecer en otros ambientes.

Situación actual:

Nidifica localmente en las comarcas interiores de la provincia de Castellón y Alicante, y en menor medida en algún punto del interior de la de Valencia. También nidifica en los saladares de la comarca del Baix Segura. Aparece ocupando el 15 % de las cuadrículas UTM de la Comunidad Valenciana, pero su población nidificante no ha sido cuantificada. Cría en hábitats del interior apropiados para la especie, preferentemente por debajo de los 800 m sobre el nivel del mar, así como en ambientes halófilos del entorno de las lagunas de La Mata y Torrevieja, donde cría un mínimo de 10 parejas. Durante la migración e invernada se pueden observar pequeños grupos en las localidades de cría, que pueden llegar a ser numerosos, superando el centenar de individuos en el caso de las lagunas de La Mata y Torrevieja. También puede ser visto en otros ambientes donde no nidifica, como en dunas o en descampados entre naranjales.

Amenazas:

El deterioro y desaparición de sus hábitats supone la principal amenaza, afectados por la intensificación agrícola, reforestación de paisajes abiertos o la implantación del regadío en zonas de secano. El uso intensivo de pesticidas ligado a la intensificación agrícola le afecta negativamente de forma directa o a las presas de las que se alimenta. Se ve afectado por la caza ilegal.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. La protección y conservación de sus hábitats, particularmente las áreas esteparias del interior de la Comunidad Valenciana, así como los ambientes halófilos de los parques naturales de las lagunas de La Mata y Torrevieja garantiza la pervivencia de sus poblaciones nidificantes y de sus hábitats de invernada.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Buteo buteo**
Nombre valenciano: Aguilot comú
Nombre castellano: Busardo ratonero

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 54 cm, P 100-350 g. Ave rapaz de tamaño medio. Plumaje de coloración variable, caracterizada por mostrar partes superiores marrones bastante uniformes y partes inferiores más pálidas, con marcas oscuras de extensión variable. En vuelo muestra alas y cola anchas y redondeadas, con diferentes diseños que incluyen unas marcas oscuras en el vértice flexor de las alas y un panel blanquecino subterminal, como rasgos típicos. Las aves inmaduras son similares a los adultos.

Distribución:

Especie que se reparte por todo el continente Eurasiático. Está ampliamente distribuida por toda España, aunque con una ocupación algo más fragmentada en la fechada mediterránea, siendo más escaso en el sudeste. Ausente como nidificante en Baleares. En las Canarias nidifica una subespecie diferente. Durante la invernada se reciben efectivos de origen europeo.

Hábitat:

Especie favorecida por los paisajes en mosaico, donde pequeñas masas forestales y setos se alternan con áreas de cultivo y prados. También en otros hábitats intensamente manejados por el hombre. Nidifica habitualmente sobre árboles.

Situación actual:

Nidificante localizado en el interior de las tres provincias, ocupando algo menos del 20 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. Es una especie poco común como nidificante. En los años ochenta se estableció una estima imprecisa de población algo inferior a las 90 parejas, igualmente repartidas por provincias. Más recientemente, se han estimado unas 50 parejas en la provincia de Castellón durante los años noventa. También puede ser vista fuera de las áreas de cría durante la época de invernada.

Amenazas:

Al ser una especie próxima a medios antropizados, los bosques donde nidifica pueden verse afectados por incendios, talas, urbanización, etc. Así mismo, algunos ejemplares son abatidos por disparos y pueden verse afectados por pesticidas organofosforados cuando se alimentan en zonas agrícolas.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial. Existen programas oficiales y voluntarios de censo de sus poblaciones nidificantes en la Comunidad Valenciana.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Charadrius alexandrinus**
Nombre valenciano: Corriol camanegre
Nombre castellano: Chorlitejo patinegro

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 16 cm, P 40-60 g. Limícola de pequeño tamaño y patas negruzcas. Los ♂adultos tienen las partes superiores de color pardo pálido y las partes ♂inferiores blancas. Se caracterizan por mostrar una banda pectoral ♂incompleta y un antifaz de color negro en los machos y pardo en las hembras. ♂Las alas presentan una banda blanca en vuelo. Los inmaduros se parecen a las ♂hembras adultas.♂

Distribución:

La subespecie presente en la Península Ibérica se distribuye por el ♂continente Eurasiático. En España aparece localmente distribuido por el ♂litoral Mediterráneo, las marismas del Guadalquivir y La Mancha húmeda, ♂siendo más ocasional fuera de estas zonas. Presente en ambos archipiélagos. ♂Durante la invernada, parte de los efectivos europeos se desplazan a África.♂♂

Hábitat:

Ocupa ambientes litorales, playas, sistemas dunares, saladares, salinas, ♂desembocaduras y otros paisajes abiertos vinculados con el agua, ♂preferentemente salobre, pero también en arrozales y lagunas de aguas más ♂dulces. Puede tolerar cierta antropización de sus hábitats y ocupar algunos ♂ambientes transformados para el cultivo o en otros usos

(explanadas de uso ♂industrial en puertos, aeropuertos, etc.), siempre que tengan un mínimo de ♂tranquilidad. Nidifica en el suelo, generalmente lejos del agua, en zonas ♂desnudas o con vegetación rala. Algo más estrictamente litoral durante la ♂invernada.♂

Situación actual:

Nidifica a lo largo de los tramos de costa baja del litoral, tanto en zonas ♂húmedas, como en playas y otros ambientes abiertos apropiados. La Comunidad ♂Valenciana alberga algo más del 20 % de la población ibérica, con unas 725 ♂parejas de promedio en los últimos años. Sus efectivos nidificantes se ♂concentran en los saladares alicantinos, destacando las salinas de Santa ♂Pola, con más de 240 parejas de promedio, seguida por El Hondo y las lagunas ♂de La Mata y Torrevieja. Otras concentraciones destacadas aparecen a lo ♂largo del litoral de la provincia de Castellón y en l.Albufera de Valencia. ♂También nidifica en algún embalse, como el de La Pedrera. Pese a ser una ♂especie común, sus efectivos están sufriendo un importante declive y se ♂podrían haber reducido a la mitad en la última década, desapareciendo de ♂algunas localidades como reproductor en estos años. Durante la invernada se ♂superan los 250 ejemplares y se alcanzan máximo de 400 ejemplares, ♂principalmente concentrados en el sur de Alicante♂

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los hábitats que ocupa supone la principal ♂amenaza. La urbanización del litoral y la destrucción de los sistemas ♂dunares y otros hábitats litorales (asociada a la construcción de paseos ♂marítimos, accesos, aparcamientos, etc.) ha causado importantes ♂disminuciones de sus efectivos, así como extinciones locales. El uso público ♂intenso de playas y otros ambientes litorales causa un grave detrimento en ♂la reproducción de la especie. La limpieza mecánica de playas puede resultar ♂perjudicial para las puestas y pollos de la especie y merma la ♂disponibilidad de alimento en estos hábitats, al desestructurar las ♂comunidades de invertebrados detritívoros. La erosión de playas causada por ♂la construcción de puertos y diques también afecta negativamente a sus ♂hábitats de cría y alimentación. La intensificación agrícola en el entorno ♂de los humedales que ocupa puede afectarle directamente o a las especies de ♂las que se alimenta, particularmente por contaminación por pesticidas.♂

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. La protección y conservación de los ♂humedales, particularmente de los saladares alicantinos y de algunos tramos ♂costeros con sistemas dunares, garantiza la pervivencia de sus poblaciones. ♂Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la ♂calidad de las masas de agua continentales.♂

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]





Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Charadrius dubius**
Nombre valenciano: Corriolet
Nombre castellano: Chorlitejo chico

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 15 cm, P 30-50 g. Limícola de pequeño tamaño y patas amarillas. Los ♂adultos tienen las partes superiores de color pardo uniforme y las partes ♂inferiores blancas. Se caracterizan por mostrar una banda pectoral completa, ♂un antifaz y una lista en la frente de color negro. Además presentan un ♂anillo ocular amarillo. Las alas son uniformes y no presentan banda blanca ♂en vuelo. Los inmaduros carecen de las marcas negras de los adultos♂

Distribución:

La subespecie presente en la Península Ibérica se distribuye por el ♂continente Eurasiático y África. Aparece ampliamente distribuido por España, ♂pero de manera algo discontinua, estando más ausente de la cornisa noroeste ♂y de las regiones más montañosas. Presente en ambos archipiélagos. Durante ♂la invernada la mayoría de los efectivos europeos se desplazan a África.♂♂

Hábitat:

Ocupa ambientes vinculados con el agua, preferentemente dulce, en vegas ♂fluviales, lagunas, arenales aluviales, arrozales y graveras, pero también ♂en ambientes halófilos, como marismas o salinas. Tolera ambientes ♂transformados y puede aparecer en regadíos abiertos y explanadas de uso ♂industrial. Nidifica en el suelo, generalmente lejos del agua, en zonas ♂desnudas o con vegetación rala.♂♂

Situación actual:

Nidifica en los principales humedales litorales y su entorno, así como en ♂algunos tramos fluviales abiertos y en orillas de embalses, incluso en las ♂comarcas interiores, como el Rincón de Ademuz. Aparece ocupando poco más del ♂20 % de las cuadrículas UTM de la Comunidad Valenciana. Su población total ♂no se conoce con exactitud, pero la población nidificante en los principales ♂humedales y embalses oscila en torno a las 80 parejas nidificantes, con ♂máximos superando las 100 parejas, mostrando una tendencia al aumento ♂moderado de efectivos en los últimos años. Esta tendencia también se ha ♂registrado en otras regiones ibéricas, como en Cataluña, sin embargo podría ♂ser debida, en parte, a un incremento de la cobertura del territorio durante ♂los censos. Resulta una especie relativamente común durante la migración, en ♂muy diversos ambientes. Los efectivos invernantes son muy escasos y apenas ♂superan la decena de ejemplares de promedio.♂

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales supone la principal amenaza. La ♂intensificación agrícola en el entorno de los humedales que ocupa puede ♂afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta, ♂particularmente por contaminación por pesticidas. Durante la época de ♂nidificación, los cambios en los niveles de inundación, generalmente ♂vinculados a la agricultura, pueden causar la pérdida de nidos o polladas. ♂La extracción de áridos en depósitos aluviales puede acabar con hábitats ♂ocupados para la nidificación, aunque posteriormente pueden ser reutilizados ♂una vez cesa la actividad extractiva.♂♂

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. La protección y conservación de los ♂humedales y de los cursos fluviales garantiza la pervivencia de sus ♂poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del ♂agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales.♂

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Circaetus gallicus**
Nombre valenciano: Àguila serpera
Nombre castellano: Culebrera europea

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 66 cm, P 1.100-2.000 g. Ave rapaz de tamaño medio-grande y de alas anchas. Está caracterizada por tener las partes inferiores muy pálidas, prácticamente blancas, con una presencia variable de marcas oscuras, generalmente formando una pechera. Suele presentar tres barras oscuras en la cola. Las partes superiores son marrón grisáceo. Cabeza bastante redonda con ojos que parecen grandes, recordando a los búhos.

Distribución:

La subespecie presente en España se reparte por el continente Eurasiático. Está ampliamente distribuida por España, siendo más abundante en los sistemas montañosos y concentrando a los principales efectivos europeos. Ausente como nidificante en los archipiélagos Balear y Canario. La población europea se desplaza a África durante la invernada en su mayor parte.

Hábitat:

Especie eminentemente forestal que prefiere paisajes con medios heterogéneos y con la presencia de grandes zonas abiertas. Nidifica habitualmente sobre árboles.

Situación actual:

Nidificante extendido por las principales masas forestales de las tres provincias, donde ocupa algo más del 40 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. Al parecer, se vería favorecida por las pinadas abiertas que suceden a los grandes incendios y se encuentra en aumento en la Comunidad Valenciana. A finales de los años

ochenta se estimó una población nidificante entre 77 y 86 parejas (36 y 42 parejas en la provincia de Castellón, 35 parejas en la de Valencia y entre 6 y 9 en la de Alicante). También puede ser vista fuera de las áreas de cría durante su migración y, más raramente, en época de invernada.

Amenazas:

El abandono de actividades agrícolas en zonas de montaña puede conducir a la recuperación de las masas forestales, causando una reducción de espacios abiertos y una rarefacción de los grandes reptiles de los que se alimenta. Aparece afectada por disparos, colisiones con tendidos y electrocución en postes eléctricos. Las masas forestales donde la especie nidifica pueden verse afectadas por alteraciones del paisaje derivadas de la actividad humana (actividades extractivas, pistas forestales) o incendios.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial. Existen programas específicos de censo de sus poblaciones nidificantes en la Comunidad Valenciana, realizados por personal dependiente de la administración valenciana.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

Nombre científico: **Cisticola juncidis**
Nombre valenciano: Trist
Nombre castellano: Cisticola buitrón

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
· Anexo III
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 10 cm, P 7-9 g. Pájaro insectívoro muy pequeño, de coloración pajiza, profusamente listado de negro, con las partes inferiores crema pálido. Tiene una cola corta redondeada muy singular, con puntas blancas y una banda subterminal negra. Desarrolla un canto monótono, "sít... sít... sít... sít...", emitido en vuelo ondulante a cierta altura sobre la vegetación.

Distribución:

En España se presenta una subespecie propia que alcanza el sur de Francia y el norte de África. Se encuentra muy repartido por toda la península y Baleares, ocupando casi todo el litoral y los valles y llanuras de las cuencas fluviales. Evita los principales sistemas montañosos y las zonas con inviernos rigurosos. Está ausente de las islas Canarias. Tiene una escasa movilidad migratoria, pero realiza desplazamientos hacia las localidades con mayor confort invernal.

Hábitat:

Ocupa llanuras y paisajes abiertos, tanto húmedos como secos, con densa cubierta herbácea, como juncales y carrizales, pero también en otros tipos de vegetación baja, incluyendo cultivos de cereales y huertas de regadío. Puede aparecer en herbazales ruderales secos, incluso en el entorno de ambientes urbanos. Nidifica entre la hierba, en una bolsa de hierbas finas tejidas con telarañas.

Situación actual:

Nidifica repartido de forma algo discontinua por las tres provincias, llegando a resultar muy común localmente. Se distribuye por el litoral de las provincias de Castellón y Valencia, siendo raro en sus comarcas interiores, aunque se extiende por algunos tramos fluviales hacia el interior. En la provincia de Alicante ocupa los tramos de litoral bajo y el interior, particularmente en las comarcas del sur, pero está ausente de las zonas más montañosas. Aparece en terrenos baldíos del entorno de los principales núcleos urbanos localizados en las planas litorales, e incluso en algunos de sus parques. Ocupa en torno al 40 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, una proporción similar o ligeramente superior a la que ocupaba en los años ochenta.

Amenazas:

Demuestra plasticidad a los cambios de los ambientes que ocupa, pero se ve desplazado por la desaparición definitiva de los herbazales de los que depende. Al ocupar terrenos agrícolas, puede verse afectado por el uso de pesticidas.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

Nombre científico: **Coracias garrulus**
Nombre valenciano: Cavaller
Nombre castellano: Carraca europea

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
· Anexo III
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Descripción y biología:

L 31 cm, P 80-110-155 g. Ave robusta, del tamaño de una pequeña paloma, con la cabeza y partes inferiores de color azul brillante y dorso pardusco. Pico muy robusto. Vuelo directo con alas anchas y cola larga, mostrando su viva coloración azulada. Se observa generalmente posada sobre postes o tendidos de cables. Las aves inmaduras tienen la cabeza pálida y su coloración es más apagada.

Distribución:

Especie distribuida por el sudoeste de Eurásia. En España se extiende principalmente por el cuadrante sudoeste de la península, alcanzando Andalucía oriental y Murcia. Es rara o está ausente en el resto, exceptuando un núcleo de población extendido por el valle del Ebro. No nidifica en ninguno de los dos archipiélagos. Es un migrante transahariano estricto que se desplaza a sus cuarteles invernales africanos tras la reproducción.

Hábitat:

Ocupa espacios abiertos, preferentemente secos, con arbolado disperso, pastizales y cultivos de secano. Nidifica en grandes huecos de árboles, en cavidades de taludes o incluso de edificios rurales aislados. Evita regadíos y otras zonas muy antropizadas. Puede aparecer en otros ambientes durante la migración.

Situación actual:

Nidificante muy escaso, prácticamente localizado en las comarcas del Alto Palancia, Campo de Morvedre y Plana Baja, así como en las del Bajo Vinalopó y Bajo Segura. No se ha detectado su nidificación en la provincia de Valencia. Durante sus pasos migratorios puede ser visto en localidades donde no nidifica, particularmente durante la primavera.

Amenazas:

La transformación de sus hábitats óptimos, por cambios en los usos agrícolas o por urbanización, representa una importante amenaza. La intensificación agrícola conlleva la introducción de regadío, el uso intensivo de plaguicidas y la destrucción de sus lugares de nidificación (grandes árboles, casas rurales viejas). Sus hábitos de cazar grandes insectos desde posadero, causan atropellos y electrocución de ejemplares que utilizan los tendidos eléctricos dispuestos generalmente junto a carreteras.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1985 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

Nombre científico: **Coronella girondica**
Nombre valenciano: Serp llisa meridional
Nombre castellano: Culebra lisa meridional

Autor Especie: **(Daudin, 1803)**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Antonio Francisco

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Culebra pequeña, que raramente alcanza 70-80 cm de longitud total. De cabeza pequeña con hocico prominente y redondeado en su extremo. Posee la placa rostral más ancha que alta que no se prolonga entre las supranasales, a diferencia de la culebra lisa europea. Cuarta y quinta supralabiales en contacto con el ojo. Existe una característica banda oscura o negra entre el ojo y la comisura labial que puede continuar formando una brida menos contrastada entre los ojos. Sobre la parte posterior de la cabeza aparece con frecuencia una mancha oscura con forma de V.♂♂Se trata de una especie de hábitos principalmente crepusculares y nocturnos que de día suele permanecer refugiada bajo piedras, troncos o grietas. En áreas más cálidas puede permanecer activa todo el año. El celo tiene lugar en primavera y la hembra, ovípara en contraste con su congénere la culebra lisa septentrional, pone en julio entre 4 y 6 huevos (puede llegar a 16 dependiendo de la talla y condición de la hembra). Las hembras parecen reproducirse anualmente y los nacimientos suelen tener lugar entre finales de agosto y septiembre.♂♂Se alimenta de lagartijas, aunque también depreda micromamíferos e invertebrados. Sus depredadores más comunes son rapaces, otros ofidios y mamíferos.♂

Distribución:

Típicamente circunmediterránea, se distribuye por la península Ibérica, sur de Francia, Italia y norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez). Ocupa la práctica totalidad de la Península y algunas islas, tanto atlánticas como mediterráneas; su ausencia está ligada a condiciones climáticas desfavorables a su termofilia. En la CV está presente a lo largo de toda la franja costera y ocupa ambientes diversos siempre relacionados con clima cálido. Se ha encontrado desde el nivel del mar hasta las mayores altitudes, aunque falta en grandes áreas del interior. Presente en la isla de Tabarca.

Hábitat:

A diferencia de su congénere, la culebra lisa europea, ésta es una culebra básicamente termoxerófila propia de coscojares y etapas degradadas del monte y matorral termomediterráneo. Se localiza frecuentemente asociada a pedreras y roquedos, que favorezcan su termorregulación. Está también presente en cultivos arbóreos de secano del pie de monte serrano y en zonas rurales del prelitoral.

Situación actual:

Se trata de una especie ampliamente distribuida pero poco conocida a causa de sus hábitos retraídos. No obstante, es una culebra relativamente escasa, mejor representada en la zona litoral y prelitoral y menos frecuente e incluso ausente en amplias zonas del interior de clima más riguroso; estas poblaciones, con menos efectivos, estarían más expuestas a procesos locales de declive y extinción.

Amenazas:

La transformación y degradación de hábitats naturales, junto con los incendios forestales, pueden ser su principal amenaza. No obstante, no se considera una especie amenazada.

Acciones de conservación:

Ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.

Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Coturnix coturnix**
Nombre valenciano: Guatla
Nombre castellano: Codorniz común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Datos insuficientes

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Directiva de Aves
· Anexo II.2

Autor Foto: Luis Fidel

Descripción y biología:

L 18 cm, P 70-135 g. Ave de pequeño tamaño. Presenta un plumaje pardo ♂listado muy críptico y unos hábitos muy discretos. Suele detectarse mejor ♂por el canto trisilábico ("pas-pallás") de los machos que presentan un tenue ♂collarín negruzco en la garganta, ausente en las hembras y en los inmaduros.♂

Distribución:

Especie distribuida por el continente Eurasiático. Se encuentra ampliamente ♂extendida por España, aunque muestra discontinuidades de presencia, ♂particularmente en el sudeste y el norte. Presente en ambos archipiélagos. ♂Una buena parte de la población europea se desplaza a África durante la ♂invernada.♂

Hábitat:

Prefiere paisajes agrícolas abiertos, tanto de secano como de regadío, así ♂como herbazales, incluso en alta montaña. Durante la migración puede ♂aparecer en muy variado tipo de ambientes. Nidifica en el suelo, entre ♂vegetación herbácea.♂♂

Situación actual:

♂Repartida de forma algo discontinua por las tres provincias, estando más ♂extendida en Castellón y ocupando poco más del 50 % de las cuadrículas UTM ♂del territorio de la Comunidad Valenciana. Al igual que los efectivos ♂europeos e ibéricos de la especie, sus poblaciones muestran importantes ♂fluctuaciones interanuales. Pese a la dificultad de establecer el tamaño de ♂su población, la especie podría mostrar cierta regresión general. Aunque no ♂se tiene estimas de los efectivos de la Comunidad Valenciana, la especie ♂parece haber experimentado un retroceso en la ocupación del territorio, ya ♂que a finales de en los años ochenta ocupaba un 60 % de las cuadrículas UTM ♂del territorio. Durante la migración e invernada puede aparecer en ♂localidades donde no nidifica.♂

Amenazas:

Aparece afectada por la alteración de sus hábitats típicos de presencia, por ♂intensificación agrícola o cambios en los usos del suelo (reforestación, ♂urbanización). La introducción de semillas de ciclo corto y de cosechadoras ♂rápidas causa importantes pérdidas de nidos y pollos en cultivos de cereal. ♂La especie está altamente influenciada por la gestión cinegética de los ♂cotos de caza, con un incremento de la demanda y la aparición de cotos ♂intensivos, donde se abandona la gestión tradicional en favor del desarrollo ♂de sueltas masivas y de una elevada presión cinegética.♂

Acciones de conservación:

La especie requiere planes técnicos de caza y el seguimiento de sus ♂poblaciones. También aparece beneficiada por actuaciones del manejo del ♂hábitat que promueva paisajes abiertos heterogéneos.♂♂

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Cuculus canorus**
Nombre valenciano: Cucut
Nombre castellano: Cuco común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 33 cm, P 105-130 g. Ave de porte medio, de patas cortas y cola larga. Su vuelo directo y su coloración discreta hacen que su aspecto asemeje al de una pequeña ave rapaz. Los adultos son grises, con las partes inferiores blancas profusamente listadas con finas bandas oscuras. Algunas hembras son de coloración pardusca. Los inmaduros son más oscuros, de color rojizo. Especie parásita, con una variada gama de especies insectívoras hospedadoras. Es un ave discreta que suele ser más oída que vista, cuyo canto característico "cú-cu" suele ser habitualmente escuchado en Primavera.

Distribución:

La subespecie nidificante en la península Ibérica se distribuye también por el norte de África. En España se encuentra ampliamente extendido, mostrando discontinuidades de presencia en los sistemas montañosos más elevados, en las grandes llanuras cerealistas, en las zonas más áridas y en las áreas más urbanizadas. Es un migrante transahariano estricto que se desplaza a sus cuarteles invernales africanos tras la reproducción.

Hábitat:

Ocupa una variada gama de ambientes, desde bosques caducifolios de montaña, hasta zonas húmedas mediterráneas, prefiriendo terrenos arbolados mixtos. Coloca su puesta en nidos atendidos por aves insectívoras (particularmente Sílvidos y Túrdidos).

Situación actual:

Se encuentra ampliamente distribuido por toda la Comunidad Valenciana, apareciendo en más del 95 % de las cuadrículas UTM del territorio, sin embargo aparenta ser una especie poco común. Su extensión geográfica parece haberse mantenido estable en las últimas décadas.

Amenazas:

Debido a su amplio rango de especies hospedadoras, no muestra una dependencia crítica hacia ellas. Se ve afectada por la desaparición de sus hábitats óptimos, como bosquetes de riberas y otros arbolados en las zonas más áridas o incluso carrizales extensos.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Delichon urbicum**
Nombre valenciano: Oroneta cuablanca, oronell
Nombre castellano: Avión común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 12 cm, P 15-21 g. Insectívoro aéreo pequeño, con alas curvadas y cola corta y ahorquillada. Las partes superiores son negruzcas, con brillos azulados y muestran una extensa mancha blanca en la base de la espalda. Las partes inferiores de color blanco.

Distribución:

En la península Ibérica se encuentra la subespecie nominal, distribuida por el oeste del continente Eurasiático. Se encuentra ampliamente extendida por toda España, incluyendo las islas Baleares. Ausente del archipiélago canario. Es un migrante transahariano que se desplaza a sus cuarteles invernales africanos tras la reproducción, sin embargo, existen citas invernales ocasionales en localidades ibéricas.

Hábitat:

Ocupa una gran variedad de ambientes, pero aparece vinculada con ambientes antropizados. Preferentemente en zonas rurales, pero también en grandes ciudades. Nidifica formando colonias de tamaño variable, generalmente en casas y edificios, pero también en roquedos, presas, puentes y en otros tipos de construcciones. Construye una media taza de barro adosada a una pared.

Situación actual:

Nidifica ampliamente distribuido por las tres provincias, ocupando cerca del 100 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, siendo una especie muy común y localmente abundante. Frecuenta tanto los cascos urbanos de las principales ciudades como otros núcleos menores. También aparece en zonas despobladas, donde existan edificaciones adecuadas o cantiles. Durante la migración puede resultar localmente abundante. Las citas invernales son muy raras.

Amenazas:

Las principales amenazas vienen representadas por la destrucción de sus nidos en edificios, tanto por rehabilitación de fachadas como por cuestiones de higiene. Su proximidad a los ambientes antropizados y a las grandes ciudades hace que sea susceptible de entrar en contacto con contaminantes.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Dendropoma petraeum**
Nombre valenciano: Vermètid
Nombre castellano: Vermétido

Origen: Autóctono
Medio: Marino

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM
· Anexo II



Ver más imágenes

Descripción y biología:

Es un gasterópodo con una concha de forma triangular en sección transversal, que describe una espiral irregular y alcanza una talla de unos 40 mm. El diámetro de la abertura suele ser de unos 3 mm y posee un opérculo bien desarrollado. Vive formando agregaciones compactas con otros miembros de su misma especie, cementadas por rodófitas calcáreas (especialmente Spongites notarisii). Puede formar varios tipos de estructuras micro-recifales, dependiendo de la posición de la roca en la cual se implanta. Forma comisas en rocas verticales y plataformas en superficies horizontales, donde protege a la costa de la erosión producida por el oleaje. Estas formaciones pueden alcanzar varios metros de longitud y detrás de ellas se pueden implantar distintas facies de la biocenosis de las algas fotófilas en regímenes calmados. Es una especie dióica con fecundación externa mediante espermatóforos pelágicos que son recogidos por la hembra. Se alimenta por filtración utilizando las branquias que están muy bien desarrolladas.

Distribución:

Suele aparecer en las zonas más templadas del Mediterráneo. En el levante español, su límite geográfico superior aparece en las costas de Castellón y Columbretes y el límite inferior en Almería. En las costas de Alicante, Murcia y Almería llega a alcanzar un desarrollo notable con la formación de arrecifes, como los que se localizan en el Portixol, Peñón de Ifach, Cabo Huertas e Isla de Tabarca (Alicante), en Cabo de Palos (Murcia) y en Cabo de Gata (Almería). En las Islas Columbretes las formaciones están menos desarrolladas y forman placas de reducido espesor.

Hábitat:

Aparece sobre sustrato rocoso de zonas con una buena calidad de las aguas, elevada oxigenación y ausencia de contaminantes. Se encuentra en el límite entre el mesolitoral y el infralitoral, en zonas batidas por el oleaje, donde hay una renovación continua de nutrientes.

Situación actual:

Los efectivos de esta especie están restringidos a zonas de aguas limpias. A lo largo de los últimos años han sufrido una importante regresión debido a la falta de la calidad de las aguas por efectos de la eutrofización.

Amenazas:

La principal amenaza es la eutrofización costera debido a efluentes urbanos, emisarios submarinos etc, cuya consecuencia es la proliferación de clorófitas que recubren las formaciones de vermétidos. Localmente, la utilización de sulfato de cobre por los pescadores deportivos para la extracción de cebos de pesca.

Acciones de conservación:

Realización de un catálogo de existencias así como el control y seguimiento de las zonas de especial interés.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1993 - 2015

Autor ficha: J. R García March, V. Tasso y A.M García Carrascosa
Año ficha: 2004

Nombre científico: **Eliomys quercinus**
Nombre valenciano: Rata cellarda
Nombre castellano: Lirón careto

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo II - Protegidas

Descripción y biología:

Es un roedor de tamaño medio, con una longitud de cabeza y cuerpo de alrededor de 12 centímetros, con cola algo menor y que puede alcanzar los 100 gramos de peso. Tiene un pelaje muy característico, pardo rojizo en las partes superiores y blanco en las inferiores. Presenta una máscara negra sobre los ojos, grandes orejas y la cola terminada en un pincel pintado de negro y blanco. Esta llamativa coloración lo hace fácilmente distinguible de otros roedores, de coloración mucho más uniforme. Su capacidad reproductiva es menor que la de otros micromamíferos. Tiene camadas de 4 a 9 crías (media de 33 camadas localizadas en Sagunto: 5,76), bastante espaciadas por el periodo de dependencia de la madre, pudiendo criar a lo largo de todo el año (Gil-Delgado et al., 2006). Tiene una alimentación omnívora, combinando frutos y semillas con presas animales. En un estudio realizado en naranjales de Sagunto el 45,2 % de la dieta fueron artrópodos y gasterópodos y el 40,2 % materia vegetal, con importante variación estacional (Gil-Delgado et al., 2010). Esta dieta básica puede ser completada con huevos, pollos e incluso aves adultas y otros micromamíferos (Gil-Delgado et al., 2009). Tiene la característica de poder hibernar durante los meses más fríos, aunque en zonas cálidas estaría activo en invierno pero entraría en fase de reposo en los momentos más cálidos del verano.

Distribución:

Es una especie presente en toda Europa, salvo en las Islas Británicas. Es España está presente en todo el territorio peninsular y en todas las Baleares, excepto Ibiza. En la Comunitat Valenciana tiene una amplia distribución, aunque hay muy pocos datos de algunas comarcas.

Hábitat:

Está presente en muchos tipos de hábitats, desde cultivos, a matorrales y bosques. Parece tener cierta querencia por las construcciones rurales y casas de campo, especialmente si están abandonadas. Vive en grupos familiares y tiene actividad fundamentalmente nocturna.

Situación actual:

Especie de amplia distribución pero considerada generalmente como escasa, a tenor de su baja representación en las presas de rapaces nocturnas (Vericad et al., 1976; Martín y Vericad, 1977). No obstante, se ha comprobado su

expansión en el naranjal de Sagunto, a partir de su aparición en 1997. Entre 1999 y 2004 los nidos localizados en esta zona de estudio aumentaron de 1 a 27 (Gil- Delgado et al., 2006).

Amenazas:

Ninguna específica en la Comunitat.

Acciones de conservación:

Ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1981 - 2016

Autor ficha: Juan Jiménez Pérez
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Emberiza calandra**
Nombre valenciano: Cruixidell
Nombre castellano: Triguero

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna
· Anexo III

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 18 cm, P 38-55 g. Pájaro corpulento de pico cónico característico, con la mandíbula inferior más ancha que la superior. Su cuerpo es pardo grisáceo, finamente listado de plumas oscuras, con las partes inferiores pálidas, careciendo de detalles llamativos, al margen de una bigotera pálida. Suele posarse en lugares aventajados, con una postura muy vertical, desde donde canta de forma reiterativa, emitiendo entre pausas una única frase, ¿tsic tsic-tsic-tsi-tsitsisssiiss', de inicio lento y final acelerado.

Distribución:

En la península Ibérica nidifica la subespecie nominal, presente en Europa y el norte de África. En España se distribuye ampliamente por todo el territorio, aunque se ausenta en zonas del litoral Cantábrico y del eje pirenaico. Está presente en ambos archipiélagos. Tiene una movilidad migratoria parcial, abandonando en invierno las áreas más septentrionales de presencia.

Hábitat:

Ocupa ambientes abiertos muy diversos, prefiriendo los paisajes con cultivos herbáceos, tanto de secano como de regadío. Aparece en estepas cerealistas y en otros paisajes agrícolas abiertos, evitando tanto los bosques cerrados como las zonas sin cubierta vegetal. Nido en el suelo, entre plantas, en una copa de hierba.

Situación actual:

Nidificante muy extendido por las tres provincias de la Comunidad Valenciana, mostrando pequeñas áreas de ausencia en las comarcas centrales de la provincia de Valencia y en localidades litorales de la provincia de Alicante. Ocupa cerca del 92 % de las cuadrículas UTM de la Comunidad Valenciana, lo que representa una presencia similar a la registrada en la década de los ochenta. Muestra mayores densidades en las áreas más abiertas y escasea o

desaparece en las localidades más arboladas o en los medios muy urbanizados. Fuera del periodo reproductor puede aparecer en localidades donde no nidifica, pero no es muy común fuera de sus áreas de presencia.

Amenazas:

Se ve afectado por los cambios en el uso del paisaje (urbanización, intensificación agrícola, uso de pesticidas., etc) La desaparición de la vegetación herbácea marginal de los cultivos cerealistas y la intensificación de uso o la desaparición de los barbechos, le afectan negativamente.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Emberiza cirlus**
Nombre valenciano: Sit golanegre
Nombre castellano: Escribano soteño

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 16,5 cm, P 20-28 g. Pájaro de pico cónico característico, con la mandíbula inferior más ancha que la superior. Tiene el dorso de color pardo grisáceo, listado de negro y las partes inferiores amarillentas. Los machos tienen la cara amarilla y presentan una lista ocular y una garganta de color negro, así como una banda pectoral de color verde oliva. Las hembras tienen un diseño facial contrastado entre el fondo amarillento y las listas faciales oscuras, pudiendo ser reconocidas de otras especies similares por una mancha verde oliva en la base de la espalda.

Distribución:

Especie monotípica de distribución Europea. En España ocupa principalmente la mitad norte peninsular y aparece de forma más discontinua en el resto. Nidifica en las islas Baleares, pero está ausente de las islas Canarias. Tiene una movilidad migratoria moderada.

Hábitat:

Ocupa ambientes muy diversos, prefiriendo los paisajes con formaciones arboladas abiertas, tanto en terrenos de montaña como en llanuras costeras. Ocupa terrenos agrícolas arbolados, riberas de ríos, bosques aclarados o de repoblación, terrenos baldíos, e incluso parques urbanos. Nido instalado en arbustos, en una copa de hierba y musgo. Fuera del periodo reproductor suele aparecer en otros ambientes abiertos.

Situación actual:

Nidificante presente en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, tanto en las comarcas litorales como en las del interior. Está más extendido en las provincias de Castellón y Alicante, así como en las comarcas costeras y centrales de la provincia de Valencia. Presenta alguna discontinuidad de presencia en comarcas interiores, como las de Los Serranos, Valle de Ayora o Vinalopó Medio. Ocupa cerca del 82 % de las cuadrículas UTM de la Comunidad Valenciana, lo que representa una presencia superior a la registrada en la década de los ochenta, cuando aparecía en

el 71 % de las cuadrículas. Este aumento de presencia parecen más evidente en las provincias de Castellón y Alicante. Fuera del periodo reproductor puede aparecer en localidades donde no nidifica, pero no es muy común fuera de sus áreas de presencia.

Amenazas:

Puntualmente puede verse afectada por los cambios en el uso del paisaje, como la urbanización, la intensificación agrícola y el uso de pesticidas.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Eptesicus serotinus**
Nombre valenciano: Rata penada d´horta
Nombre castellano: Murciélago hortelano

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Hábitats
· Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE



Ver más imágenes

Descripción y biología:

Según estudios moleculares recientes, los murciélagos de esta especie que habitan en la Península Ibérica corresponderían a un complejo formado por dos especies crípticas y alopátricas, Eptesicus serotinus y Eptesicus isabellinus, sobre las que la falta de suficiente información sugiere referirse a ambas en su conjunto. Se trata de un murciélago de tamaño grande. El pelo es largo y de color variable según el área geográfica. En la parte septentrional de la Comunitat Valenciana el dorso es pardo oscuro, mientras que en la parte meridional es pardo amarillento. Los primeros corresponderían probablemente a Eptesicus serotinus mientras que los segundos a Eptesicus isabellinus. El vientre es siempre de color más claro que el dorso. Las zonas de la cabeza descubiertas de pelo son negras. Las orejas son triangulares, cortas y con cinco pliegues transversales. El trago mide alrededor de un tercio de la longitud de

la oreja, es lineal, ligeramente curvado hacia dentro y con su extremo redondeado. Las alas son oscuras y anchas, insertándose el plagiopatagio en la base de los dedos de los pies. El espolón mide hasta la mitad de la longitud del uropatagio. El lóbulo postcalcáneo está bien desarrollado (Dietz et al., 2009). Se diferencia del nóctulo pequeño en que, éste, tiene las orejas redondeadas, el trago arriñonado y las alas más estrechas. Los ejemplares capturados en la provincia de Alicante son en general más claros y el diámetro del antebrazo y el peso son menores por lo que parecen ser E. isabellinus. Los ultrasonidos se emiten con una componente inicial de frecuencia modulada y otra terminal casi constante, dándose la máxima intensidad entorno a 26 kHz. En la Comunitat Valenciana se han detectado bastantes ejemplares que emiten una señal de frecuencia casi constante entre 20 y 22 kHz. No hay información sobre las señales acústicas de E. isabellinus en otras regiones y por lo tanto no sabemos si estas señales pueden corresponder a esta especie. Posee un marcado carácter gregario y una característica segregación sexual en la época de cría cuando, preferentemente en zonas bajas, se constituyen colonias de hembras de varias decenas de individuos como las que con 57 y 28 individuos se han localizado respectivamente en un edificio de Nules y otro de Valencia. Los machos, mientras, viven aislados, como un macho localizado en una grieta de Tuéjar, o en pequeños grupos, como 5 machos capturados en una cavidad de Ayora, y tanto en zonas bajas como elevadas, habiéndose localizado en las últimas en mayores proporciones que las hembras. Sobre 42 individuos capturados en áreas montañosas situadas por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, 38 (90,5 %) fueron machos mientras que 4 (9,5 %) fueron hembras. Así mismo, sobre 10 individuos capturados en zonas situadas por debajo de los 400 metros de altitud, 9 (90 %) fueron hembras mientras que sólo 1 (10 %) fue macho. Por lo que se refiere a la reproducción, en términos generales, finalizada la hibernación en primavera, tiene lugar la fecundación y constitución, preferentemente en zonas bajas y en los mismos refugios de años anteriores, de colonias de cría.

Distribución:

Es una especie de amplia distribución paleártica que se localiza desde las costas atlánticas de Portugal hasta las pacíficas de China y desde el norte de África hasta Dinamarca. En Europa vive en todos los países de la Unión Europea, excepto Irlanda, estando especialmente presente en España, Italia y Portugal. En España se distribuye por todas las comunidades autónomas siendo especialmente frecuente en áreas bajas y de clima suave. Los ejemplares que viven en la mitad norte de la Península Ibérica parecen corresponder a Eptesicus serotinus mientras que los que habitan en la mitad sur a Eptesicus isabellinus. La Comunitat Valenciana podría ser un territorio en el que se encontraría el límite de distribución de ambas especies, viviendo la primera de ellas en su parte septentrional y la segunda en su parte meridional. De la Comunitat Valenciana no se poseen apenas datos sobre su distribución en el pasado. No obstante, se supone que, ésta, no debe diferir demasiado de la actual. En la actualidad, es una especie que, probablemente, habita en casi todo el territorio, disponiéndose de citas de más de 60 cuadrículas UTM de 10 x 10 y habiéndose observado desde las localidades más septentrionales, como Fredes en la comarca de l¿Alt Maestrat, hasta las más meridionales, como Cox en la comarca de El Baix Segura y desde las más orientales y costeras, como Dénia en la comarca de La Marina Alta, hasta las más occidentales y de interior como Losilla de Aras en la comarca de Los Serranos.

Hábitat:

Se trata de una especie que aunque ha sido localizada en gran variedad de hábitats prefiere los de carácter antropógeno, tanto urbanos como rurales, al haber sido capaz de adaptarse, para instalar sus refugios, a los resquicios de las construcciones humanas y al poder explotar con facilidad los recursos alimentarios que estos ambientes ofrecen. Su principal factor limitante lo constituye la disponibilidad de refugios. En el medio natural, se localizan principalmente en fisuras de rocas y cavidades subterráneas (se han localizado hasta en 24 cavidades) mientras que, en ambientes antropógenos, se ubican en juntas de dilatación, cajas de persianas y otros resquicios similares (se han localizado en edificios de Nules, Valencia y Alginet). Es característica la filopatria que exhiben por sus refugios, especialmente si se trata de refugios de cría. Dado el carácter sedentario de la especie, los refugios utilizados en el periodo de actividad y de hibernación deben estar próximos entre sí, suponiéndose son además similares excepto en el caso de cavidades subterráneas sobre las que no se he detectado su uso para hibernar. En general, los territorios de caza y campeo se sitúan en las proximidades de los refugios, siendo amplios y abiertos y correspondiendo principalmente a zonas agrícolas y pantanosas. En ambientes rurales de la Comunitat Valenciana se ha observado con frecuencia volando sobre zonas agrícolas de bastantes poblaciones y sobre puntos de agua, a los que acuden a beber o cazar, tales como balsas de riego, pequeños cursos de agua, pantanos como el de Sichar y marjales como las de Nules-Burriana y Pego-Oliva. En ambientes urbanos se ha detectado en plazas de varias poblaciones, en parques como el de Benicalap y en la periferia de bastantes núcleos urbanos.

Situación actual:

Se trata de una especie que, según el Plan para la conservación de los Quirópteros de la UICN, se encuentra en una situación de ¿bajo riesgo¿ (Hutson et al., 2001). En la Comunitat Valenciana la situación es, probablemente, similar al tratarse de una especie presente y muy abundante en casi todo el territorio aunque se desconoce el número de ejemplares o la densidad en su territorio. Se poseen numerosas citas, de la mayoría de las comarcas y de prácticamente todo tipo de hábitats, que abarcan desde el nivel del mar hasta las cotas más altas de los macizos montañosos del interior como es el caso del de Penyagolosa, donde se ha localizado a 1.500 metros sobre el nivel del mar (Albesa y Ros, 2005). Se han localizado colonias de cría en zonas bajas como Nules (actualmente sellada) y Valencia y se poseen datos de capturas de hembras gestantes en localidades costeras como Godella y Rótova y en otras de interior como Ares del Maestrat y Fredes. Se estima que en las zonas bajas puede llegar a ser una de las especies más frecuentes y abundantes gracias a la importante disponibilidad de refugios y recursos alimentarios.

Amenazas:

La posibilidad de explotar diversos tipos de hábitats y la importante disponibilidad de refugios conlleva el que la especie, como tal, no se encuentre especialmente amenazada en la Comunitat Valenciana. Los principales factores de amenaza sobre la especie se refieren a las actuaciones sobre el hábitat. El sellado de los refugios, como sucedió con la colonia de Nules, impide cuanto menos su reinstalación dada la característica filopatrica de la especie, siendo el perjuicio máximo cuando ocurre además en periodos críticos como la reproducción o la hibernación. Las alteraciones de los territorios de caza y campeo consisten principalmente en la reducción de las zonas agrícolas en las que buscan el alimento y en el uso masivo de antihelmínticos que, junto con prácticas agrícolas como el arado y la siembra de pastos, destruyen las larvas de los insectos que constituyen sus presas. Así mismo, los individuos como tales, pueden verse amenazados al tratarse de una especie muy sensible a la intoxicación por los biocidas que se utilizan tanto en las propias zonas agrícolas como en el tratamiento de desvanes. Por último, otro factor de amenaza sobre los individuos lo constituye la posible persecución en los cascos urbanos, si bien estos hechos son de escasa entidad.

Acciones de conservación:

La especie está incluida en el Anexo II de los convenios de Berna y Bonn, en el Anexo IV de la directiva Habitas (Directiva 92/43/CEE) y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). No existen actualmente planes de conservación de carácter nacional ni comunitario, reduciéndose los existentes a ámbitos locales y a la creación de una oficina de atención al ciudadano, gestionada desde el Centro de Recuperación de Fauna ¿La Granja¿ de El Saler, dependiente de la Generalitat Valenciana, que trata de dar solución a las molestias que originan los murciélagos urbanos. Sería de gran importancia promover la protección de los refugios y la regulación del uso de biocidas, tanto en zonas agrícolas como en desvanes, así como incrementar las campañas informativas y las actividades de educación ambiental. De igual modo, resultaría de interés iniciar un plan de inventariado y seguimiento de colonias con el objeto de conocer mejor su distribución, estatus y dinámica poblacional como paso previo al planteamiento de medidas específicas de conservación.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1997 - 2015

Autor ficha: Joaquín Albesa
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Falco peregrinus**
Nombre valenciano: Falcó pelegrí
Nombre castellano: Halcón peregrino

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 43 cm, P 600-1.300 g. Halcón de tamaño grande, con alas apuntadas anchas y cola corta. Los adultos tienen las partes superiores grises y partes inferiores blanco cremoso, profusamente barradas en negro, con un capuchón oscuro y una bigotera muy marcada sobre las mejillas blancas. Las aves inmaduras son más marrones.

Distribución:

La subespecie nidificante en España se distribuye por el sur del continente Eurasiático. En España nidifica ampliamente distribuido, incluyendo el archipiélago Balear. Está aparentemente vinculado con la existencia de roquedas, mostrando amplias áreas de ausencia en el sudoeste y en el centro, resultando más común en el norte y mitad oriental. Durante la invernada se reciben efectivos de origen europeo.

Hábitat:

Muy vinculado a la presencia de cantiles abruptos, tanto en el interior como en la costa, con diferentes tipos de cubierta vegetal. También en paisajes más abiertos, cuando hay algún cerro testigo o grandes castillos cerca. Aparece en grandes urbes. Nidifica en diversas cavidades y terrazas, particularmente en cantiles rocosos, pero también en grandes edificios

Situación actual:

Nidificante en zonas de montaña, tanto del litoral como del interior ocupando algo más del 30 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, siendo aparentemente más escaso en la provincia de Valencia. A finales de los años ochenta se estimó una población total algo superior a las 120 parejas (46 en Castellón, 40 en Valencia y 40 en Alicante). No se conocen estimas posteriores, pero actualmente, el número de cuadrículas ocupadas en la provincia de Valencia se ha reducido considerablemente con respecto a las ocupadas a finales de los años ochenta, mientras que en el resto se han mantenido similares durante el mismo periodo. De hecho, la especie también ocupada un 30 % de las cuadrículas UTM del territorio hace dos décadas. Recientemente una pareja ha nidificado en las islas Columbretes, así como en la ciudad de Valencia. Algunos ejemplares pueden ser vistos en áreas donde no nidifica fuera de la época de cría, particularmente aves inmaduras.

Amenazas:

Puede verse afectado por el expolio de nidos en las zonas más humanizadas. La proliferación de palomares con fines deportivos causa un conflicto entre esta especie y los colombófilos, además de verse afectada por la Tricomoniasis que transmiten las palomas. Existen datos puntuales de electrocución y colisiones con tendidos.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1988 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Falco tinnunculus**
Nombre valenciano: Soliguer
Nombre castellano: Cernícalo vulgar

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 34 cm, P 190-300 g. Ave rapaz de pequeño tamaño, de alas apuntadas y cola larga. El macho es pardo rojizo, con capuchón gris y con gris en la cola. Presenta una bigotera oscura en la cara. La hembra es de color pardo profusamente marcado de plumas oscuras tanto en partes superiores como inferiores. Ambos sexos tienen las uñas negras. Las aves inmaduras son similares a las hembras.

Distribución:

La subespecie que nidifica en España se distribuye por el oeste del continente Eurasiático. Está presente en la práctica totalidad del territorio peninsular y en ambos archipiélagos, representando la más común de todas las rapaces. Durante la invernada se reciben efectivos de origen europeo.

Hábitat:

Ocupa una amplia variedad de hábitats, tanto litorales como de interior, particularmente paisajes antropizados, incluso ambientes urbanos. Nidifica habitualmente en nidos viejos de otras aves grandes, sobre árboles o en cantiles, en cavidades e incluso en edificios.

Situación actual:

Nidificante muy común en las tres provincias, ocupando hasta el 95 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. A finales de los años ochenta se estimó una población total próxima a las 500 parejas nidificantes (86 en Castellón, 156 en Valencia y 250 en Alicante), cuando la especie ocupaba el 83 % de las cuadrículas UTM del territorio. No existen estimas posteriores, sin embargo, si se tiene en cuenta el incremento en las

cuadrículas ocupadas, podría haber experimentado un aumento como nidificante en las últimas décadas. Algunas parejas nidifican en las principales ciudades de las tres provincias. Durante la invernada puede hacerse más común en localidades donde no abunda como nidificante.

Amenazas:

Al ser una especie próxima a medios antropizados, las principales amenazas provienen de la alteración de sus hábitats de alimentación y las molestias y destrucción de sus lugares de nidificación. Muy afectada por electrocución.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Felis silvestris**
Nombre valenciano: Gat salvatge
Nombre castellano: Gato montés europeo

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Hábitats
· Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Se trata de un gato grande y robusto, de tonos pardo- grisáceos con algunas rayas negras distribuidas por su voluminosa cabeza, cuello y extremidades. Presenta también una raya vertebral bien definida que parte entre los omóplatos y acaba antes de la base de la cola. Ésta es gruesa y terminada en una borla redondeada negra, precedida de 2-3 anillos bien marcados. Su peso varía en general entre 2 y 7 kilogramos, con medias para los ejemplares ibéricos adultos en torno a los 4,7 kilogramos para los machos y los 3,7 para las hembras. La longitud total media se sitúa sobre los 85 centímetros de los que algo más de un tercio corresponden a la cola. Esta especie, dio origen a los gatos domésticos (F. catus) con los que hibrida, siendo posible la confusión en el campo con los ejemplares de aspecto atigrado. Sin embargo, salvo ciertas razas, en éstos y en los híbridos de primera generación la cola es delgada y acabada en punta, además de no mantener fielmente el patrón de coloración de los monteses. En libertad pueden vivir entre 6 y 12 años. El celo normalmente tiene lugar entre enero y marzo, siendo ambos sexos polígamos por lo que las hembras pueden ser cubiertas por varios machos. Tras una gestación de 62-69 días, los partos tienen lugar sobre todo en abril, con camadas medias de entre 2 y 4 gatitos. Éstos se independizan hacia los 3-4 meses, aunque pueden permanecer más tiempo en el territorio materno, alcanzando la madurez sexual a los 10 meses. Solitario y territorial, el tamaño de las áreas de campeo varía mucho entre las diferentes regiones europeas estudiadas (175-5.000 hectáreas), lo que se relaciona con el sexo, la edad, el hábitat y la disponibilidad de presas. En general los territorios de los machos tienden a solaparse con los de varias hembras y éstas tienden a excluir en mayor medida que aquellos a individuos del mismo sexo. Generalmente son crepusculares y nocturnos, aunque presentan también actividad diurna que aumenta durante el invierno, allá donde la presentan también sus presas principales y probablemente en zonas tranquilas donde no es perseguido. Se trata de un especialista facultativo, constituyendo los conejos o los roedores sus presas básicas en función de su disponibilidad en el medio aunque cuando aquellos escasean se comportan de forma más generalista, incorporando en mayor proporción mamíferos insectívoros, aves, reptiles o artrópodos

Distribución:

El gato montés se distribuye de forma fragmentada por toda Europa alcanzando también el Cáucaso y Asia Menor. En España existen poblaciones por toda la península, aunque parece ausente en algunas áreas muy humanizadas o

transformadas. En la Comunitat Valenciana se encuentra bien distribuido, con citas de presencia en casi todos los sistemas montañosos y forestales de cierta entidad, en el interior de las tres provincias. Llega incluso a aproximarse al litoral en puntos como la sierra de Irta y las estribaciones montañosas de la Safor y las dos Marinas, así como en el entorno de la sierra de Escalona y la dehesa de Campoamor, una de las zonas donde parece más abundante.

Hábitat:

En el territorio valenciano se le ha detectado en todo tipo de formaciones forestales (pinares, bosques de quercíneas, sotos y matorrales diversos) con citas entre casi el nivel del mar y 1.500 metros de altitud. Parece más frecuente en zonas de matorral, mosaico monte-cultivo, carrascales y las proximidades de ríos y ramblas: medios donde parece encontrar una mejor estructura de hábitat y/o mayor disponibilidad de presas. En un estudio mediante trampeo en vivo realizado en el PN de la Font Roja (Campo et al., 2003) se vio que el gato montés prefería las zonas de encinar a las de pinar y dentro de aquellas seleccionaba los lugares más abruptos y con mayor cobertura arbustiva, presentándose también en las zonas de ecotono monte-cultivo. Por otro lado en muestreos realizados en zonas del interior de la provincia de Valencia (sierra de Martés, macizo del Caroche y valle del Cabriel) se ha encontrado que el gato montés es más frecuente en zonas de mosaicos de matorral y pastizal donde el conejo es abundante, así como en las proximidades de arroyos y ríos donde abunda la rata de agua (datos propios inéditos). Igualmente en el sur de la provincia de Alicante, donde la especie se distribuye por buena parte de las pequeñas sierras y cabezos, la abundancia del conejo favorece mayores densidades de gato montés, asociándose éstas a mosaico de monte y cultivos de secano (Pérez- García et al., 2008).

Situación actual:

Como se aprecia en el mapa la especie se encuentra bastante bien distribuida en nuestro territorio, aunque sus densidades deben de ser bajas en la mayor parte de las zonas y no existe suficiente información sobre la evolución reciente de sus poblaciones ni sobre la incidencia de hibridación con el gato doméstico Felis catus.En un estudio específico mediante fototrampeo realizado en zonas montañosas y forestales de gran extensión del suroeste de la provincia de Valencia (Barona, 2001, 2003 y datos inéditos) se identificaron 8-10 ejemplares distintos, todos ellos pertenecientes a la forma silvestre y sin signos evidentes hibridación, obteniéndose una densidad mínima de 0,53 ej./100 ha en áreas de hábitat favorable de la Muela de Cortes. De forma parecida en el sur de Alicante (Pérez-García et al., 2008), con un paisaje forestal mucho más parcheado, se constató la dominancia de ejemplares de la forma silvestre en los parches mejor conservados y de la forma doméstica en los que soportaban mayor grado de antropización, detectándose además posibles híbridos en algunos puntos.

Amenazas:

La pérdida de pureza genética es uno de los factores que podrían amenazar en mayor medida las poblaciones de gatos monteses en especial en las áreas litorales y más humanizadas, sin embargo no se dispone de información al respecto en la Comunitat Valenciana. Es todavía perseguido por daños a la caza y es afectado por diversas prácticas de control de predadores entre las que destaca el uso de jaulastrampa con cebo vivo destinado al control de predadores. El gato montés es especialmente susceptible de ser capturado en este tipo de trampas y si bien puede ser liberado de ellas por la persona que realiza la revisión, en la práctica mueren muchos ejemplares por este motivo. El 46,7 % de los gatos monteses que han entrado en los Centros de Recuperación de Fauna de la Comunitat Valenciana desde 1994 (n=15) lo hacen por trampeo y el 40 % por atropello (Crespo et al. 2009 y datos inéditos), mientras que en un estudio realizado en el sur de Alicante (Pérez-García et al., 2008) sobre 20 ejemplares muertos entre 1980 y 2008, el 60 % se debió a la persecución humana (cepos y jaulas-trampa), el 20 % a atropello y el 15 % a caídas en balsas de riego. En general estos factores deben afectar de forma más grave a las poblaciones de gatos monteses de pequeño tamaño y poco conectadas entre sí, como probablemente ocurra en parte de la provincia de Alicante y la franja litoral de las tres provincias donde la continuidad forestal es menor y la distribución de la especie más fragmentada. Pérez-García et al. (2008) constatan extinciones locales en zonas aisladas por autovias y calculan para la población estudiada una alta probabilidad de extinción en 100 años, que se reduciría si se garantiza la conexión con la población murciana

Acciones de conservación:

No se ha realizado ninguna concreta, aunque parte de sus poblaciones se encuentran en espacios naturales protegidos o en espacios propuestos para formar parte de la Red Natura 2000 y desde la Generalitat Valenciana se han apoyado los estudios del suroeste de Valencia y el sur de Alicante. Como con otros carnívoros le beneficiaría la erradicación del uso de métodos no selectivos de control de depredadores, especialmente el uso de jaulas trampa con cebo vivo y la sensibilización del sector cinegético sobre su importancia en los ecosistemas. La toma de medidas para evitar atropellos y favorecer la permeabilidad de infraestructuras lineales pueden ser especialmente importantes para conservar poblaciones de pequeño tamaño, lo mismo que la toma de otras medidas que favorezcan la conectividad entre poblaciones, la preservación de la calidad del hábitat, evitar los cambios de uso y el aumento de la urbanización (Pérez-García et al., 2008).

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1993 - 2016

Autor ficha: Javier Barona
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Fulica atra**
Nombre valenciano: Fotja
Nombre castellano: Focha común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo III.2
· Anexo II.1

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 38 cm, P 575-900 g. Ave de tamaño medio. Los adultos tienen una coloración general negruzca, con una fina banda terminal blanca en el borde las alas. El pico con escudete frontal es blanco y le confiere un aspecto característico. Las aves inmaduras tienen una coloración más pálida, pero pronto se parecen a los adultos.

Distribución:

La subespecie presente en la Península Ibérica se distribuye por el continente Eurasiático. En España aparece ampliamente distribuido aunque con una presencia muy discontinua y limitada a humedales con presencia de aguas abiertas y tranquilas, pese a lo cual resulta una especie común. Ocupa las principales cuencas fluviales, los humedales y las desembocaduras del litoral. Está presente en ambos archipiélagos. Su población es residente, pero se reciben efectivos de origen Europeo durante la invernada.

Hábitat:

Ocupa una variada gama de humedales, incluso salobres, prefiriendo aquellos con láminas de aguas tranquilas y con abundancia de vegetación subacuática. Durante la invernada frecuenta incluso aguas marinas tranquilas, en estuarios y ensenadas. Puede aparecer en medios más antropizados, siempre que cuente con recursos tróficos. Nidifica entre la vegetación palustre.

Situación actual:

Nidifica en los principales humedales del litoral, los saladares del sur de Alicante y aisladamente en algún embalse de las tres provincias. Su población es de unas 1.200 parejas de promedio, con valores que han oscilado entre las 300 y las 2.100 parejas según años. Las principales localidades de cría en los últimos años han sido El Hondo, las salinas de Santa Pola y los marjales de El Moro, Almenara y Xeresa-Xeraco. El marjal de Pego-Oliva era la tercera localidad de cría hasta 1994, cuando contaba con 100-300 parejas nidificantes según los años, desapareciendo prácticamente

desde entonces. La población nidificante ha experimentado una notable tendencia decreciente en las últimas décadas. Durante la invernada se censa un promedio de 7.200 ejemplares, con valores que han oscilado entre los 1.500 y los 14.900, principalmente concentrados en El Hondo, las salinas de Santa Pola y los marjales de Almenara. El marjal de Pego era la tercera localidad de invernada hasta 1994, cuando contaba entre 1000-1500 ejemplares según los años, desapareciendo prácticamente como invernante desde entonces. En conjunto, los efectivos invernantes han mostrado una tendencia decreciente en las últimas décadas.

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales supone la principal amenaza. La degradación o la destrucción de la vegetación palustre limita su presencia. La contaminación puede afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta, siendo muy sensible a la desaparición de la vegetación subacuática. Se trata de una especie cinegética muy codiciada, lo que podría estar agravando la situación de crisis demográfica que muestran sus poblaciones nidificante e invernante en la Comunidad Valenciana y en el Mediterráneo occidental. Puede verse afectada por plumbismo.

Acciones de conservación:

La protección y conservación de los humedales y de los cursos fluviales garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales. La prohibición del uso de munición de plomo en los humedales es una medida tendente a minimizar el problema del plumbismo.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Galerida cristata**
Nombre valenciano: Cogullada vulgar
Nombre castellano: Cogujada común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 17 cm, P 35-45 g. Pájaro terrestre de coloración críptica, con tintes cálidos bajo las alas. Tiene el pico algo largo, con forma de daga. Presenta un copete apuntado en la cabeza que eriza de forma muy distintiva. Acostumbra a caminar por arcenes de caminos. Al despegar el vuelo muestra unas alas anchas y emite una voz típica, generalmente trisilábica, "tu-tu-líu".

Distribución:

En el norte de la península Ibérica se presenta la subespecie nominal de distribución europea, mientras que en el resto de la península está ocupada por una subespecie endémica. Se encuentra ampliamente extendida por España, exceptuando el extremo norte, desde Pirineos a Galicia, donde aparece la subespecie nominal de forma localizada. Ausente de ambos archipiélagos. Tiene una escasa movilidad migratoria.

Hábitat:

Ocupa zonas llanas, tanto del interior como de la costa, con vegetación baja y abierta, incluyendo terrenos agrícolas. También en otros ambientes antropizados abiertos. Nidifica en el suelo, en una taza de hierbas.

Situación actual:

Nidificante muy común, extendido prácticamente por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, incluyendo la isla de Nova Tabarca. Evita zonas forestales muy cerradas o núcleos urbanos, pero aparece en su perímetro y en los grandes claros de los ambientes donde resulta menos común. En la década de los ochenta se registró ocupando una superficie similar a la observada actualmente.

Amenazas:

Se puede ver afectada por la intensificación agrícola de los ambientes que ocupa, aunque muestra una gran plasticidad frente a las transformaciones del hábitat.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Galerida theklae**
Nombre valenciano: Cogullada fosca
Nombre castellano: Cogujada montesina

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
· Anexo III
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 17 cm, P 34-41 g. Pájaro terrestre de coloración críptica, con tintes grises bajo las alas. Tiene el pico algo corto, con forma de daga. Presenta un copete apuntado en la cabeza que eriza de forma muy distintiva. Acostumbra a posarse en arbustos o árboles. Al despegar el vuelo muestra unas alas anchas y emite una voz similar a la de la Cogujada Común, aunque generalmente con más sílabas, "tu-tulí-tiu-tili-ti".

Distribución:

En la península Ibérica y Baleares se presenta una subespecie endémica. Se encuentra ampliamente extendida por España, exceptuando el extremo norte, desde Pirineos a Galicia, pero mostrando una distribución algo discontinua, en

función de la existencia de sus hábitats óptimos. Presente en las islas Baleares, pero ausente de las Canarias. Tiene una escasa movilidad migratoria.

Hábitat:

Ocupa zonas abiertas, generalmente con pendiente, tanto del interior como de la costa, en terrenos pedregosos o con vegetación baja y abierta. Evita los bosques cerrados y los terrenos agrícolas, así como otros ambientes antropizados. Nidifica en el suelo, en una taza de hierbas.

Situación actual:

Nidificante extendido de forma discontinua por las tres provincias, siendo más común en Castellón y menos extendido en Alicante. Ocupa generalmente las comarcas interiores, donde aparecen sus hábitats típicos, siendo mucho menos común a lo largo del litoral. Ocupa algo más del 55 % de las cuadrículas UTM del territorio, lo que representa una extensión similar a la estimada en los años ochenta.

Amenazas:

Se puede ver afectada por la intensificación agrícola. Aparenta una baja plasticidad frente a las transformaciones del hábitat.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)

Citas 1980 - 2000

Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Gallinula chloropus**
Nombre valenciano: Polla d'aigua
Nombre castellano: Gallineta común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Directiva de Aves
· Anexo II.2

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 35 cm, P 250-420 g. Ave de tamaño medio-pequeño. Los adultos tienen una coloración general oscura, con reflejos marrones en las partes superiores y grises en los flancos, presentan dos bandas blancas en la popa y una fina línea blanca a lo largo de los flancos. Pico con escudete frontal de color rojo y punta amarilla. Patas verdosas. Las aves inmaduras tienen una coloración general marrón olivácea, pero pronto se parecen a los adultos, aunque con el pico decolorado.

Distribución:

La subespecie presente en la Península Ibérica se distribuye por el continente Eurasiático y gran parte de África. En España aparece ampliamente repartido aunque muestra una presencia muy discontinua, condicionada a la presencia de zonas húmedas de cualquier tipo, siendo la especie más común de su grupo. Ocupa las principales cuencas fluviales, los humedales y las desembocaduras del litoral, así como otros ambientes muy antropizados. Su población es residente, pero se reciben efectivos de origen Europeo durante la invernada.

Hábitat:

Ocupa una variada gama de humedales, desde grandes masas de agua a pequeñas lagunas, marismas, cauces fluviales y embalses, generalmente asociado con la presencia de vegetación palustre, pero también en otros ambientes altamente antropizados, siempre que mantengan agua. Nidifica entre la vegetación palustre

Situación actual:

Nidifica en algo más del 42 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. Ocupa casi todos los humedales litorales, incluso los más degradados, siempre que conserven algún encharcamiento o algún canal con agua. También en casi todos los cauces fluviales, incluso en sus tramos altos, como en las comarcas de Els Ports

de Morella, Alt Palancia, Rincón de Ademuz, altiplano de Requena-Utiel o Alt Vinalopó. No se conoce con exactitud los efectivos de su población, debido a la dificultad de su censo, pero se puede establecer un mínimo de 2.500 parejas reproductoras. Sólo en el Parque Natural de l.Albufera de Valencia se estimó una población nidificante algo superior a las 1.000 parejas en 2002. La especie podría haber experimentado un considerable aumento en las últimas décadas y haber extendido su área de presencia. De hecho, a finales de los años ochenta ocupaba el 35 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana.

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales supone la principal amenaza. La degradación o la destrucción de la vegetación palustre limita su presencia. Pese a tolerar ambientes muy degradados, la contaminación puede afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta. Pese a no ser considerada una especie cinegética, su caza con escopeta se autoriza tras la solicitud previa de los acotados, pero no existen planes cinegéticos de aprovechamiento ni se establecen cupos o registros del número de capturas. También se autoriza su caza con perro en fechas previas a la apertura de la veda de acuáticas, lo que resulta una seria amenaza para otros rálidos migratorios seriamente amenazados, como las polluelas (Porzana sp.).

Acciones de conservación:

La especie no está considerada cinegética y su caza sólo se autoriza en situaciones concretas. La protección y conservación de los humedales y de los cursos fluviales, particularmente de su cubierta vegetal, garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Gambusia holbrooki**
Nombre valenciano: Gambúsia
Nombre castellano: Gambusia

Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
· Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex I

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE ALTAMENTE INVASORA. Pez de pequeño tamaño que se caracteriza por tener la boca provista de dientes y en posición superior, esto les permite alimentarse en la parte superficial del agua donde generalmente viven las larvas de mosquito que constituyen la base de su alimentación. Tienen reproducción de tipo ovovíparo, el macho posee un gonopodio para la cópula, siendo además una especie muy prolífica, se han llegado a contar hasta 100 embriones en el interior de una sola hembra. El periodo reproductor coincide con el de los ciprinodóntidos autóctonos samaruc y fartet, es decir, desde marzo hasta septiembre.

Distribución:

Su distribución natural es el este de Estados Unidos, pero en la actualidad ha sido introducida en todos los continentes especialmente para combatir enfermedades como el paludismo. En España se introdujo en 1921 a fin de que se alimentara de las larvas del mosquito Anopheles causante del paludismo, ocupando en estos momentos casi la totalidad de las aguas lentas de la península ibérica. En la Comunidad Valenciana se puede encontrar en todas las cuencas fluviales y en la mayoría de los marjales, lagunas, acequias y surgencias de agua. Solamente existe una zona húmeda importante donde esta especie exótica no ha invadido todavía el hábitat, el marjal de Peñíscola donde conviven las dos especies de ciprinodóntidos autóctonos samaruc y fartet.

Hábitat:

Se trata de una especie capaz de colonizar ambientes muy dispares, desde las zonas medias y bajas de los ríos, hasta lagunas, embalses, balsas y acequias de riego, marismas litorales, turberas,....Soportan perfectamente zonas muy contaminadas y que alcanzan elevadas temperaturas, sin embargo algunas observaciones permiten señalar que la especie puede verse afectada por descensos en la concentración de oxígeno, sobretodo los machos que parecen ser más sensibles que las hembras.

Situación actual:

Su presencia es uno de los principales factores de amenaza para las últimas poblaciones de samaruc. Estudios financiados por la Consellería de Medi Ambient señalan que la interacción de mayor efecto entre gambusia y samaruc es la predación de los juveniles o huevos de la especie autóctona por parte de la gambusia. A este efecto directo hay que añadir la altísima fecundidad de la especie y su facilidad colonizadora.

Amenazas:

Al ser una especie introducida no se consideran.

Acciones de conservación:

Su impacto sobre especies nativas amenazadas aconseja su erradicación o, al menos, evitar su expansión.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1985 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Genetta genetta**
Nombre valenciano: Geneta
Nombre castellano: Gineta

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Directiva de Hábitats
· Anexo V

Ver más imágenes

Descripción y biología:

La gineta es un carnívoro de tamaño medio, con aspecto de un felino alargado de hocico prominente y pelaje grisáceo moteado en negro, en el que destaca su larga cola, muy poblada y anillada. Ésta, junto a su cuerpo sumamente flexible y sus uñas semirretráctiles le capacitan para trepar y evolucionar hábilmente por los árboles. Con una longitud total en torno a 80-100 centímetros, los ejemplares adultos pesan cerca de los 2 kilogramos. Se trata de un animal eminentemente nocturno, con máximos de actividad al caer el sol y antes del alba. Su dieta es muy amplia pero está basada principalmente en el consumo de roedores, siendo todo un especialista en su caza. Aves, reptiles, artrópodos y algunos frutos pueden llegar a formar parte importante de su dieta en ciertas zonas o estaciones del año. Sobre una muestra de 113 excrementos colectados entre enero y julio en la Devesa de El Saler (PN de L¿Albufera), García-Suikkanen (2011) encontró que las ratas (Rattus sp.) eran la presa más frecuente y la que aportaba mayor parte de la biomasa (60 %), seguida de las aves (16 %) y otros micromamiferos (15 %), siendo menos importante el consumo de conejos (5 %) e invertebrados (4 %). Las áreas de campeo pueden tener entre 1 y 15 km2, hallándose valores comprendidos entre 1,7 y 2,5 km2 en dos ejemplares que fueron objeto de radioseguimento durante varios meses en la Devesa de El Saler (Crespo et al. 2007, García-Suikkanen 2011). Al mostrar territorialidad intrasexual normalmente no solapan las de individuos del mismo sexo pero pueden ser bastante coincidentes entre machos y hembras. El celo comienza frecuentemente hacia el final del invierno, dándose los partos hacia abril y mayo, tras unos 70 días de gestación. No obstante, los alumbramientos pueden ocurrir a lo largo de todo el año, debido en mayor grado a fracasos previos que a dobles episodios reproductivos. Las camadas suelen ser de 2 a 3 crías, que permanecerán con la madre hasta su posterior dispersión con 4 o 5 meses de edad. La madurez sexual la alcanzan hacia los dos años y aunque en cautividad superan los 10 años de vida, la esperanza de supervivencia en la naturaleza debe ser considerablemente menor.

Distribución:

Esta especie africana fue introducida en la Península Ibérica, probablemente hacia el siglo VIII por los árabes, que la utilizaban como animal doméstico por su destreza en la captura de ratones. Se trata del único representante de la familia Viverridae en Europa, y actualmente está presente en la parte suroccidental de este continente, en África

(donde falta en los desiertos y las selvas ecuatoriales) y en la Península Arábiga. En la España peninsular se halla ampliamente distribuida y también se encuentra en Mallorca y en Ibiza. En la Comunitat Valenciana se encuentra por todo el territorio desde la costa al interior, eludiendo quizá los parajes más fríos del Macizo de Javalambre, Penyagolosa, Maestrat y Els Ports, al no haberse recogido citas por encima de 1.300 metros de altitud.

Hábitat:

Se trata de una especie muy versátil y aunque es más frecuente en bosques y arboledas, se da también en zonas de matorral, incluso las repetidamente incendiadas o semiáridas, en cultivos y en asentamientos humanos. Sensible al frío se rarifica en zonas elevadas o muy continentales de nuestro territorio estando entonces muy ligada a valles fluviales y barrancos abrigados. Menos afectada por la aridez que la garduña habita incluso en las zonas más secas de Alicante. En zonas montañosas prefiere zonas bajas y de valle, especialmente en torno a cursos fluviales con galerías riparias y/o roquedos, mientras que en las llanuras agrícolas le son muy favorables, las redes de acequias tradicionales orladas de vegetación arbórea, cañares o zarzales que atraviesan los naranjales u otros cultivos arbóreos. Por otra parte la gineta llega a vivir muy cerca del hombre, bien sea en áreas de poblamiento disperso, bien sea en la periferia de núcleos urbanos e incluso en ocasiones en el interior de éstos, como fue el caso de una pareja de ginetas que habitaba una casona en el interior de la ciudad de Xàtiva.

Situación actual:

Los datos disponibles permiten afirmar que se trata de una especie común, aunque no abundante, en la mayor parte del territorio valenciano. Aparentemente en situación estable y semejante a periodos anteriores. En las últimas décadas ha desaparecido de ciertas áreas muy trasformadas y reaparecido en otras de donde se había extinguido, como es el caso del monte de la Devesa del Saler (García-Suikkanen, 2011). Es posible que la expansión y aumento poblacional de la garduña le afecte por competencia al explotar nichos ecológicos similares.

Amenazas:

Dada su amplía distribución y adaptabilidad no se trata de una especie amenazada en la Comunitat Valenciana. Sin embargo conviene destacar que en la última década muchas zonas de huerta arbolada y de secano arbóreo tradicional favorables a la especie han sido alteradas, fragmentadas o destruidas por la intensificación agrícola y la construcción de urbanizaciones, polígonos o infraestructuras. Probablemente, la persecución directa por parte del hombre continúe siendo hoy día una de las principales causas de mortalidad no natural para este camívoro, así como los atropellos. De 85 entradas registradas entre 1994 y 2009 a los Centros de Recuperación de Fauna de la Comunitat Valenciana el 41,2 % fueron debidas a trampeo, 34,1 % a atropellos, 3,5 % a traumatismos indeterminados, 1,2 % a electrocución y 1,2 % a veneno (Crespo et al., 2009 y datos inéditos). En un grado menor que el zorro es considerada perjudicial por los cazadores y se le achacan en ocasiones daños a las aves de corral (García et al., 1997).

Acciones de conservación:

Ninguna específica, aunque como en el caso de otras especies la protección de espacios naturales debe haberla favorecido. Como ocurre con otras especies de carnívoros, le beneficiaría la erradicación del uso de métodos no selectivos de control de depredadores, en especial de jaulas-trampa.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1990 - 2017

Autor ficha: Javier Barona
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Glareola pratincola**
Nombre valenciano: Carregada
Nombre castellano: Canastera común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Carlos Pache

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 25 cm, P 70-90 g. Limícola de tamaño medio-pequeño, con silueta en vuelo que recuerda a la de una gran golondrina. Coloración general parda bastante uniforme, con una gargantilla cremosa bordeada de negro en las aves adultas y con un fino ribete terminal blanco en las alas. Patas cortas y cola larga. Los inmaduros carecen de la gargantilla de las aves adultas.

Distribución:

La subespecie presente en la Península Ibérica se distribuye por el continente Eurasiático y África. En España aparece repartida muy localmente por las marismas del Guadalquivir, La Mancha húmeda, Extremadura y algunas localidades del litoral Mediterráneo. Durante la invernada sus efectivos europeos se desplazan a África.

Hábitat:

Ocupa zonas llanas, abiertas y deforestadas, en ambientes áridos o halófilos y preferentemente vinculadas con grandes humedales, también puede ocupar zonas húmedas transformadas para el cultivo (algodón, remolacha, girasoles, etc.). Nidifica en el suelo, generalmente lejos del agua, en zonas desnudas o con vegetación rala, formando colonias laxas. Es un insectívoro aéreo que puede frecuentar otros ambientes para la alimentación, como substratos arbóreos, arrozales, barbechos o terrenos arados.

Situación actual:

Nidifica en unas pocas localidades litorales, como el Prat de Cabanes-Torreblanca, los marjales de Almenara, El Moro, l.Albufera de Valencia y en El Hondo. También ha nidificado en las salinas de Santa Pola. El total de su población nidificante se sitúa en torno a los 100 pares nidificantes de promedio, con máximos algo superiores a las 160 parejas y mínimos en torno a las 60 parejas. Sus efectivos parecen mostrar una tendencia estable, pese a ciertas oscilaciones interanuales y se distribuyen prácticamente por igual entre sus localidades de cría, siendo el Prat de Cabanes-Torreblanca una de las más emblemáticas. Durante la migración postnupcial puede concentrarse en gran número, particularmente en los arrozales de l.Albufera de Valencia, superando los 500 ejemplares, antes de iniciar su migración a los cuarteles invernales.

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales supone la principal amenaza. La intensificación agrícola en el entorno de los humedales que ocupa puede afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta, particularmente por contaminación por pesticidas. Durante la época de nidificación, los cambios en los niveles de inundación, generalmente vinculados a la agricultura, pueden causar la pérdida de nidos o polladas. Algunas colonias se instalan ocasionalmente en campos de cultivo en barbecho en el entorno de las zonas húmedas lo que causa pérdidas de nidos por trabajos de laboreo o riegos a manta. Se han observado ejemplares abatidos por cazadores.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal y aparece catalogada como Vulnerable en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 de febrero). La protección y conservación de los humedales garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1984 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Hemorrhois hippocrepis**
Nombre valenciano: Serp teuladina
Nombre castellano: Culebra de herradura

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Hábitats
· Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: José Larrosa

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Culebra grande (hasta 180 cm), aunque son frecuentes ejemplares de talla inferior. Cabeza relativamente pequeña y algo aplanada. Cuerpo esbelto y cola relativamente larga. Escamas dorsales lisas. Aparece una banda oscura entre los ojos y otra con forma de herradura sobre la parte posterior de la cabeza. Característico diseño dorsal en el que destacan grandes rombos oscuros alineados.♂♂Es un ofidio básicamente diurno, aunque puede presentar actividad crepuscular en verano. Es un ágil trepador y muy rápido en el suelo. Con frecuencia caza merodeando en hormas y muros, seleccionado además de estas estructuras entornos rocosos y pedregosos de escasa cobertura. Su alimentación varía con la edad, de forma que los juveniles basan su dieta en artrópodos, los subadultos en lacértidos y gecos, y los adultos en micromamíferos y paseriformes (que atrapan con frecuencia en sus nidos). ♂♂El celo es primaveral y las puestas, que realizan en verano, constan de 5 a 10 huevos que la hembra deposita bajo piedras o en grietas de troncos. Los nacimientos tienen lugar a los dos meses, hacia finales de verano. Es una culebra rápida y agresiva que no duda en morder si se le intenta capturar.♂

Distribución:

Presente exclusivamente en países del Mediterráneo occidental: península Ibérica, norte de Marruecos, Argelia y Túnez y ciertas islas donde se considera introducida. En la Península está ausente del tercio septentrional, faltando además de gran parte de Castilla-La Mancha. En la CV está presente sobre todo en las zonas más térmicas del litoral, haciéndose más escaso en zonas de interior.

Hábitat:

De marcado carácter termófilo, frecuenta zonas cálidas, secas y expuestas a insolación con escasa cobertura, cultivos arbolados de secano en suelos de elevada pedregosidad y entornos de vegetación aclarada. Frecuenta ambientes rurales donde selecciona hormas de piedra seca, ruinas, lugares secos y rocosos y aparece comúnmente cerca de habitaciones humanas. Aparece principalmente por debajo de los 700 m de altitud.

Situación actual:

Se trata de una especie relativamente frecuente que no parece estar sujeta a problemas de conservación. No obstante, las poblaciones de las áreas costeras, prelitorales y zonas más cálidas del territorio presentan mayor densidad que las del interior, sujetas éstas a cierto grado de aislamiento y potencial declive.

Amenazas:

La ocupación y transformación de hábitats naturales es probablemente la principal amenaza, tanto en el caso de las poblaciones costeras, como en las del interior. Es víctima frecuente de atropellos y de ataques directos por parte del hombre.

Acciones de conservación:

Ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.

Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Hieraaetus pennatus**
Nombre valenciano: Àguila calçada
Nombre castellano: Aguililla calzada

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 50 cm, P 500-1.250 g. Ave rapaz de tamaño medio. Plumaje de coloración variable, con dos fases diferenciadas. Cuerpo de color marrón, con presencia variable de plumas leonadas, en las partes superiores, con la nuca algo crestada. En vuelo muestra las plumas del ala negruzcas, con blanco en el vientre y coberteras alares de los ejemplares de fase clara y pardo claro en estas mismas zonas en los de fase oscura. Las aves inmaduras son similares a los adultos.

Distribución:

Especie distribuida por el sur del continente Eurasiático y por África. Se reparte por toda España, estando más ausente en Galicia y la cornisa cantábrica y en la fachada mediterránea. Nidifica en las Baleares y está ausente de las Canarias. Los efectivos europeos se desplazan mayoritariamente a África durante la invernada.

Hábitat:

Especie eminentemente forestal, que ocupa zonas boscosas de muy variados tipos, preferentemente con claros y espacios abiertos, así como en sotos fluviales. En invierno puede aparecer en otros ambientes menos forestales e incluso antropizados. Nidifica sobre árboles y más raramente en cantiles rocosos

Situación actual:

Nidificante poco común en zonas forestales de montaña de las tres provincias, principalmente en la provincia de Castellón y generalmente por encima de los 600 metros de altitud, ocupando algo más del 15 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. A finales de los años ochenta se estimó una población algo inferior a las 50 parejas (26 en Castellón, 10 en Valencia y 10 en Alicante). No se conocen estimas posteriores, pero la especie parece mantener sus localidades de cría tradicionales o incluso haber ocupado áreas nuevas a principios de los 2000. Cada vez resulta más habitual durante la invernada, particularmente en localidades litorales.

Amenazas:

Entre las causas que podrían explicar la escasez de la especie en la Comunidad Valenciana estaría la carencia de hábitat adecuado para la cría, debido a una intensa deforestación del territorio, en buena parte causada por los incendios de grandes dimensiones ocurridos en las últimas décadas, así como por la carencia de presas de la especie. Las masas forestales donde nidifica pueden verse afectadas por alteraciones del paisaje derivadas de la actividad humana. Se han observado casos de electrocución en postes eléctricos, particularmente durante la época invernal.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección legal. Existen programas oficiales y voluntarios de censo de sus poblaciones nidificantes en la Comunidad Valenciana.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Himantopus himantopus**
Nombre valenciano: Camallonga
Nombre castellano: Cigüeñuela común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
· Anexo III
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE



Autor Foto: Carlos Pache

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 38 cm, P 160-200 g. Limícola inconfundible de tamaño medio y largas patas ♂rosadas. Los adultos tienen las partes inferiores blancas, con el dorso y ♂una cantidad variable de la cabeza y nuca de color negruzco. Los machos ♂tienen la espalda negra mientras que las hembras la tienen parda. El pico es ♂largo, fino y recto. Los inmaduros son similares a los adultos, pero ♂presentan un ribete terminal blanco en las alas.♂

Distribución:

L 38 cm, P 160-200 g. Limícola inconfundible de tamaño medio y largas patas ♂rosadas. Los adultos tienen las partes inferiores blancas, con el dorso y ♂una cantidad variable de la cabeza y nuca de color negruzco. Los machos ♂tienen la espalda negra mientras que las hembras la tienen parda. El pico es ♂largo, fino y recto. Los inmaduros son similares a los adultos, pero ♂presentan un ribete terminal blanco en las alas.♂

Hábitat:

Ocupa humedales someros, tanto dulces como salinos, siendo relativamente ♂común en marismas, arrozales, salinas, graveras, etc. Nidifica en el suelo, ♂en playas e islotes, y ocasionalmente sobre el agua, construyendo un pequeño ♂montículo vegetal, formando colonias laxas.♂

Situación actual:

Nidifica en los principales humedales y desembocaduras del litoral y en los ♂saladares alicantinos, así como en embalses como el de María Cristina, La ♂Pedrera, de Elche y de Beniarrés, siendo una especie relativamente común. Ha ♂nidificado en la laguna de Salinas. Su población total presenta importantes ♂oscilaciones interanuales y se sitúa en las 1.100 parejas de promedio, con ♂máximos en torno a las 1.600 parejas y mínimos en torno a las 800 parejas. ♂Sus efectivos parecen mostrar un incremento desde 1988 y se concentran ♂principalmente en l.Albufera de Valencia, el delta del Millars, El Hondo, ♂las salinas de Santa Pola y el marjal de El Moro. Durante la migración puede ♂aparecer en localidades donde no nidifica y algunos ejemplares pueden estar ♂presentes durante la invernada. La población invernante es de unos 60 ♂ejemplares de promedio, con máximos algo superiores a los 200 ejemplares y ♂se concentran principalmente en los saladares alicantinos, en especial en El ♂Hondo.♂

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales supone la principal amenaza. La ♂pérdida de la calidad del agua, particularmente por contaminación, puede ♂afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta. Durante la ♂época de nidificación, la desecación artificial o los cambios en los niveles ♂de inundación, particularmente en las masas de agua utilizadas para la ♂agricultura, puede causar la pérdida de nidos o polladas.♂

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. La protección y conservación de los ♂humedales y de los cursos fluviales garantiza la pervivencia de sus ♂poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del ♂agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales.♂

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1996 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Hippolais polyglotta**
Nombre valenciano: Bosqueta vulgar
Nombre castellano: Zarcero políglota

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 13 cm, P 9-15 g. Pájaro insectívoro de coloración uniforme bastante discreta, pardo verdoso grisáceo, con las partes inferiores amarillentas. Tiene plumas blancas en los extremos de la cola y una lista amarillenta entre el pico y el ojo como únicos detalles destacados. Tiene la frente menos plana que los carriceros.

Distribución:

Es una especie monotípica distribuida por Europa y por el norte de África. En España se extiende por toda la península, mostrando alguna discontinuidad mayor en los principales sistemas montañosos y en las regiones más deforestadas. Está ausente de ambos archipiélagos. Es un migrador estival que se desplaza a los cuarteles invernales en África tras la temporada de cría.

Hábitat:

Ocupa una amplia variedad de ambientes, prefiriendo paisajes abiertos con presencia de árboles dispersos y matorral, siendo particularmente abundante en bosques de riberas y en setos, a menudo con presencia de agua. Puede ocupar cultivos arbóreos y jardines. Evita zonas de escasa cubierta vegetal, en zonas áridas y en zonas de montaña, así como formaciones forestales cerradas. Nidifica entre arbustos, en una taza de hierbas y telarañas. En migración puede aparecer en otros ambientes

Situación actual:

Nidifica bastante extendido por las tres provincias, siendo más irregular en las comarcas del interior de la provincia de Valencia y en las del sur de Alicante. Ocupa zonas de antropizadas y de regadío, siendo regular a lo largo de la costa, en las superficies de naranjal y en los parques de los núcleos urbanos, sin resultar común. Ocupa en torno al 70 % de

las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una presencia similar a la obtenida durante los años ochenta. Durante la migración puede ser visto en localidades donde no nidifica.

Amenazas:

Está amenazado por la destrucción o la alteración excesiva de los ambientes que ocupa (limpiezas de cauces, destrucción de riberas fluviales,obras de encauzamiento...). Al ocupar terrenos agrícolas, se ve amenazada por el uso de pesticidas.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Hirundo daurica**
Nombre valenciano: Oroneta cua-rogenca
Nombre castellano: Golondrina dáurica

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 18 cm. Insectívoro aéreo, con alas curvadas y cola larga y muy ahorquillada. Las partes superiores son oscuras, con brillos azulados, pero muestra una extensa mancha ante pálido en la base de la espalda y un collarín ocre en la nuca. Las partes inferiores son de color ocre pálido, incluyendo la garganta, pero muestra la parte inferior de la cola de color negro. Los machos adultos tienen las plumas caudales externas más alargadas que las hembras. Las aves inmaduras tienen la cola corta.

Distribución:

En la península Ibérica se encuentra una subespecie distribuida por la cuenca mediterránea y Ásia occidental. Se encuentra extendida por todo el cuadrante sudoeste de España y, de forma discontinua y local, por el litoral mediterráneo ibérico, siendo mucho más rara por el resto. Ausente en ambos archipiélagos. Es un migrante transahariano que se desplaza a sus cuarteles invernales africanos tras la reproducción, sin embargo, existe una presencia invernal ocasional en localidades ibéricas meridionales.

Hábitat:

Ocupa ambientes agrestes y forestales, tanto del interior como de la costa, estando poco vinculada con ambientes antropizados. Nidifica aisladamente en techos protegidos de cuevas o debajo de puentes, aunque también en otro tipo de construcciones. Construye nidos de barro adosados a un techo, con forma semiesférica y un túnel de entrada característico.

Situación actual:

Nidifica localmente en las tres provincias, apareciendo algo dispersa tanto en comarcas del interior como del litoral. Pese a posibles diferencias en la prospección, la especie parece estar experimentando una colonización reciente de la Comunidad Valenciana, acorde con su expansión por Europa. Durante los años ochenta ocupaba un 5 % de las cuadrículas UTM del territorio, con la mayor parte de las localidades de cría situadas en las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares. Actualmente, aparece en un 20 % de las cuadrículas, extendiendo su núcleo original de las comarcas meridionales de Castellón y apareciendo puntualmente en nuevas localidades, distribuidas por casi todas las comarcas

del resto del territorio, en función de la existencia de hábitats óptimos. Durante la migración puede ser vista en localidades donde no nidifica. Existe alguna cita ocasional durante los meses invernales.

Amenazas:

No se han descrito graves amenazas, sin embargo, junto a la expansión reciente de la especie se está observando un acercamiento a los ambientes antropizados y a las construcciones humanas. Esto ocasiona conflictos puntuales con el uso de pesticidas o incluso con otras especies antropófilas, como el Gorrión Común (Passer domesticus), que ocupan sus nidos y la desplazan.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Hirundo rustica**
Nombre valenciano: Oroneta
Nombre castellano: Golondrina común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 10 cm, P 16-25 g. Insectívoro aéreo, con alas curvadas y cola larga y muy ahorquillada. Ave de aspecto muy conocido. Las partes superiores son negruzcas, con brillos azulados y las inferiores de color blanco cremoso. Tiene una pechera oscura y una mancha rojiza extendida en la garganta y en la frente. Los machos adultos tienen las plumas caudales externas más alargadas que las hembras. Las aves inmaduras tienen la cola corta.

Distribución:

En la península Ibérica se encuentra la subespecie nominal, distribuida por el oeste del continente Eurasiático. Se encuentra ampliamente extendida por España, incluyendo las islas Baleares. Ausente del archipiélago canario, aunque recientemente ha nidificado en la isla de Gran Canaria. Es un migrante transahariano que se desplaza a sus cuarteles invernales africanos tras la reproducción, sin embargo, existe una pequeña presencia invernal en localidades ibéricas meridionales.

Hábitat:

Ocupa una gran variedad de ambientes, pero aparece vinculada a los ambientes antropizados, preferentemente en zonas rurales y en poblaciones de pequeño tamaño. Nidifica aisladamente en zonas protegidas de casas viejas y de edificios agrícolas, pero también en otro tipo de construcciones. Construye una media taza de barro adosada a una pared. Durante la migración forma dormideros comunales de gran tamaño, generalmente utilizando carrizales y cañaverales.

Situación actual:

Nidifica ampliamente distribuido por las tres provincias, ocupando cerca del 100 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, siendo una especie muy común, pero no demasiado abundante. Evita los cascos urbanos de las principales ciudades, pero puede nidificar en su perímetro y en grandes parques donde existan edificaciones

adecuadas. Durante la migración puede resultar localmente muy abundante. Puede ser observada raramente durante los meses invernales, particularmente en las localidades de climatología más confortable.

Amenazas:

Las principales amenazas vienen representadas por la desaparición de las edificaciones donde nidifica en las áreas rurales afectadas por despoblamiento humano. Se ve afectado por el uso de plaguicidas agrícolas.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Lanius meridionalis**
Nombre valenciano: Capsot botxí
Nombre castellano: Alcaudón real

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 24 cm, P 55-80 g. Pájaro de tamaño medio, con la cola larga y el pico robusto ligeramente ganchudo. Tiene el dorso gris, con las alas y la cola negras. La cabeza es gris, incluyendo la frente, y tiene una máscara auricular negra. Las partes inferiores y la garganta son pálidas, de un color gris rosado. Suele posarse en lugares aventajados, desde donde caza.

Distribución:

Especie distribuida por la península Ibérica y el sur de Francia, recientemente separada del Alcaudón Real Norteño Lanius excubitor que se extiende por el resto de Europa. Se distribuye de forma irregular por casi toda la península, estando más ausente de las áreas de influencia atlántica y cantábrica, así como de los ejes de los principales sistemas montañosos. En las islas Canarias más orientales existe una subespecie propia. Está ausente de las islas Baleares. Tiene una escasa movilidad migratoria, sin embargo puede desarrollar movimientos fuera del periodo reproductor.

Hábitat:

Ocupa una gran variedad de espacios abiertos y llanos, prefiriendo montes aclarados y formaciones arbustivas, evitando tanto terrenos elevados, como áreas muy deforestadas y masas forestales cerradas. También puede aparecer en medios agrícolas abiertos. Nido en un matorral denso, en una copa de materia vegetal.

Situación actual:

Nidifica extendido de forma discontinua por las tres provincias y en muy baja densidad. Se encuentra menos extendido por las comarcas litorales y en las comarcas interiores de la provincia de Valencia. En conjunto ocupa un 60 % de las

cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una presencia similar a la registrada en los años ochenta. Fuera del periodo reproductor puede ser observado en localidades donde no nidifica.

Amenazas:

La alteración de sus hábitats supone la principal amenaza. La urbanización y la intensificación agrícola pueden suponer la transformación de los ambientes que ocupa. Se ve desplazado tanto por la deforestación excesiva como por la repoblación excesiva, particularmente con especies como coníferas.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Lanius senator**
Nombre valenciano: Capsot
Nombre castellano: Alcaudón común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 17 cm, P 25-35 g. Pájaro de pico ganchudo y cola larga. Tiene el dorso pardo oscuro, con dos amplios parches blancos en la espalda. Las alas y la cola son negruzcos. La cabeza presenta un antifaz negro y una llamativa mancha de color castaño, extendida de la coronilla a la nuca. Las partes inferiores son blancas. Suele posarse en lugares aventajados, desde donde caza.

Distribución:

En la península Ibérica se presenta la subespecie nominal, distribuida por Europa continental, aunque también se ha considerado una posible subespecie ibérica propia. En las islas Baleares aparece otra subespecie presente en grandes islas del Mediterráneo occidental. Se extiende ocupando casi toda la península, estando más ausente de las áreas de influencia atlántica y cantábrica, así como del eje pirenaico. Está ausente de las islas Canarias. Es un migrante estival que se desplaza a sus cuarteles invernales africanos tras la reproducción.

Hábitat:

Ocupa formaciones arbóreas muy variadas, prefiriendo las poco densas y con presencia de claros, alternados con formaciones abiertas arbustivas y herbáceas, incluyendo paisajes agrícolas. Evita terrenos altos, bosques muy densos y zonas completamente deforestadas. En migración puede aparecer en otros hábitats. Nidifica en árboles, en una taza de hierbas.

Situación actual:

Se encuentra extendido prácticamente por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, donde suele aparecer en una densidad baja, ocupando en torno al 95 % de las cuadrículas UTM. Esto supone una extensión idéntica a la registrada en los años ochenta. Durante sus migraciones resulta una especie muy común y puede ser visto en localidades donde no nidifica.

Amenazas:

Las transformaciones de sus ambientes, particularmente para usos agrícolas, y la utilización de pesticidas, representan una amenaza. Se ve desplazado por los cambios que suponen el cierre forestal de los ambientes que ocupa, tales como el abandono de la ganadería extensiva o la excesiva repoblación forestal. También se ve amenazado por las alteraciones ambientales en sus áreas africanas de invernada.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Larus melanocephalus**
Nombre valenciano: Gavina capnegra
Nombre castellano: Gaviota cabecinegra

Origen: Autóctono
Medio: Ambos

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo I
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 39 cm, P 250-350 g. Gaviota de tamaño medio y de complexión algo robusta. Las aves adultas tienen el dorso blanco grisáceo, las partes inferiores blancas y carecen de plumas negras en las alas. La cabeza presenta un capuchón negro que abarca la nuca y fuera de la época de cría presenta una marca auricular oscura y la nuca finamente listada. Los inmaduros son parduscos y no adquieren el plumaje de adulto hasta el tercer año de vida. El pico es robusto y de color rojo coral en época de cría.

Distribución:

Especie distribuida por el mar Negro y de forma aislada por la cuenca mediterránea y la Europa atlántica. En España nidifica en muy bajo número desde los años ochenta y exclusivamente en el delta del Ebro y en la Albufera de Valencia. Durante la invernada se reciben importantes efectivos procedentes de las colonias del mar Negro.

Hábitat:

Ocupa lagunas y marismas salobres durante la época de cría. Nidifica en el suelo, entre vegetación baja poco densa, generalmente en islotes, formando colonias. Fuera de la época de cría es bastante marina y aparece en ambientes litorales. Suele ser vista atendiendo los descartes de barcos pesqueros.

Situación actual:

Ha colonizado el Mediterráneo occidental desde los años sesenta, aparentemente dispersada desde el mar Negro. Desde los años ochenta se han producido citas aisladas de ejemplares adultos durante los meses estivales en las principales zonas húmedas del litoral. En 1998 dos parejas nidificaron sin éxito en las salinas de Santa Pola. En l.Albufera de Valencia, se ha presentado en la colonia de gaviotas del Racó de l.Olla desde su establecimiento en 1993, donde un primer intento de nidificación de una pareja tuvo lugar en 2001. Desde entonces, la especie ha nidificado anualmente en esta localidad, con dos, seis y cinco parejas respectivamente entre los años 2002 a 2004. Fuera de la época de cría la especie se hace más regular en el litoral, en ocasiones mar adentro y particularmente en la costa al norte del puerto de Valencia. En este periodo se pueden censar varios miles de individuos en los puertos pesqueros del norte de Castellón.

Amenazas:

Sus escasos efectivos nidificantes dependen de la conservación de las actuales localidades de cría. La escasez de localidades alternativas para la nidificación o el posible deterioro de las zonas húmedas que podría colonizar, limita su establecimiento como especie reproductora. Durante la invernada, la localización de un número elevado de ejemplares en tramos muy concretos de la costa les hace susceptibles a posibles alteraciones en la disponibilidad de alimento. Su dependencia de las flotas de arrastreros para la alimentación puede suponer una amenaza en el caso de cambios drásticos en los actuales ritmos de explotación pesquera.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. La protección y conservación de los humedales y saladares garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales. La regeneración de ambientes de saladar en l.Albufera de Valencia ha permitido la colonización de esta nueva localidad de cría.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 2002 - 2015

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Larus ridibundus**
Nombre valenciano: Gavina comuna
Nombre castellano: Gaviota reidora

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Directiva de Aves
· Anexo II.2

Autor Foto: Benjamín Albiach Galán

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 36 cm, P 225-350 g. Gaviota de tamaño medio-pequeño. Las aves adultas ♂tienen el dorso grisáceo y las partes inferiores blancas, con una careta ♂facial de color chocolate que fuera de la época de cría queda reducida a una ♂marca auricular grisácea. Los inmaduros son similares a los adultos fuera de ♂la época de cría. El pico es fino y presenta una característica coloración ♂bicolor, roja con la punta negruzca. Es la gaviota pequeña más común de las ♂presentes.♂

Distribución:

Especie distribuida por el continente Eurasiático. En España aparece ♂nidificando muy localmente por ambas mesetas, los valles del Ebro y ♂Guadalquivir, así como en otros puntos de Andalucía, Extremadura y el ♂litoral Mediterráneo. Ausente en ambos archipiélagos como nidificante. ♂Durante la invernada se reciben importantes efectivos europeos♂

Hábitat:

Ocupa lagunas, marismas y deltas durante la época de cría. Nidifica en el ♂suelo o sobre vegetación baja, generalmente en islotes o zonas anegadizas. ♂Fuera de la época de cría aparece en una amplia gama de ambientes marinos o ♂continentales, incluso altamente antropizados, aprovechando incluso ♂actividades humanas para su alimentación (labores agrícolas, vertederos ♂urbanos, actividad pesquera).♂

Situación actual:

Ha colonizado la península Ibérica desde los años sesenta y nidificó en ♂l'Albufera de Valencia en 1969 por primera vez. La especie mantenía ♂efectivos muy bajos hasta los años ochenta en l'Albufera de Valencia y en ♂las salinas de Santa Pola. Desde entonces, ha experimentado un aumento ♂regular de efectivos, colonizando El Hondo a partir de 1992 y alcanzando un ♂total algo superior a las 900 parejas desde principios de los años 2000. En ♂la actualidad mantiene varios centenares de parejas en cada una de estas ♂localidades de cría. También ha nidificado una pareja en el marjal de ♂Pego-Oliva en 1989, 20 parejas en el embalse de La Pedrera en 1998 y más ♂recientemente alguna pareja en el marjal de El Moro. Durante la invernada ♂resulta una especie abundante y ampliamente distribuida, principalmente por ♂la costa, y se estima una población mínima de 30.000 ejemplares invernantes.♂

Amenazas:

Pese a tolerar ambientes muy antropizados, la pérdida de la calidad del ♂agua, particularmente por contaminación, puede afectarle directamente o a ♂las especies de las que se alimenta. Durante la época de nidificación ♂resulta vulnerable, debido a la concentración de efectivos en muy pocas ♂localidades. Las colonias de cría no toleran las molestias de origen humano ♂ni la presencia de depredadores terrestres, como perros.♂

Acciones de conservación:

La protección y conservación de los humedales que ocupa para nidificar ♂garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la ♂depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de ♂agua continentales. La regeneración de ambientes de saladar en l'Albufera de ♂Valencia y El Moro, ha favorecido la reproducción de la especie.♂♂

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1999 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Lepus granatensis**
Nombre valenciano: Llebre
Nombre castellano: Liebre ibérica

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Ver más imágenes

Descripción y biología:

El pariente más próximo del conejo, se distingue de él por tener orejas y patas proporcionalmente más largas, la cola con la punta negra y ser algo mayor, superando con facilidad los 2 kilogramos de peso. Toda la anatomía de la liebre está adaptada a la carrera. Al contrario que el conejo es un animal esencialmente solitario, con comportamientos agresivos por la comida o entre los machos durante el celo. En la sSierra de Mariola se han determinado, mediante transectos, abundancias máximas en primavera (0,26 liebres/km) y mínimas en invierno (0,075 liebres/km) (Arques et al., 2011). En buenas condiciones ambientales puede reproducirse a lo largo de todo el año, aunque la mayoría de los partos se dan entre finales de invierno y verano. Las camadas oscilan entre una y cinco crías y son cuidadas por la madre en encames entre la vegetación. Son fértiles al año de nacer y, aunque sufren una gran mortalidad en etapas juveniles, pueden superar los cinco años de vida en libertad. Es una especie casi estrictamente nocturna, permaneciendo durante el día atenta en su encame. Es herbívora, buscando activamente las gramíneas y sólo de forma secundaria se comporta como ramoneadora y consumidora de frutos.

Distribución:

La liebre ibérica es exclusiva de España y Portugal, distribuyéndose al sur del Ebro, y siendo sustituida al norte de este río por la liebre europea (Lepus europaeus). Aparece en la práctica totalidad de la Comunitat Valenciana, faltando registros únicamente del litoral de la provincia de Valencia.

Hábitat:

La liebre prefiere los terrenos abiertos, con escasa vegetación arbórea y arbustiva. En la sierra de Mariola es más abundante en los cultivos de secano, luego en los de regadío y, finalmente en las zonas cubierta de vegetación natural (Arques et al., 2011). Puede aparecer también en el entorno de zonas húmedas y saladares.

Situación actual:

Es una especie cinegética apreciada, de la que se cazan anualmente entre 20 y 30.000 ejemplares en la Comunitat, siendo Valencia la provincia donde más piezas se cobran, seguida de Alicante y finalmente Castellón.

Amenazas:

Cuando alcanza altas densidades, lo que es raro, puede producir daños en los cultivos. Sufre muchos atropellos por su costumbre de intentar escapar de los vehículos corriendo por la calzada.

Acciones de conservación:

Ninguna específica. Su aprovechamiento está regulado por la legislación cinegética.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez Pérez
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Lophophanes cristatus**
Nombre valenciano: Capellanet de cresta
Nombre castellano: Herrerillo capuchino

Autor Especie: **L., 1758**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 11,5 cm, P 10-13 g. Pájaro insectívoro pequeño con una llamativa cresta apuntada coronando la cabeza. Dorso pardusco y partes inferiores pálidas con tintes cremosos. Tiene la cabeza blanquecina, con plumas negras formando una gargantilla y un doble collar en la nuca y en los auriculares.

Distribución:

En la península Ibérica se presenta la subespecie de distribución centroeuropea, aunque en el sudoeste peninsular existe una subespecie endémica. Se encuentra extendido por toda España, vinculado con los diferentes sistemas montañosos, mostrando amplias áreas de ausencia en las regiones deforestadas de los diferentes valles fluviales, de ambas mesetas y de las zonas más áridas. Está ausente de ambos archipiélagos. Es una especie sedentaria, aunque puede desarrollar movimientos fuera de la época de reproducción.

Hábitat:

Ocupa terrenos eminentemente forestales, prefiriendo formaciones densas de coníferas, aunque también ocupa otras más abiertas. Puede aparecer tanto en zonas altas como en bajas. También se puede presentar en parques urbanos. Nidifica en cavidades de árboles.

Situación actual:

Nidificante muy extendido por las tres provincias, vinculado a la presencia de masas forestales de pino carrasco, incluso en las más abiertas. Es menos común a lo largo de la franja litoral y en las comarcas del sur de la provincia de Alicante. Ocupa algo más del 80 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una extensión superior a la registrada en los años ochenta, que se situaba próxima al 70 % de las cuadrículas UTM. Este aumento podría estar relacionado con la expansión que parece mostrar la especie al verse favorecida por las

repoblaciones de pinos. Fuera de la época de reproducción puede ser observado en localidades donde no nidifica, particularmente en épocas muy frías.

Amenazas:

Muestra bastante plasticidad a la transformación de sus ambientes, pero se ve desplazado de las zonas excesivamente deforestadas, como es el caso de la acción de los incendios. Dependen de la presencia de árboles maduros con cavidades en los que nidificar.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Luscinia megarhynchos**
Nombre valenciano: Rossinyol
Nombre castellano: Ruiseñor común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Carlos Pache

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 16 cm, P 18-27 g. Pájaro insectívoro de hábitos muy escondedizos. Las partes superiores son de color pardo uniforme, con tintes rojizos en la cola. Las partes inferiores son blanquecinas. Su presencia se suele detectar por su potente canto, también emitido durante la migración, caracterizado por melodías variadas, con frases cortas emitidas entre pausas regulares que incluyen voces como ¿...cuchí-cuchí-cuchí¿, al final de cada canto.

Distribución:

En España se presenta la subespecie nominal que se distribuye por Europa occidental. Se distribuye prácticamente por toda la península, exceptuando la fachada atlántica y algunas zonas áridas y de alta montaña del sudeste y del interior. Nidifica en las islas Baleares, pero está ausente de las Canarias. Es un migrador estival que se desplaza a los cuarteles invernales en África tras la temporada de cría.

Hábitat:

Ocupa terrenos forestales abiertos y con formaciones arbustivas densas, ocupando también sotos fluviales, regadíos y parques urbanos. Nidifica entre la vegetación, en una taza de hierbas. En migración puede aparecer en cualquier otro tipo de hábitat.

Situación actual:

Nidificante bastante extendido por las tres provincias, mostrando alguna discontinuidad de presencia en las comarcas interiores de la provincia de Valencia y en las del sur de la de Alicante. Ocupa poco más del 85 % de las cuadrículas UTM del territorio, lo que representa un incremento respecto del 72 % de las cuadrículas donde la especie estaba presente en los años ochenta. Este aumento podría ser debido a oscilaciones de su población y no tanto a una

tendencia al aumento en la ocupación del territorio. Durante sus pasos migratorios puede ser vista en localidades donde no nidifica, incluso emitiendo su canto nupcial.

Amenazas:

La destrucción de sus hábitats de cría representa su principal amenaza, particularmente en las localidades más áridas, donde la canalización de un curso fluvial y la destrucción de la vegetación de ribera puede causar extinciones locales. Se ve perjudicado por las repoblaciones forestales con coníferas. Se puede ver afectada por el uso de plaguicidas cuando ocupa cultivos (naranjal) o linderos de terrenos agrícolas.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Lutra lutra**
Nombre valenciano: Llúdria
Nombre castellano: Nútria paleártica

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Hábitats
· Anexo II
· Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

La nutria es el mayor carnívoro valenciano, con una longitud total que puede superar los 120 centímetros y peso que alcanza hasta 8 kilogramos. Para 10 ejemplares capturados en Castellón (5 hembras y 5 machos), longitud total hembras: 103,8 centímetros (102-106), machos: 115,3 centímetros (112-123); peso hembras: 5,3 kilogramos (4,7-5,8), machos: 6,8 kilogramos (5,75-7,8). Su aspecto es totalmente inconfundible por su desarrollo longitudinal, conformado por un cuerpo y cola largos con patas cortas, clara adaptación a sus hábitos acuáticos. El único otro mamífero con el que cabe confusión es el visón americano (Neovison vison), de talla mucho menor (el peso medio no suele alcanzar el kilo) y cola proporcionalmente mucho más corta. Puede reproducirse a partir de los dos años de edad, en cualquier época del año, muy condicionada por la disponibilidad de comida, con partos entre 1 y 3 crías. Sufre una gran mortalidad en los primeros años de vida y la vida media apenas llega a los 5 años. Pocos ejemplares superan los 10 años de vida, con edades máximas reportadas de 16. Son esencialmente solitarias, con cortos emparejamientos durante el celo y sociables sólo cuando hay vínculos familiares (hembra-crías; hermanos). Se alimenta de vertebrados e invertebrados acuáticos, con clara preferencia por los peces, particularmente barbos. Sobre 573 excrementos analizados en la cuenca del Bergantes (1.265 presas), los peces representaron el 79,1 % de las presas, seguidos en importancia por los cangrejos (7,3 %) y los anfibios (7,0 %) (Bartolomé, 2000). En todo caso, la dieta está muy influida por la disponibilidad de presas y la estabilidad del hábitat (Ruiz-Olmo y Jiménez, 2009).

Distribución:

La especie se distribuye por la mayor parte de Eurasia y está presente también en el norte de África. En España es relativamente común en toda la mitad occidental, siendo progresivamente más escasa hacia el Este y el Sur. En la Comunitat Valenciana su distribución original incluía todos los ríos y algunas zonas húmedas litorales (p. ej.

l¿Albufera). A partir de los años 60 se inicia un rápido proceso de desaparición que conduce a su extinción hacia los años 80 del 75 % de la longitud fluvial ocupada veinte años antes (Jiménez, 1987). En la actualidad es común en la cuenca del Bergantes, y aparece bien distribuida en el Cabriel y en el Alto Turia-Rincón de Ademuz. Recientemente ha recolonizado los tramos medios del Júcar en Valencia y el riu de les Coves en Castellón. Su gran capacidad de desplazamiento permite su aparición esporádica en los ríos Sénia, Cérvol, Mijares y Palancia. El mapa refleja la presencia, en muchos casos temporal, de ejemplares en estas cuencas y en zonas limítrofes (Teruel, Tarragona, Cuenca) en los últimos 20 años.

Hábitat:

Es una especie estrictamente acuática, habitante de ríos, lagos y marismas, aunque en la Comunitat Valenciana está restringida hoy en día a hábitats ribereños, en algunos casos en tramos que quedan prácticamente secos en el estío. En estas circunstancias, la presencia de pozas en el cauce es la condición necesaria para su supervivencia (Ruiz-Olmo et al., 2007). Requiere para su presencia aguas relativamente limpias, buena cobertura de riberas y, especialmente, alta disponibilidad de alimento (López-Martín et al., 1998). Se encama normalmente en las riberas, con el 67,3 % de los refugios a menos de 5 metros de la orilla y en el 51,9 % entre la vegetación (Jiménez y Palomo, 1998). No obstante, los amplísimos movimientos de las nutrias (dominios vitales de cuatro adultos radiomarcados en el Bergantes de 36,0 ± 5,7 kilómetros) (Jiménez, 2005) hacen que su presencia esté condicionada no tanto por las características de tramos concretos, si no por la comunicación de estos tramos con zonas que alberguen buenas poblaciones de la especie.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana se consideraba como una especie gravemente amenazada, aunque en los últimos años está mostrando signos de recuperación. Esto puede apreciarse bien teniendo en cuenta los resultados de los tres sondeos nacionales realizados hasta la fecha (López-Martín y Jiménez, 2008). Si en el primero (1984) apareció en el 6,3 % de los puntos muestreados, en el segundo (1994- 96) lo hizo en el 7,4 % y en el tercero (2004-06) en el 15,8 %. Un sondeo más reciente, realizado en 2012 por el Equipo de Seguimiento de Fauna (Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad), comprueba un nuevo incremento, pasando entre 2005 y 2012 de 25 a 40 cuadrículas UTM de 10 x 10 kilómetros con presencia de nutria y de 277 a 459 kilómetros de río ocupados. Esta recuperación se está produciendo tanto por un aumento de la distribución aguas abajo desde las poblaciones situadas fuera de la Comunitat Valenciana (como sería el caso del Turia y del Cabriel), como por saltos entre cuencas a partir de ríos con buenas poblaciones, como sería el caso del Bergantes, que está posibilitando la recuperación de la especie en todo el norte de Castellón (Jiménez et al., 2009).

Amenazas:

Los principales factores de amenaza sobre la especie son la contaminación de los cauces, la alteración de las riberas y la extenuación de los caudales. De particular importancia resulta la regulación hidráulica provocada por las grandes presas, que alteran el funcionamiento natural del río y parecen ser la causa directa de la desaparición de la nutria en algunas cuencas, especialmente en la del Júcar. Como causas de mortalidad conocidas, si en el siglo pasado la principal era la persecución directa (80 %), recientemente la principal causa son los atropellos (75 % de las causas de 16 ejemplares encontrados muertos en la Comunitat Valenciana), en buena medida correspondientes a ejemplares juveniles en dispersión.

Acciones de conservación:

La distribución de la especie es seguida de forma regular desde los años 80, realizándose un sondeo bianual desde 2005 en toda su distribución conocida. La mayor parte de tramos donde está presente se encuentran amparados por la red Natura 2000 como Lugares de Interés Comunitario (LIC), y están sometidos a tutela, particularmente a través del proceso de evaluación de impacto ambiental. No obstante, los extensos requerimientos de hábitat imponen la necesidad de plantear su conservación en un ámbito supracomunitario y con una participación activa de las autoridades responsables de los ríos, especialmente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Seguimiento de poblaciones:

[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1984 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez Pérez
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Malpolon monspessulanus**
Nombre valenciano: Serp verda
Nombre castellano: Culebra bastarda

Autor Especie: **(Hermann, 1804)**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna
· Anexo III

Autor Foto: Víctor Ciscar

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Culebra grande, la mayor de las presentes en la península Ibérica, superando los 200 cm de longitud. Cabeza estrecha, con escamas supraoculares prominentes, lo que le dota de un característico aspecto amenazante. Escamas dorsales grandes con un surco longitudinal central. Adultos de color dorsal uniforme de verde oliva a marrón o grisáceo, con un área anterior oscura, más conspicua con la edad. Los juveniles presentan el dorso verde o pardo sobre el que destaca un complejo diseño de manchas claras y oscuras. ♂♂De hábitos diurnos y, en menor medida, crepusculares. Es una culebra ágil y muy rápida en el suelo. La reproducción comienza tras la hibernación. Las cópulas se producen generalmente entre abril y junio y las puestas constan de 4 a 20 huevos bajo piedras o en madrigueras abandonadas. La longevidad en machos puede sobrepasar los 25 años.♂♂Son cazadores merodeadores que se alimentan principalmente de reptiles, culebras, aves y huevos y pequeños mamíferos. Los juveniles capturan insectos y pequeños reptiles. A su vez, son presa de diversas rapaces y mamíferos.♂

Distribución:

Típicamente circunmediterránea, desde el Sáhara occidental hasta el oeste de Irán, incluyendo el norte de África, península Ibérica, sur de Francia y puntos del noroeste de Italia. Presente en algunas islas del Egeo y el Adriático. Ocupa la práctica totalidad de la península Ibérica, donde está presente la subespecie nominal, excepto la comisa cantábrica (región eurosiberiana). En la Comunidad Valenciana es la culebra terrestre más ampliamente distribuida, aunque se carece de datos en zonas del interior de Valencia. Vive también en la isla de Tabarca.

Hábitat:

Especie ubicuista en el ámbito mediterráneo que puede aparecer desde las dunas costeras hasta la alta montaña. Habita tanto zonas de matorrales y tomillares como bosques mixtos, pinares y riberas, siempre que disponga de refugios. Parece seleccionar positivamente áreas cultivadas y rurales (por la abundancia de presas), donde se refugia en setos, hormas y muros.

Situación actual:

Es la culebra terrestre más abundante y ampliamente distribuida de la Comunidad Valenciana. Su llamativo volumen, le hace más fácilmente localizable, por lo que se ha obtenido una elevada cobertura de citas. No parece presentar problemas de conservación.

Amenazas:

Ocupación, transformación y pérdida de hábitats naturales, intensificación de cultivos y reducción de recursos tróficos (especies presa), ataques directos, atropellos.

Acciones de conservación:

Ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

Nombre científico: **Marmaronetta angustirostris**
Nombre valenciano: Rosseta
Nombre castellano: Cerceta pardilla

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro crítico

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· En peligro de extinción
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - En peligro de extinción
Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo I
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 41 cm, P 400-600 g. Anátida nadadora de pequeño tamaño y de color pardo ♂moteado pálido, muy similar en ambos sexos. Presenta una suave máscara ♂ocular y una cresta en la nuca que están más desarrolladas en los machos. El ♂pico es gris azulado oscuro en los machos y gris verdoso en las hembras. El ♂diseño alar es muy discreto, sin mostrar marcas evidentes.♂

Distribución:

Ocupa la cuenca del Mediterráneo y la región aralocáspica. La especie parece ♂tener actualmente dos poblaciones separadas, aparentemente sin contacto, en ♂los extremos oriental y occidental de su área de distribución. Es una ♂especie escasa en España, nidificando casi exclusivamente en el litoral ♂Mediterráneo y en las marismas del Guadalquivir. Ha criado recientemente ♂también en Mallorca y en Fuerteventura. España alberga los únicos efectivos ♂nidificantes de Europa, recientemente situados entre las 30 y las 200 ♂parejas, según los años, por lo que la especie se considera en peligro ♂crítico.♂

Hábitat:

Ocupa aguas someras, ricas en vegetación acuática emergente y sumergida, especialmente en humedales salobres o temporales. Nidifica entre vegetación palustre, preferentemente entre vegetación arbustiva halófila. Aparece en otros ambientes durante la migración e invernada, incluso en arrozales y en otros tipos de masas artificiales de aguas.

Situación actual:

Nidifica de forma muy localizada en humedales salobres del sur de Alicante, principalmente El Hondo y las salinas de Santa Pola, pero también en el Hondo de Amorós o el Clot de Galvany. Desde los años noventa unas pocas parejas han nidificado en zonas húmedas litorales de Valencia, como los marjales de Pego-Oliva, Xeresa-Xeraco, l.Albufera de Valencia o El Moro. Desde principios de los 2000 también ha nidificado una pareja en los marjales de Almenara. La especie ha experimentado una crisis demográfica de la que todavía no parece haberse recuperado y en las últimas décadas muestra importantes fluctuaciones. Los efectivos nidificantes en la Comunidad Valenciana son muy variables y recientemente han oscilado entre unas pocas decenas y algo más de 100 parejas. La población invernante se sitúa en torno a los 25 ejemplares, con máximos cercanos al centenar de ejemplares, principalmente concentrados en El Hondo.

Amenazas:

El deterioro o la desaparición de los humedales supone una importante amenaza. La pérdida de la calidad de la cubierta vegetal en sus hábitats de cría y las barreras artificiales, como canales y carreteras, limita su reproducción. La contaminación de los medios acuáticos puede afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta. La concentración de sus escasos efectivos existentes en unas pocas localidades les hace extremadamente sensibles a alteraciones del hábitat derivadas de la excesiva desecación de caudales por usos agrícolas o molestias derivadas de la caza o cualquier otra actividad. En este sentido, en septiembre de 1997 una intoxicación por organofosforados en El Hondo, seguida por un brote de botulismo, provocó la muerte de más de un centenar de ejemplares. Algunos ejemplares son abatidos ilegalmente con regularidad por cazadores y la especie parece verse afectada por plumbismo.

Acciones de conservación:

Se trata de una especie protegida por la ley. La especie aparece catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 de febrero). La protección y conservación de los humedales que ocupa y de su entorno, garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales. Se ha redactado un Plan de Recuperación de la especie en la Comunidad Valenciana y existe un programa LIFE ("Plan de medidas urgentes para la conservación de la Cerceta Pardilla en el Mediterráneo Occidental-Comunidad Valenciana"), co-financiado por la Unión Europea y la Generalitat Valenciana. El programa contempla acciones de regeneración del hábitat en El Hondo y el marjal de El Moro, así como la realización de censos, seguimiento de ejemplares y el control de la actividad cinegética. Se han adoptado medidas para minimizar el impacto de un canal de riego en El Hondo (azarbe del Convenio), donde anualmente caían decenas de polladas recién eclosionadas, mediante la instalación de rampas de salida y vallados de protección. La prohibición del uso de munición de plomo en los humedales es una medida tendente a minimizar el problema del plumbismo.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



Mapa de distribución:

Acercar a



Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino

Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Mauremys leprosa**
Nombre valenciano: Tortuga d'aigua ibèrica
Nombre castellano: Galápago leproso

Autor Especie: **(Schweigger, 1812)**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Hábitats
· Anexo II
· Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Caparazón ovalado y aplanado de hasta 210 mm de longitud total. Espaldar ensanchado en la parte posterior, más aparente en ejemplares viejos, y desarrolla una quilla vertebral apreciable en sus extremos anterior y posterior. Extremidades robustas, con dedos unidos por membranas interdigitales y provistos de fuertes uñas. Cola relativamente larga, más en los machos. En el cuello y miembros pueden apreciarse varias líneas longitudinales anaranjadas menos patentes con la edad. ♂♂Puede sufrir periodos de hibernación en zonas frías, normalmente entre noviembre y febrero, y de estivación en zonas cálidas, enterrándose en el fondo de los cuerpos de agua que habita. La época de celo comienza por regla general a finales de primavera, aunque puede adelantarse en las zonas más cálidas o incluso existir un segundo celo en otoño. En el verano la hembra excava un nido de 10 cm de profundidad, donde pone hasta 13 huevos ovalados. Se incuban durante un mes, según las condiciones ambientales. Alcanza la madurez sexual hacia los 7 años de edad, y una longevidad en torno a los 20.♂♂Tiene una dieta omnívora, aunque prefieren comer peces, anfibios o insectos, sin desdeñar la carroña y restos vegetales. Son a su vez presa de diversas aves acuáticas, zorros, jabalíes e incluso grandes peces exóticos.♂

Distribución:

Habita en la región mediterránea de la península Ibérica y el norte de África. En la Comunidad Valenciana está presente en las tres provincias, si bien la mayor y más tupida red hidrográfica de las comarcas centrales permite una presencia más continua que en Castellón y en Alicante. No obstante, en estas dos provincias aparece también en embalses y balsas y canales de riego y avenamientos. También está presente en algunas marjales, lagunas costeras y embalses.

Hábitat:

Riachuelos y charcas en áreas de escasa altitud y con suficiente vegetación que le sirva de refugio y alimento. También ocupa cursos de agua temporales mientras mantengan pozas en épocas secas. También se presenta en

humedales litorales, grandes charcas y colas de pantanos. En la Comunidad Valenciana ocupa ríos y arroyos permanentes o estacionales, aunque también aparece en marjales costeras; en algunos puntos comparte su biotopo con Emys orbicularis, como en los marjales dels Moros y de Pego-Oliva.

Situación actual:

Si bien se encuentra ampliamente distribuido en la Comunidad Valenciana, no se trata de una especie frecuente y sus poblaciones parecen tender al aislamiento y a la reducción de efectivos. Las poblaciones más septentrionales poseen núcleos más frágiles. Asimismo, las poblaciones costeras vienen sufriendo las consecuencias negativas de las transformaciones de los humedales litorales, habiéndose constatado la reducción de efectivos y extinción reciente de poblaciones.

Amenazas:

Entre las principales amenazas están la degradación, fragmentación y pérdida de hábitats, la sobreexplotación de recursos hídricos y degradación de hábitats fluviales, la contaminación de cursos y cuerpos de agua, la colmatación de pozas debida a la erosión de los márgenes, la captura ilegal, la presión humana en general y la incidencia debida a la proliferación y expansión de especies exóticas, especialmente peces como el black-bass y, sobre todo, la tortuga de Florida.

Acciones de conservación:

Se ha realizado seguimiento de poblaciones, protección del hábitat, redacción de un Plan de Manejo de la especie y proyecto piloto de reproducción en cautividad y refuerzo de poblaciones amenazadas.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas 1980 - 2000

Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Periodo de observación: 1984 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Meles meles**
Nombre valenciano: Teixó
Nombre castellano: Tejón

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna
· Anexo III

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Se trata de un mustélido inconfundible por su gran tamaño, su coloración y su especial conformación adaptada a sus hábitos cavadores. El cuerpo es robusto, con cabeza pequeña, cuello y patas fuertes, terminadas en garras largas que le dotan de gran capacidad cavadora y una corta cola. El olfato es su sentido más desarrollado que se ve ayudado en la detección del alimento por unas vibrisas táctiles en el hocico, presentando por el contrario ojos y orejas reducidas. Es característico el dibujo rayado negro y blanco en la cara, con un pelaje grisáceo largo y duro en el dorso y negruzco en las partes ventrales y las patas. La longitud total varía entre 60 y 95 centímetros y el peso para ejemplares ibéricos oscila entre 5 y 9,5 kilogramos. Es característica de esta especie la excavación de madrigueras complejas con varias cámaras, pasillos y bocas de entrada, que pueden ser ocupadas y ampliadas por grupos familiares generación tras generación. De hábitos muy nocturnos y regulares, presenta mayor actividad durante la primavera y el verano y mínima en invierno. Tiene una organización social variable y dependiendo de la distribución del alimento viven en grupos

compuestos por varios adultos o de forma solitaria. El celo tiene lugar en invierno o en primavera, pero el desarrollo del embrión no empieza hasta meses después del apareamiento ya que al igual que la garduña presenta el fenómeno de la implantación diferida del blastocito. Los nacimientos suelen tener lugar entre noviembre y febrero, naciendo normalmente 2 o 3 cachorros, a veces de 1 a 5, en una cámara especifica de la tejonera, donde permanecen hasta unas 10 semanas. La madurez sexual es alcanzada entre los 12 y los 15 meses de edad. La longevidad señalada para esta especie en la naturaleza es de unos 12-15 años. En la Península Ibérica se han obtenido tamaños de áreas de campeo entre 12 y 1.630 hectáreas, pero las medias suelen estar comprendidas entre 60 y 600 hectáreas. En varios estudios ibéricos se han obtenido densidades entre 0,4 y 1,2 tejones/km2, siendo previsible que en ambientes mediterráneos el rango se sitúe con frecuencia entre 0,2 y 0,6 tejones /km2 . Se trata de una especie omnívora con importantes variaciones en su dieta en distintas regiones y hábitats. Cuando las lombrices son abundantes tiende a especializarse en su consumo, pero artrópodos, frutos y hongos pueden formar parte importante de la dieta en zonas mediterráneas, algo que se observa con frecuencia en zonas montañosas del interior de la provincia de Valencia (datos propios inéditos), apareciendo además otras muchas presas animales y vegetales.

Distribución:

El tejón se encuentra en casi toda Europa (falta tan solo en el norte de la Península Escandinava, las islas mediterráneas e Islandia) y en una franja de Asia Central desde Turquía y los Urales hasta China y Japón. En España se distribuye por toda la península. En la Comunitat Valenciana se encuentra en la mayor parte de las áreas montañosas y forestales del territorio valenciano, así como en áreas de cultivo que mantienen un cierto mosaico de vegetación natural. Parece más escaso en la provincia de Alicante y evita el interior de áreas extensas de cultivo intensivo. Es posible sin embargo que algunos de los vacios mostrados en el mapa de distribución se deban más a la falta de información que a la ausencia real de la especie. Ha sido detectado a nivel del mar en localidades costeras como la sierra de Irta (Castellón) o los pinares de las dunas de Guardamar (Alicante), alcanzando las observaciones más elevadas los 1.500 metros de altitud.

Hábitat:

El tejón es una especie de óptimo eurosiberiano prefiriendo áreas moderadamente frescas, no muy elevadas y con abundantes precipitaciones, donde alcanzan sus mayores densidades en paisajes caracterizados por la alternancia de bosques y prados. No obstante a lo largo de su área de distribución se presentan en hábitats muy alejados de su óptimo, como son zonas esteparias, semidesérticas y palustres, así como en alta montaña. Los factores que más condicionan su presencia y abundancia son la disponibilidad de alimento y de lugares adecuados para ubicar sus tejoneras, prefiriendo para éstas suelos fácilmente excavables y con grandes pedregales o vegetación densa donde ocultarlas. En la Comunitat Valenciana se conoce su presencia en todo tipo de formaciones forestales desde espartales y matorrales bajos propios de zonas semiáridas, hasta bosques galería y caducifolios de montaña, pasando por pinares y bosques de quercíneas. Sin embargo parece más frecuente en los bosques mixtos húmedos del norte de Castellón, en proximidades de ríos o arroyos y en montes próximos a huertas u otros cultivos. No desdeña penetrar en estos últimos a través de barrancos, sistemas de acequias tradicionales y enclaves forestales de reducido tamaño, favoreciéndole entonces la presencia de zarzales y otros tipos de vegetación densa. En general parece presentar mayor abundancia en paisajes heterogéneos con alternancia de manchas arboladas o de matorral, arroyos y cultivos de frutales y huertas, que en zonas forestales uniformes.

Situación actual:

Se trata de una especie bien repartida, aunque los datos disponibles parecen mostrar una baja densidad en la mayor parte de nuestro territorio. En muestreos específicos de la especie mediante recorridos de búsqueda de indicios en distintos tipos de hábitat de las tres provincias (n=40) sólo el 17,5 % resultaron positivos, encontrándose tejoneras en el 7,5 %. Estos porcentajes aumentaron a 55,6 % y 33 % en el caso de los transectos realizados en riberas de ríos, hábitat donde se localizaron 0,72 tejoneras/km (Calabuig, Such y Barona, datos inéditos). Aunque no existe información suficiente y ésta es difícilmente comparable, el tejón podría haber mejorado su situación respecto a la que tenía hasta el último tercio del siglo XX. En ciertas zonas forestales litorales o de pequeño tamaño, su situación pudo haber empeorado en las últimas décadas debido a la pérdida de calidad del hábitat (incendios, roturaciones, urbanizaciones,...) y/o a la mortalidad asociada al hombre (venenos, lazos, atropellos,...), tal como indican diversos trabajos de ámbito local de los años 80 y 90 (Villaplana, 1987; Muñoz et al., 1987; Rico et al., 1990; Sánchez- Zapata, 1996), si bien está situación parece revertida recientemente en alguno de estos lugares (Sánchez-Zapata et al., 2003).

Amenazas:

Se le achacan daños a huertos y cultivos de maíz y tradicionalmente se le persiguió por este motivo, sin embargo actualmente con más frecuencia sufre la persecución hacia otros predadores (zorro sobre todo) con bloqueo de sus madrigueras, uso de cajas-trampa, cepos, lazos y veneno; a estos dos últimos medios parece especialmente sensible. Debido a esta susceptibilidad y a su limitado poder colonizador, se trata de una especie muy afectada por estos medios no selectivos, sobre todo cuando van asociados a una fragmentación forestal, corriendo entonces un mayor riesgo de extinción las poblaciones existentes en montes-isla. Atropellos, enfermedades respiratorias, agresiones intraespecíficas y falta de alimento son otras de las causas de mortalidad citadas para la especie. De 52 entradas registradas entre 1994 y 2009 en los Centros de Recuperación de Fauna de la Comunitat Valenciana el 42,3 % fueron debidas a trampeo, 32,7 % a atropellos y 3,9 % a traumatismos indeterminados (Crespo et al., 2009 y datos inéditos).

Como ocurre en el caso de otras especies estos porcentajes se encuentran sujetos a un sesgo difícil de calibrar. Otras causas poco precisadas de rarificación de la especie se encuentran en la pérdida de calidad de hábitat de muchas zonas de montaña debida a la densificación forestal y la pérdida del mosaico que proporcionaban pequeñas parcelas de cultivo y de pastos. Inversamente en las llanuras agrícolas más extensas, se han ido perdiendo sistemas tradicionales de acequias, márgenes y linderos antes cubiertos de vegetación natural, lo que ha repercutido en las posibilidades de refugio para la especie.

Acciones de conservación:

No se ha realizado ninguna concreta. Como con otros carnívoros le beneficiaría la erradicación del uso de métodos no selectivos de control de depredadores, especialmente los lazos y el veneno y la sensibilización del sector cinegético sobre su importancia en los ecosistemas. Igualmente la toma de medidas para evitar atropellos y favorecer la permeabilidad de infraestructuras lineales puede ser especialmente importante para conservar poblaciones de pequeño tamaño, lo mismo que la adopción de medidas que favorezcan la conectividad entre poblaciones y la preservación de la calidad del hábitat, evitando los cambios de uso y el aumento de la urbanización.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1992 - 2017

Autor ficha: Javier Barona
Año ficha: 2013

Nombre científico: **Merops apiaster**
Nombre valenciano: Abellerol
Nombre castellano: Abejaruco europeo

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 28 cm, P 65 g. Insectívoro aéreo con plumaje de coloración brillante, azul verdoso por debajo y pardo amarillento por encima. Muestra una llamativa garganta amarilla. Cola larga, con las plumas centrales alargadas. Pico largo, fino y ligeramente curvado hacia abajo. Los inmaduros son de coloración poco vistosa. Emite un "prrip" sordo y pausado, audible a largas distancias. Vuela alternando cortos planeos con aleteos en los que aparenta cerrar las alas, generalmente en bandos.

Distribución:

Especie distribuida por el sudoeste de Eurásia y por África. En España se encuentra ampliamente distribuido por casi toda la península, excepto por los Pirineos, la cornisa Cantábrica y Galicia, donde está prácticamente ausente. Es muy local en Baleares, siendo más común en Menorca, y está ausente de las islas Canarias. Es un migrante transahariano estricto que se desplaza a sus cuarteles invernales africanos tras la reproducción.

Hábitat:

Ocupa una gran variedad de ambientes abiertos, evitando las zonas boscosas cerradas y las montañas más elevadas. Se alimenta en el aire. Nidifica colonialmente en taludes y paredes aluviales, donde excava galerías.

Situación actual:

Nidifica ampliamente distribuido por las tres provincias, ocupando cerca del 95 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, siendo aparentemente más común en la provincia de Castellón. Prácticamente no nidifica

en el litoral de la provincia de Valencia. Ante la ausencia de grandes taludes, en ocasiones instala pequeñas colonias en paredes de muy pequeñas dimensiones. Resulta habitual la observación de bandos durante los pasos migratorios en todo el territorio.

Amenazas:

La principal amenaza viene representada por la vulnerabilidad de sus colonias, amenazadas por la destrucción de los taludes que ocupan, tanto por la extracción de áridos y transformaciones del paisaje, como por cambios en los usos agrícolas o por urbanización. En ocasiones se dan conflictos con la apicultura, cuando existe proximidad entre las colonias de cría y los panales. El uso de pesticidas en la agricultura le afecta directamente o reduce las presas de las que se alimenta.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

Nombre científico: **Monticola solitarius**
Nombre valenciano: Merla blava, solitari
Nombre castellano: Roquero solitario

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 20 cm, P 37-54 g. Pájaro insectívoro de porte medio que suele posarse erguido en lugares aventajados (piedras, montículos). Los machos adultos son de color azul oscuro uniforme, con las alas negruzcas. Las hembras y los inmaduros tienen un plumaje pardusco moteado, particularmente en las partes inferiores, pero con ligeros tintes azulados.

Distribución:

En la península Ibérica se presenta la subespecie nominal que se extiende por la cuenca mediterránea. En España se extiende por toda la fachada mediterránea, y a lo largo de los diferentes sistemas montañosos del interior de la península, siendo más local en el noroeste. Nidifica en las islas Baleares, pero está ausente en las islas Canarias. Tiene una escasa movilidad migratoria, pero puede ser vista en localidades donde no nidifica fuera del periodo reproductor.

Hábitat:

Prefiere terrenos escarpados y rocosos, desprovistos de vegetación o con formaciones abiertas de herbáceas o de arbolado. Ocupa acantilados marinos y del interior. Puede ocupar edificios en ruinas y otras construcciones aisladas en estos ambientes de presencia y puede adentrarse en ciudades. Nidifica en grietas del suelo o paredes, en una copa de hierbas.

Situación actual:

Nidificante extendido por las tres provincias, con algunas discontinuidades de presencia, particularmente en el norte de Castellón, en las comarcas centrales de Valencia y en las del sur de Alicante. Ocupa en torno al 70 % de las cuadrículas UTM del territorio, lo que representa una extensión similar a la estimada en los años ochenta. Pese a su regularidad de presencia, resulta poco abundante. Puede ser visto en localidades donde no nidifica, particularmente en los meses invernales, generalmente en hábitats propios de la especie.

Amenazas:

Muestra cierta plasticidad en la adaptación a los cambios que experimentan los ambientes que ocupa, pero aparece afectada por la extracción de áridos (canteras) o por la urbanización, particularmente grave a lo largo de los tramos rocosos del litoral. También se ve desplazada por el desarrollo de la cubierta forestal densa, particularmente por repoblación.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Motacilla alba**
Nombre valenciano: Cueta blanca
Nombre castellano: Lavandera blanca

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Benjamín Albiach Galán

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 18 cm, P 19-27 g. Pájaro terrestre de patas largas y cola larga. Tiene las partes superiores de color gris y las inferiores de color blanco, con una presencia variable de negro en la nuca, cabeza, garganta y pecho. Tiene la cara y la frente blancas, lo que le confiere un aspecto característico.

Distribución:

En la península Ibérica se presenta la subespecie nominal de distribución europea. En España se distribuye de forma bastante generalizada por toda la península, teniendo una presencia algo más discontinua en el cuadrante sudoeste y la meseta sur. Está ausente de ambos archipiélagos. La población ibérica es esencialmente sedentaria, aunque se recibe población invernante procedente del resto de Europa.

Hábitat:

Ocupa ambientes muy variados, generalmente abiertos y con agua en las proximidades. Frecuente en vegas fluviales, prados, entornos agrícolas y ganaderos, e incluso caseríos y pequeños núcleos de población. También puede nidificar en grandes parques de ciudades. Nidifica en oquedades de muros, rocas, o entre la vegetación baja, en una taza de hierbas. En invierno puede resultar más común en entornos antropizados donde no nidifica, llegando a formar grandes dormideros comunales en árboles de ciudades.

Situación actual:

Nidifica repartido por casi toda la Comunidad Valenciana, ocupando cerca del 90 % de las cuadrículas UTM. Esto supone una ocupación superior a la obtenida en los años ochenta, cuando aparecía en el 43 % de cuadrículas UTM del territorio, lo que difícilmente se puede atribuir a un diferente esfuerzo de muestreo y pudiera ser indicativo de un incremento real de su presencia, como parece haber ocurrido en otras regiones ibéricas. Durante el periodo invernal se hace más común, particularmente a lo largo de la costa y en ambientes antropizados, como en las principales ciudades y su entorno.

Amenazas:

Parece bastante adaptada a la transformación de los ambientes que ocupa, sin embargo, su utilización de medios antropizados le hace susceptible de verse afectada por pesticidas o por la contaminación.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Muscicapa striata**
Nombre valenciano: Papamosques gris, mastegatatxets
Nombre castellano: Papamoscas gris

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 14 cm, P 13-19 g. Pájaro insectívoro que caza insectos en el aire desde posadero. Es de coloración bastante uniforme, pardo grisáceo pálido por encima y blanquecino por debajo, con la cabeza y la pechera finamente listados de plumas más oscuras. Sus alas y cola resultan largas. Acostumbra a posarse erguido en una rama fina, generalmente a cubierto de una copa de árbol, desde donde captura sus presas, regresando de nuevo a su percha. Las aves juveniles tienen el dorso con motas pálidas

Distribución:

La subespecie presente en la península ibérica se distribuye por el resto de Europa, mientras que en las islas Baleares existe una subespecie endémica. En España ocupa una amplia franja litoral, desde Cádiz a Girona, adentrándose en la península a lo largo de los diferentes sistemas montañosos, resultando mucho más irregular en el interior y en la cornisa cantábrica. Está ausente de las islas Canarias. Es un migrador estival que se desplaza a los cuarteles invernales en África tras la temporada de cría.

Hábitat:

Ocupa terrenos eminentemente forestales, tanto de formaciones abiertas como densas, pudiendo aparecer en terrenos arbustivos, en paisajes agrícolas y en jardines. Evita zonas deforestadas o con formaciones herbáceas. En migración puede aparecer en otros hábitats. Nidifica en árboles, tanto en una taza como en cavidades, incluso de paredes.

Situación actual:

Nidifica muy extendido por las tres provincias, mostrando únicamente alguna ausencia en comarcas interiores, como las de los Puertos de Morella, Los Serranos, Hoya de Buñol o la del Valle de Ayora. Está prácticamente presente en toda la provincia de Alicante. Ocupa en torno al 93 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una extensión similar o incluso superior a la registrada en los años ochenta. Suele aparecer en los parques de núcleos urbanos, siempre que tengan cubierta forestal. Puede ser observado en localidades donde no nidifica durante la migración

Amenazas:

Muestra bastante plasticidad a la transformación de sus ambientes, pero necesita una cubierta vegetal arbórea o densa, viéndose desplazado de zonas excesivamente deforestadas. Se ve afectado por el uso de pesticidas en la agricultura y la jardinería, particularmente por los que causan una reducción de los insectos aéreos de los que depende.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

Nombre científico: **Mustela nivalis**
Nombre valenciano: Mostela
Nombre castellano: Comadreja

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Datos insuficientes

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna
· Anexo III

Ver más imágenes

Descripción y biología:

La comadreja es el menor carnívoro valenciano, con una longitud total que no alcanza los 30 centímetros y un peso entre 50 y 220 gramos, muy superior en los machos que en las hembras. De cuerpo alargado y cilíndrico, cola y patas cortas, su pelaje es marcadamente bicolor, con los flancos y parte dorsal de color canela y la parte ventral blanca. Dada su talla es fácilmente distinguible de cualquier otro carnívoro, asemejándose en una visión rápida más a un roedor. Es un carnívoro especializado en la captura de roedores, dependiendo su distribución, densidad, reproducción y supervivencia de la abundancia de aquellos. Normalmente éstos suponen más del 70 % de la dieta, aunque en zonas mediterráneas, donde son más escasos los topillos (sus presas preferidas), la dieta suele ser más amplia, incluyendo también huevos, pollos, reptiles, anfibios e invertebrados, así como conejos jóvenes si estos son muy abundantes. Su ciclo biológico, muy influido por factores ambientales y la abundancia de alimento, es muy rápido. Solitarias y polígamas, ambos sexos sólo se unen para el apareamiento que puede tener lugar casi en cualquier época del año. Tienen una gestación de 34-37 días y partos (concentrados en abril-septiembre) de entre cuatro y ocho crías que alcanzan la madurez sexual a los cuatro meses. Su actividad es también muy intensa, como corresponde a su pequeño tamaño, repartida durante la noche y el día (es uno de los pocos carnívoros fáciles de observar a plena luz) e interrumpida por cortos periodos de descanso. Sus áreas vitales pueden oscilar entre 1 y 100 hectáreas y las de los machos incluyen las de varias hembras. En la naturaleza tienen una baja esperanza de vida y son raros los ejemplares de más de tres años, pero tienen una alta tasa de renovación poblacional.

Distribución:

La especie se distribuye por todo el Paleártico, presentándose en España en toda la península, Mallorca y Menorca y ciudades autónomas del norte de África. Se halla repartida por todo el territorio valenciano, aunque de forma dispersa y normalmente en baja densidad. Aunque está presente en zonas montañosas y forestales, abunda más en el paisaje agrario tanto de secano como de regadío y sobre todo en los humedales costeros de las tres provincias, donde a juzgar por el número de avistamientos y referencias, se alcanzan las mayores densidades.

Hábitat:

No tiene requerimientos particulares de hábitat, encontrándose desde zonas húmedas a cultivos, zonas periurbanas, dunas y todo tipo de monte, pero siempre ligada a la presencia y abundancia de sus presas principales. Las citas tienden a concentrarse en microhábitats determinados: bordes de charcas, ramblas y ríos, pequeñas praderas, muros de piedra, acequias, márgenes de cultivos, cercanías de granjas, etc. Altitudinalmente ha sido hallada desde el nivel del mar, presente incluso en playas, hasta cumbres y altiplanos de las áreas montañosas, con observaciones al menos hasta los 1.200 metros de altitud. Llega a ocupar el centro de poblaciones al amparo de los cursos de agua que las atraviesan, como es el caso del cauce del Turia en Valencia.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana se la considera una especie frecuente y bien distribuida, aunque aparentemente poco abundante en la mayor parte del territorio. No se dispone de datos que permitan determinar su tendencia poblacional general. Aunque Villaplana (1988) y López et al. (1992) consideran que la especie se ha mantenido sin grandes cambios en las comarcas de La Safor y L´Alacantí respectivamente, otros autores parecen indicar una tendencia regresiva en áreas como La Vega de Orihuela (Zapata, com. pers.) o las huertas cercanas a Valencia capital (Roncadell-SECEM, 1997).

Amenazas:

Como se ha señalado en otras regiones las campañas de control de roedores, la intensificación agrícola, la desaparición de zonas húmedas y la pérdida de mosaico en las áreas forestales, podrían estar afectando negativamente a esta especie al afectar a su hábitat, la disponibilidad de refugios y a la abundancia de sus presas. En cuanto las causas de mortalidad conocida, en la Comunitat Valenciana, los atropellos suponen el 66,7 % de las causas de entrada en los Centros de Recuperación de Fauna de la Comunitat Valenciana (n=18), mientras que las debidas a trampeos sólo constituyen el 5,6% y no se han registrado casos de envenenamiento (Crespo et al., 2009). Sin embargo el uso de rodenticidas podría ser una importante causa de mortalidad al provocar un envenenamiento secundario poco detectable.

Acciones de conservación:

Ninguna específica. La protección de zonas húmedas debe haber beneficiado a esta especie así como también las actuaciones de conservación de charcas y puntos de agua, la conservación de zonas esteparias y la regulación de los plaguicidas más tóxicos.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2016

Autor ficha: Javier Barona
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Myotis blythii**
Nombre valenciano: Rata penada de morro agut
Nombre castellano: Murciélago ratonero mediano

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Hábitats
· Anexo II
· Anexo IV

Ver más imágenes

Descripción y biología:

La subespecie reconocida para la Comunitat Valenciana es M. b. oxygnatha. Algunos autores la consideran como especie diferente Myotis oxygnathus (Ruedi y Mayer, 2001). Es indistinguible del murciélago ratonero grande si no es en mano. Esta especie es algo menor y menos robusto que el murciélago ratonero grande aunque esto normalmente sólo se aprecia tomando biometrías de los ejemplares capturados. A simple vista se puede diferenciar del murciélago ratonero grande por el número de bandas transversales de la oreja. El murciélago ratonero grande tiene entre 7 y 8 y el

murciélago ratonero mediano entre 5 y 6. Es habitual que el trago de la oreja del murciélago ratonero grande termine en una mancha oscura, casi negra, mientras que el murciélago ratonero mediano presenta el trago de color uniforme. Por último, el murciélago ratonero mediano presenta a veces una mancha blancuzca en la zona dorsal de la cabeza entre ambas orejas y el murciélago ratonero grande nunca la presenta. En otras poblaciones europeas proponen como diagnóstico la longitud de la oreja que siempre es menor de 24,5 mm (21,0 ¿ 24,3 mm) en el murciélago ratonero mediano (Dietz et al., 2009), sin embargo en la Comunitat Valenciana se han recogido medidas ligeramente superiores en ejemplares con mancha blanca. No se puede distinguir del murciélago ratonero grande a través de los ultrasonidos. Para detectar ejemplares del grupo M. myotis/M. blythii hay que situarse en la boca de las cavidades donde se refugian en el momento de la salida de la colonia a sus lugares de caza. Los sonidos de ecolocalización son fácilmente distinguibles con detectores sencillos provistos de sistema heterodino. Son pulsos fuertes en relación a otras especies cavernícolas con una máxima amplitud a 35 kHz. Son animales longevos que pueden vivir más de 10 años. En general se conoce poco sobre su fenología. Se supone muy similar a la del murciélago ratonero grande. Las hembras forman grandes agrupaciones para realizar los partos y criar a los jóvenes. En la Comunitat Valenciana se conoce un mínimo de 9 colonias. Siempre comparte el refugio con el murciélago mediano de herradura, el murciélago ratonero grande, el murciélago ratonero patudo, el murciélago ratonero ibérico y el murciélago de cueva. (Guillén, 1998; ESF, 2011). En la Comunitat Valenciana se observan hembras preñadas desde finales de abril hasta principios de junio. Las hembras están lactantes durante todo el mes de junio y se observan jóvenes crecidos en el interior de la cavidad desde principios de julio. Las colonias de cría se disgregan a finales de agosto (datos propios y Guillén, 1998). Para alimentarse se alejan sólo decenas de kilómetros de sus refugios habituales, (Nogueras y Garrido, 2007). Aunque se supone que se alimenta de ortópteros y coleópteros no se han realizado estudios de alimentación en la Comunitat Valenciana. Sobre su hábitat también se supone presente en ambientes más abiertos que el murciélago ratonero grande. Parece típico de estepas y praderas extensas con algo de arbolado disperso, pero en la Comunitat Valenciana no se han realizado estudios sobre uso del hábitat.

Distribución:

Existen muchos datos que son difíciles de asignar a esta especie o al murciélago ratonero grande debido a su similar apariencia. Al igual que el murciélago ratonero grande parece escasear en las regiones de clima más continental y forestales del norte y centro del territorio. Sin embargo el murciélago ratonero mediano en general es más escaso que el grande, y parece no formar colonias de cría en la mitad norte del territorio. Las poblaciones de hembras reproductoras podrían estar relegadas a una zona de mayor densidad situada en la cuenca baja del Júcar irradiándose en poblaciones satélite de menor magnitud por el norte hasta la sierra Calderona y por el suroeste hasta Salinas (Alicante).

Hábitat:

Los ambientes que ocupa son más abiertos que el murciélago ratonero grande, prefiere hábitats con amplias extensiones de vegetación baja y herbácea, como prados, zonas esteparias, tomillares, etc. donde captura con facilidad escarabajos y saltamontes de los que se alimenta.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana es muy escaso, sólo se conoce en 9 colonias de murciélagos cavernícolas de las cuales sólo 5 albergan en la actualidad más de cien ejemplares y alguna de ellas podría estar formada sólo por machos. Destaca el refugio de Rótova, junto al río Serpis, donde se han llegado a contabilizar más de 1.300 ejemplares en varios años de la última década. En Castellón sólo se conoce una localidad con colonias de la especie en la época de reproducción y por lo que se sabe, podría tratarse de una colonia formada fundamentalmente de machos. En la provincia de Valencia son numerosas las localidades donde se ha registrado la especie en la cuenca baja del Júcar, donde se ha confirmado la reproducción en 6 refugios. En Rótova (Valencia) se halla una importante colonia donde el murciélago ratonero grande es muy minoritario. Se conocen otras dos colonias de cría en el norte de Alicante formadas por apenas unas decenas de ejemplares que comparten la colonia con el murciélago ratonero grande, aparentemente más numeroso (Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad, 2011). La población calculada para el territorio de la Comunitat Valenciana es de unos 2.000 individuos. En Andalucía, existe únicamente una colonia de cría monoespecífica de murciélago ratonero mediano. (Consejería Medio Ambiente, 2009). La desaparición de ejemplares de esta especie es importante en varias localidades. Algunos refugios como el de Alcoi han visto desaparecer la práctica totalidad de los ejemplares que los ocupaban a principios de esta década. Otros refugios como Rótova y Cotes han visto disminuir de forma importante sus efectivos. En Andalucía se han registrado descensos similares entre los años 1994 y 2002 cuando se describió un descenso del 48 % de los ejemplares detectados (Ibáñez et al., 2005). En otras regiones de España se han observado la desaparición de grandes colonias (Nogueras y Garrido, 2007).

Amenazas:

La mayor amenaza conocida es la degradación de los refugios de maternidad e hibernación debido fundamentalmente, por un lado, a molestias causadas por visitantes en el interior de los refugios y, por otro lado, a alteraciones de la estructura física de la boca de la cavidad (crecimiento excesivo de la vegetación, instalación de cierres o rejas inadecuados, etc.) que dificultan el vuelo libre de los ejemplares. Los hábitats de los que depende en la Comunitat Valenciana podrían estar desapareciendo. Sería fundamental poder determinar el uso del hábitat que realiza esta especie para conocer con detalle las afecciones que podrían estar afectándole

Acciones de conservación:

Se conocen 10 refugios con más de 100 ejemplares en época de cría. La Conselleria d¿Infraestructures, Territori i Medi Ambient lleva desarrollando distintas actuaciones de conservación sobre murciélagos desde los años 90. Una de las principales acciones contempladas es la protección mediante vallados de estos refugios importantes para los murciélagos cavernícolas. Hasta la fecha se han protegido con vallado y cartel informativo 5 de estos 10 refugios (cuevas) de interés para la especie. Asimismo, desde 2003 se está llevando a cabo censos anuales de la mayoría de las colonias para determinar la tendencia de las poblaciones. Varios refugios de la especie están incluidos para su protección en diversos parajes protegidos donde se determinan limitaciones de uso y actuaciones de conservación específicas. Dos colonias de cría (Rótova y Vallada) están declaradas como Reservas de Fauna. Una colonia en Sagunto está declarada como Paraje Natural Municipal. Y por último 6 están incluidas como área de aplicación del Decreto 65/2005 por el que se aprueba el plan de recuperación del murciélago ratonero patudo y del murciélago mediano de herradura en la Comunitat Valenciana. De las 10 colonias más importantes 9 se hallan incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1996 - 2016

Autor ficha: Miguel Angel Monsalve Dolz
Año ficha: 2013

Nombre científico: **Myotis myotis**
Nombre valenciano: Rata penada de morro gran
Nombre castellano: Murciélago ratonero grande

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Hábitats
· Anexo II
· Anexo IV

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Es el murciélago cavernícola de mayor tamaño en la Comunitat Valenciana. Tiene las orejas y el hocico bastante grandes en comparación con otros Vespertiliónidos. El color en la zona dorsal es marrón o marrón rojizo y en la ventral es blanco sucio o beige. A menudo se aprecia un característico tono amarillento a ambos lados del cuello y garganta. A simple vista se diferencia del murciélago ratonero mediano por el número de bandas transversales de la oreja. El murciélago ratonero grande tiene entre 7 y 8 y el murciélago ratonero mediano entre 5 y 6. Es habitual que el trago de la oreja termine en una mancha oscura, casi negra, mientras que el murciélago ratonero mediano presenta el trago de color uniforme. Por último, el murciélago ratonero mediano presenta a menudo una mancha blancuzca en la zona dorsal de la cabeza entre ambas orejas y murciélago ratonero grande nunca la presenta. Es diagnóstico la longitud de la oreja > 24,5 mm (24,4 ¿ 27,8 mm) (Dietz et al., 2009). Biometrías Dietz et al., 2009: · Antebrazo: 55,0-66,9 mm. · Peso: 20-27 g. Comunitat Valenciana (datos propios): · Antebrazo adultos: machos 61,3 [57,6-65,2] mm (n=46); hembras 63,8 [59,4-67,0] mm (n=102). · Peso adultos (machos y hembras no gestantes): machos 27,1 [20,7-27,1] g (n=30); hembras 27,5 [22,7-35] g (n=26). No se puede distinguir del murciélago ratonero mediano (M. blythii) a través de los ultrasonidos Para detectar ejemplares del grupo M. myotis/M. blythii hay que situarse en la boca de las cavidades donde se refugian en el momento de la salida de la colonia a sus lugares de caza. Los sonidos de ecolocalización son fácilmente distinguibles con detectores sencillos provistos de sistema heterodino. Son pulsos bastante fuertes en relación a otras especies cavernícolas con una máxima amplitud a 35 kz. Son animales longevos que pueden vivir más de 10 años. Se agrupan con las hembras en agosto para el celo, formando pequeños harenes con hasta tres hembras. Hibernación poco conocida, con animales solitarios o pequeños grupos, nunca grandes colonias (Garrido y Nogueras, 2007). Como

la mayoría de los murciélagos europeos las hembras poseen mecanismos para mantener el esperma y utilizarlo en primavera en las colonias de cría. Gregario durante la cría, con colonias que pueden reunir miles de hembras a partir de marzo, a veces mezcladas con murciélago grande de herradura, murciélago mediano de herradura, murciélago ratonero mediano, murciélago ratonero pardo, murciélago ratonero ibérico y murciélago de cueva. En la Comunitat Valenciana se han detectado hembras gestantes desde finales de marzo hasta principios de junio. En junio las hembras reproductoras suelen estar lactantes. Los partos se dan principalmente a finales de mayo y principios de junio. En otras latitudes los partos se pueden dar en abril. En otras zonas de España (valle del Guadalquivir y sierra Morena) se han encontrado también pequeñas poblaciones de hembras que tienen partos durante el invierno. (Garrido y Nogueras, 2007). A principios de junio se han observado juveniles a punto de volar en Náquera. A principios de julio se observa una agrupación de juveniles todavía querenciados sin huir en Tous (Almenar y Castelló A., com pers.)

Distribución:

Debido a la similitud morfológica con el murciélago ratonero mediano muchas citas de grandes Myotis no se pueden adscribir a una u otra especie. Parecen ser frecuentes las agrupaciones mixtas de ambas especies y en ocasiones agrupaciones de una especie pueden haber pasado inadvertidas entre grupos mayoritarios de la otra. En cierta medida parece evitar las regiones de clima más continental del territorio, donde apenas se ha registrado presencia de individuos solitarios. Apenas se conoce una localidad de cría en Castellón, en la misma costa, donde se reúnen más de 1.500 hembras reproductoras y otra en la sierra Calderona de mediano tamaño (no más de 500 individuos). El área comprendida en la cuenca baja del Júcar y el noreste de Alicante contiene la mayor densidad de colonias en el territorio, aunque al ser la mayoría de las colonias de este área mixtas con murciélago ratonero mediano no se sabe el número de individuos que pertenecen a esta especie. Se ha documentado la reproducción en 4 de estas localidades. No se ha documentado la especie en el interior de Alicante, aunque es probable que haya pasado inadvertida entre la mayoría de murciélago ratonero mediano presente en algunas localidades de esa región.

Hábitat:

El hábitat tipico corresponde a masas arboladas abiertas con pastizales intercalados (Garrido y Nogueras, 2007). En la Comunitat Valenciana no se han realizado estudios específicos de uso del hábitat.

Situación actual:

La población estimada actualmente para la Comunitat Valenciana es de unos 6.000 ejemplares. Se conocen un mínimo de 10 colonias con más de cien ejemplares entre las que destaca una de mayor tamaño, en Oropesa del Mar (Castellón), que ha llegado a albergar con seguridad más de 1.000 hembras en algunos años de la última década. De los pocos datos existentes sobre las proporciones entre esta especie y su hermana (el murciélago ratonero mediano), se puede afirmar que probablemente en 7 de estas colonias el murciélago ratonero grande es más abundante que el murciélago ratonero mediano, en una el grande es minoría frente al mediano y en otras 2 no aparece el mediano. Hasta el año 2009 se observó una alarmante regresión de las poblaciones (regresión del 50 % observada en 7 años de seguimiento). Sin embargo, la tendencia parece haber cambiado con una subida en los censos registrados en los dos últimos años. Este aumento de efectivos censados podría ser reflejo de una recuperación de las poblaciones. La desaparición de ejemplares del grupo Myotis myotis/blythii sigue siendo importante en varias localidades. Algunos refugios como el de Alcoi han visto desaparecer la práctica totalidad de los ejemplares que los ocupaban a principios de esta década. Otros refugios como Rótova y Cotes han visto disminuir de forma importante los efectivos de este grupo. Lamentablemente y debido al método de censo no se puede determinar cuál de las dos especies (o ambas) está sufriendo estas disminuciones. En Andalucía donde se ha analizado la tendencia del murciélago ratonero grande dando para el período comprendido entre 1994 y 2009 un aumento poblacional anual del 6,1 %, lo que indica que la población experimenta un aumento significativo. En la Comunitat Valenciana se ha analizado las tendencia poblacional de los últimos dieciseis años y se considera estable. A pesar de ello se han registrado descensos en los refugios donde la proporción es mayor para el murciélago ratonero mediano (Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad, 2012). Asimismo en Andalucía la única colonia monoespecífica de murciélago ratonero mediano ha reducido su población claramente en las últimas décadas. En otras regiones de España se ha observado la desaparición de grandes colonias (Garrido y Nogueras, 2007).

Amenazas:

La mayor amenaza conocida es la degradación de los refugios de maternidad e hibernación debido fundamentalmente, por un lado, a molestias causadas por visitantes en el interior de los refugios y, por otro lado, a alteraciones de la estructura física de la boca de la cavidad (crecimiento excesivo de la vegetación, instalación de cierres o rejas inadecuados, etc.) que dificultan el vuelo libre de los ejemplares.

Acciones de conservación:

Se conocen 10 refugios con más de 100 ejemplares en época de cría. La Conselleria d¿Infraestructures, Territori i Medi Ambient lleva desarrollando distintas actuaciones de conservación sobre murciélagos desde los años 90. Una de las principales acciones contempladas es la protección mediante vallados de estos refugios importantes para los murciélagos cavernícolas. Hasta la fecha se han protegido con vallado y cartel informativo 3 de estos 10 refugios (cuevas) de interés para la especie. Asimismo, desde 2003 se está llevando a cabo censos anuales de la mayoría de

las colonias para determinar la tendencia de las poblaciones. Varios refugios de la especie están incluidos para su protección en diversos parajes protegidos donde se determinan limitaciones de uso y actuaciones de conservación específicas. Dos colonias de cría (Rótova y Vallada) están declaradas como Reservas de Fauna. Una colonia en Sagunto está declarada como Paraje Natural Municipal. Y por último 7 están incluidas como área de aplicación del Decreto 65/2005 por el que se aprueba el plan de recuperación del murciélago ratonero patudo y del murciélago mediano de herradura en la Comunitat Valenciana. De las 10 colonias más importantes 9 se hallan incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1995 - 2016

Autor ficha: Miguel Angel Monsalve Dolz
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Oenanthe leucura**
Nombre valenciano: Còlbia negra
Nombre castellano: Collalba negra

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 18 cm, P 35-40 g. Pájaro insectívoro que suele posarse erguido en lugares aventajados (piedras, montículos). Su cola tiene un diseño característico, con una barra terminal y las plumas centrales negras, formando una T destacada sobre el resto de la cola y su base de color blanco. Los machos adultos son completamente de color negro y sólo muestran el blanco descrito en la cola. Las hembras y los jóvenes son igualmente negros, pero algo más parduscos.

Distribución:

En la península Ibérica se presenta la subespecie nominal que se extiende por la Europa mediterránea. En España se extiende por la fachada mediterránea, desde Cádiz a Tarragona, adentrándose de forma dispersa por el valle del Ebro, la meseta sur y Extremadura. Está ausente de ambos archipiélagos. Tiene una escasa movilidad migratoria y puede ser vista en localidades donde no nidifica fuera del periodo reproductor.

Hábitat:

Prefiere terrenos escarpados y rocosos, desprovistos de vegetación o con formaciones abiertas de herbáceas o de arbolado. Ocupa acantilados marinos y del interior. Puede ocupar edificios en ruinas y otras construcciones aisladas en estos ambientes de presencia. Nidifica en grietas del suelo o paredes, en una copa de hierbas.

Situación actual:

Nidificante extendido por las tres provincias, con algunas discontinuidades de presencia en el norte de la provincia de Castellón, en el litoral e interior de la provincia de Valencia y en el sur de la de Alicante. Ocupa en torno al 80 % de las cuadrículas UTM del territorio, lo que representa una extensión similar a la estimada en los años ochenta. Pese a su regularidad de presencia, resulta poco abundante. Puede ser visto en localidades donde no nidifica, particularmente en los meses invernales, siempre en los hábitats propios de la especie.

Amenazas:

Aparece afectada por la transformación de los hábitats que ocupa, particularmente por la extracción de áridos (canteras) o por la urbanización, más acentuada a lo largo de los tramos rocosos del litoral. También se ve desplazada por el desarrollo de la cubierta forestal densa, así como por incendios reiterados.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Oryctolagus cuniculus**
Nombre valenciano: Conill
Nombre castellano: Conejo

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Ver más imágenes

Descripción y biología:

El conejo, se caracteriza por sus grandes orejas, cola corta y fuertes patas traseras adaptadas a la carrera. Pesa entre 1 y 2 kilogramos, y la única especie similar es la liebre, de talla algo mayor y orejas y patas aún más largas. Son animales sociales y territoriales, desarrollando su vida alrededor de una madriguera que comparten individuos de ambos sexos y todas las edades, aunque los machos mantienen una cierta jerarquía. Es una especie polígama que puede reproducirse durante todo el año. Tras una corta gestación (alrededor de un mes) pueden dar a luz hasta seis gazapos, que alcanzan pronto la madurez sexual y pueden reproducirse a los pocos meses de su nacimiento, con lo que demuestran una enorme capacidad de multiplicarse. En un estudio realizado con ejemplares cazados en un coto del sur de Alicante, Arques y Peiró (2005) encontraron que sólo el 7,6 % de los conejos superaron los dos años de edad, siendo cuatro años la edad máxima determinada. En la sierra de Mariola se han determinado, me diante transectos, abundancias máximas en mayo (1,1 conejos/km) y mínimas en invierno (0,57 conejos/ km) (Arques et al., 2010). En nuestra tierra es un animal esencialmente nocturno, aunque es fácil verlos al amanecer y al anochecer, e incluso de día cuando se presenta en altas densidades. Se alimenta preferentemente de vegetación herbácea, aunque busca también brotes de arbustos, desentierra raíces y bulbos y puede roer la corteza de árboles jóvenes

Distribución:

Aunque su origen es la Península Ibérica, se ha introducido por toda Europa y llevado a América, Australia, África y muchas islas oceánicas, donde frecuentemente se comporta como plaga. El conejo se encuentra repartido por toda la Comunitat, desde la costa al interior y por todas las altitudes. Existió una población introducida (aunque mezclada con ejemplares domésticos) en las islas Columbretes, de donde fue erradicada en 1988.

Hábitat:

Es una especie muy plástica, pudiendo adaptarse a múltiples ambientes, desde entornos periurbanos, a arenales costeros, saladares, cultivos y zonas forestales. Prefiere no obstante terrenos abiertos, con poco relieve, baja cobertura, no excesivamente húmedos y con terrenos fáciles de excavar. En la sierra de Mariola es más abundante en los cultivos de secano y luego en los de regadío siendo más escaso en terrenos cubiertos de vegetación natural (Arques et al., 2010).

Situación actual:

Es una especie cinegética que ha sufrido enormes variaciones en su abundancia a causa de la incidencia de distintas enfermedades. En los años 50 apareció en España la mixomatosis, enfermedad vírica que en algunos lugares eliminó hasta el 90 % de la población. Las primeras estadísticas cinegéticas de la Comunitat (Anuarios de Estadística Agraria) indicaban que en los años 70 se cazaban alrededor de 200.000 conejos por temporada, cifra en declive hasta mediados de los 80. A partir de entonces se aprecia un fuerte incremento en la provincia de Alicante, mientras que la aparición de la hemorragia vírica (finales de los 80) reduce las capturas en Valencia y Castellón. A partir de 2005 se aprecia un fuerte incremento de las piezas cobradas en Alicante, pero sobre todo en Valencia (Anuarios de Estadística Forestal), con toda probabilidad por la aparición de resistencia a las enfermedades. En los últimos años, la especie alcanza dimensiones de plaga en determinadas comarcas (Vega Baja, Vall d¿Albaida, Plana de Requena- Utiel), con capturas anuales que se acercan a 600.000 ejemplares para la temporada 2010-2011 (datos del Servicio de Caza y Pesca).

Amenazas:

En hábitats favorables y con baja incidencia de enfermedades, la especie puede ser extraordinariamente numerosa, alcanzando densidades de hasta 100 ej/ha que resultan en graves daños a la vegetación y, en particular, a los cultivos. En estas condiciones es difícil de controlar, pues es bien capaz de contrarrestar el aumento de la presión cinegética con su facilidad de reproducción. Su abundancia controla además la abundancia y reproducción de muchas otras especies, como es el caso de los carnívoros silvestres. Rapaces y mamíferos predadores se ven afectados por su escasez, reduciendo su densidad y sustituyendo al conejo por otras especies en su dieta. A la inversa, cuando el conejo se recupera, los predadores resultan rápidamente beneficiados.

Acciones de conservación:

En tiempos y zonas donde escasea, ha sido objeto de gran número de repoblaciones, lo que ha contribuido a la difusión de cepas de diferente virulencia, provocando tanto desplomes como remontes en densidad. En los últimos años, la principal acción de gestión es el control de sus poblaciones allí donde su abundancia justifica la declaración de zonas de emergencia cinegética a causa de los daños que producen en los cultivos. En estas zonas se permite su caza durante todo el año y el empleo de diferentes artes de caza, incluyendo el hurón, modalidad que en tiempos llegó a estar prohibida para facilitar la recuperación del conejo.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez Pérez
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Oxyura leucocephala**
Nombre valenciano: Anec capblanc
Nombre castellano: Malvasía cabeciblanca

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· En peligro de extinción
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - En peligro de extinción
Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo I
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 41 cm, P 350-800 g. Singular anátida buceadora de tamaño medio-pequeño. El ♂macho presenta un cuerpo marrón castaño, con la cabeza blanca y un capirote ♂negro. La hembra es marrón con las mejillas atravesadas por una banda marrón ♂ancha. Ambos sexos muestran una larga cola aplanada que en ocasiones ♂mantienen levantada y un llamativo pico muy abultado en la base, de color ♂azul en los machos adultos. Las aves inmaduras son similares a las hembras. ♂Sus alas son de color marrón uniforme en vuelo. Se debe extremar la ♂precaución en su identificación ante la posible presencia de la Malvasía ♂Canela (Oxyura jamaicensis) y sus híbridos; esta especie, de origen ♂americano e introducida en Europa, ha colonizado la Península Ibérica ♂durante los años 80, produciendo híbridos con la Malvasía Cabeciblanca ♂durante los años 90.♂

Distribución:

Especie distribuida por el sur del continente Eurasiático. Los efectivos ♂actuales de la población española se estiman algo superiores a los 2.000 ♂ejemplares. La especie ha mostrado un crecimiento continuo desde un mínimo ♂histórico nacional de 22 ejemplares en 1977, cuando estuvo al borde de su ♂extinción en España. En la actualidad parece haber ocupado su zona potencial ♂de presencia en la Península Ibérica y se distribuye localmente por su ♂cuadrante sudeste. La especie parece comportarse como sedentaria o realizar ♂desplazamientos en función de la disponibilidad de humedales con niveles ♂óptimos de inundación. Durante la invernada, el Hondo se ha situado como la ♂principal localidad en importancia numérica, junto a otras localidades ♂andaluzas tradicionales como la laguna de Medina (Cádiz), la albufera de ♂Adra (Almería) o Doñana, entre otras♂

Hábitat:

Ocupa pequeños lagos, lagunas o marismas, de aguas dulces o salobres en ∂paisajes áridos. Prefiere humedales con abundante vegetación sumergida y ∂densas masas de vegetación palustre perimetral. Frecuenta grandes masas de ∂agua durante la invernada.∂

Situación actual:

No parece existir una tradición de presencia de la especie, al margen de ∂algunas capturas ocasionales por cazadores. Recientemente, en el contexto de ∂recuperación demográfica de la especie en España y de su expansión ∂geográfica, a partir de 1991 nidifica por primera vez en El Hondo y desde ∂entonces ha experimentado un incremento gradual, alcanzando las 190 parejas ∂en 2000 y ocupando otras localidades como el Hondo de Amorós y el Clot de ∂Galvany, donde también ha nidificado. Desde entonces, las condiciones ∂hidrológicas desfavorables han causado importantes declives, como el ∂registrado en 2003, cuando sólo nidifican 11 parejas. Durante la invernada, ∂los efectivos en El Hondo han alcanzado máximos superiores al millar de ∂ejemplares, albergando a la mayoría de la población ibérica de la especie. ∂En este sentido, El Hondo ha llegado a albergar a la principal concentración ∂de la especie registrada en España, cuando 4.035 ejemplares fueron censados ∂en agosto de 2000. Existen citas ocasionales de ejemplares aislados en ∂humedales de la provincia de Valencia.∂

Amenazas:

La especie está considerada en peligro por sus escasos efectivos mundiales. ∂A finales de los años setenta su población ibérica alcanzó un mínimo ∂demográfico de 22 ejemplares, a partir del cual se ha recuperado tras ∂constantes esfuerzos de conservación. Su principal amenaza actual es la ∂expansión de la Malvasía Canela, una especie exótica en Europa con la que se ∂empareja generando híbridos. El deterioro o la desaparición de los humedales ∂supone igualmente una importante amenaza, particularmente debido a las ∂elevadas concentraciones de la especie en muy pocas localidades. Esto le ∂hace extremadamente sensible a la desecación temporal de los humedales que ∂ocupa o a la pérdida de la calidad biológica de sus aguas. La pérdida de la ∂calidad de la cubierta vegetal en los hábitats palustres limita su ∂reproducción. Parece especialmente afectada por el plumbismo. La ∂contaminación de los medios acuáticos puede afectarle directamente o a las ∂especies de las que se alimenta.∂∂

Acciones de conservación:

La especie aparece catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo ∂Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 de ∂febrero).∂La protección y conservación de los humedales que ocupa y de su entorno, ∂garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Existe un programa de ∂erradicación de la Malvasía Canela y sus híbridos en España que se ha ∂extendido recientemente a las islas Británicas, desde donde se originan los ∂efectivos que han colonizado el resto de Europa. Se han desarrollado ∂actuaciones de conservación en El Hondo que se concretan en censos regulares ∂de la especie, control y prohibición de la actividad cinegética, ∂regeneración del hábitat y caracterización de los depósitos de plomo en el ∂fondo de sus lagunas. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso ∂racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales. La ∂prohibición del uso de munición de plomo en los humedales es una medida ∂tendente a minimizar el problema del plumbismo∂

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



Mapa de distribución:

Acercar a



Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino

Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Panurus biarmicus**
Nombre valenciano: Xauet mostatxut Serenet
Nombre castellano: Bigotudo

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE



Descripción y biología:

L 11 cm, P 12-18 g. Pájaro insectívoro de aspecto singular, con cuerpo pequeño y cola muy larga. Su plumaje es de color pardo amarillento pálido. Los machos tienen la cabeza gris azulada, dos grandes bigotes definidos por plumas negras, la garganta blanca y plumas negras en la parte inferior de la cola. Las hembras y los juveniles carecen del capirote grisáceo y de las plumas negras de los bigotes. Vuelo con rápido batir de alas, acompañado de su voz metálica típica, "píng".

Distribución:

En la península ibérica se presenta la subespecie de distribución europea. En España cuenta con pequeños núcleos de población en el litoral mediterráneo, entre Tarragona y Alicante, en La Mancha húmeda y en humedales del valle del Ebro y Palencia. Está ausente de ambos archipiélagos. Está considerado como sedentario, sin embargo puede colonizar zonas nuevas, indicando el desarrollo de ciertos desplazamientos nomádicos.

Hábitat:

Estrictamente vinculado con la vegetación palustre de las zonas húmedas, seleccionando extensas masas de carrizales, con presencia de carrizo, enea y masiega, casi como único ambiente de presencia. Nidifica en carrizales densos, en una copa vegetal instalada a baja altura.

Amenazas:

La destrucción y el deterioro de los carrizales presentan las principales amenazas. La degradación de ciertas zonas húmedas, consecuencia de la contaminación, la desecación excesiva o la antropización de su entorno, altera sus hábitats de cría y alimentación y genera una proliferación de depredadores, como las ratas o los gatos, que conduce a importantes pérdidas de nidos e individuos de esta especie, pudiendo causar la desaparición de pequeños núcleos de población. Debido a su escasa movilidad, requiere la presencia de humedales que configuren corredores territoriales por los que desplazarse en el caso de condiciones ambientales adversas (como sequías, olas de fría, incendios, etc.) y que posibiliten la colonización de zonas nuevas.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1991 - 2013

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Parus major**
Nombre valenciano: Totestiu
Nombre castellano: Carbonero común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Carlos Pache

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 14 cm, P 16-21 g. Pájaro insectívoro con el dorso verde azulado y las partes inferiores de color amarillo. Tiene un capuchón negro con grandes parches blancos en cada mejilla. El negro de la garganta se extiende por una banda central del pecho alcanzando la zona ventral en los machos y desapareciendo en la parte baja del pecho en las hembras.

Distribución:

En la península Ibérica se presenta la subespecie nominal, extendida por Europa, mientras que en las islas Baleares aparece una subespecie propia. La especie ocupa todo el territorio peninsular, mostrando discontinuidades de presencia muy pequeñas en las zonas más deforestadas de los principales valles fluviales y de ambas mesetas, así como en las zonas áridas del sudeste. Está ausente de las islas Canarias. Es una especie básicamente sedentaria, aunque puede desarrollar movimientos fuera de la época de reproducción

Hábitat:

Ocupa terrenos muy variados, prefiriendo formaciones forestales densas y maduras, aunque también ocupa zonas más abiertas, así como otros ambientes antropizados, tanto agrícolas como urbanos, siendo un ave relativamente común en parques. Nidifica en cavidades de árboles o muros.

Situación actual:

Se extiende por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, ocupando prácticamente el 100 % de las cuadrículas UTM, mostrando puntuales ausencias en zonas más deforestadas de la comarca de La Plana de Requena-Utiel. Pese a la regularidad de su presencia, es un ave que suele aparecer en bajo número. También es habitual en las zonas ajardinadas de los cascos urbanos.

Amenazas:

Muestra bastante plasticidad a la transformación del entorno y ocupa ambientes altamente humanizados. Su proximidad al hombre le hace sensible al contacto con pesticidas empleados en la agricultura o en el tratamiento de plagas urbanas. Fuera del entorno urbano, dependen de la presencia de árboles maduros con cavidades en los que nidificar.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. Se ve favorecido por las campañas de colocación de cajas nido en sus áreas de presencia.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Passer domesticus**
Nombre valenciano: Teuladí
Nombre castellano: Gorrión común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo III - Tuteladas

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 14,5 cm, P 22-23 g. Pájaro de aspecto muy conocido. Su pico es cónico, con la base ancha. Su dorso es pardo con listas negruzcas anchas y las partes inferiores son blanco grisáceo. Los machos adultos tienen la coronilla grisácea y una mancha negra extendida desde la base del pico hasta la parte superior del pecho. Las hembras y los juveniles carecen de estas marcas y presentan una lista ocular ancha pálida, extendida por detrás del ojo.

Distribución:

En la península Ibérica nidifica la subespecie nominal, de distribución Europea, sin embargo se ha propuesto la existencia de una subespecie iberobalear propia. Ocupa densamente toda la superficie peninsular y las islas Baleares. Está ausente de las islas Canarias. Tiene una escasa movilidad migratoria.

Hábitat:

Especie muy vinculada a ambientes antropizados muy variados, tanto agrícolas como urbanos. Ave típica de grandes ciudades. Nidifica en cavidades de edificios, aunque también en nidos abovedados de hierbas. Fuera del periodo reproductor suele formar dormideros comunales en arboledas de ciudades.

Situación actual:

Nidificante extendido por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, ocupando cerca del 100 % de sus cuadrículas UTM y puede ser considerada como la especie más común. Aparece principalmente vinculado con los diferentes cascos urbanos, tanto del litoral como del interior. En las zonas más despobladas de las comarcas interiores se vincula con caseríos agrícolas e instalaciones ganaderas. Frecuenta todo el año las localidades donde cría y forma pequeños bandos fuera del periodo reproductor. Pese a ser una especie abundante, se han apuntado importantes descensos locales, como en áreas de naranjal del norte de Valencia.

Amenazas:

No presenta amenazas específicas.

Acciones de conservación:

La especie aparece clasificada como ¿tutelada¿ el el Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 de febrero de la Generalitat Valenciana).

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Pelophylax perezi**
Nombre valenciano: Granota verda
Nombre castellano: Rana común

Autor Especie: **(Seoane, 1885)**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
- Anexo II - Protegidas

Convenio de Berna
- Anexo III

Directiva de Hábitats
- Anexo V

Autor Foto: José Larrosa

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Anuro de aspecto grácil cuyas hembras pueden superar los 100 mm, si bien lo habitual son ejemplares de menor talla. Coloración dorsal habitualmente verdosa, aunque variable. Es frecuente una línea dorsal clara. Los machos presentan sacos vocales de color gris en las comisuras de la boca. Durante el celo presentan callosidades nupciales oscuras patentes sobre la cara interna del primer dedo. Larva grande (normalmente 60-70 mm, aunque puede ser mayor). Espiráculo lateral sobre el costado izquierdo.♂♂Son activas tanto de día como de noche. Período reproductor entre marzo y julio. Los machos cantan de día y de noche, tanto dentro como fuera del agua, formando coros audibles desde larga distancia. Amplexo axilar. La hembra puede poner varios miles de huevos agrupados en masas flotantes. La eclosión se produce pocos días después y el desarrollo de las larva se prolonga por uno o dos meses.♂♂Los adultos se alimentan principalmente de insectos, lombrices y moluscos; también se ha citado el consumo de vertebrados (peces, otros anfibios, etc), incluyendo el canibalismo. ♂♂Entre sus depredadores se cuentan numerosas aves, ofidios y mamíferos carnívoros. En su huida se dirigen al agua dando saltos y se entierran en el fondo.♂

Distribución:

Ocupa los archipiélagos balear y canario (donde ha sido introducida), sur de Francia y la práctica totalidad de la península Ibérica, excepto altitudes superiores a 2000 m. Presente en toda la Comunidad Valenciana; su único factor limitante es la presencia constante de una masa de agua; aparece incluso en aguas con elevada contaminación.

Hábitat:

Debido a sus hábitos acuáticos, aparece siempre ligada a la existencia de masas de agua de muy diversa tipología y con independencia del uso del entorno en que se ubique; no obstante, si bien puede aparacer en pozas de barrancos, prefiere enclaves sin corriente. Así, puede resultar incluso abundante en charcas, estanques, lagunas, marjales, navajos, balsas, abrevaderos.

Situación actual:

Es sin duda el anuro más ampliamente distribuido y abundante de la Península Ibérica y, por ende, de la Comunidad Valenciana, gracias a su capacidad de colonización de todo tipo de puntos de agua.

Amenazas:

Si bien no se considera una especie amenazada, la intensificación de la agricultura y los tratamientos fitosanitarios masivos han provocado la regresión y desaparición local de poblaciones de rana común a lo largo de su área de distribución. Por otra parte, se ha detectado un proceso en curso por el cual ciertas especies de ranas verdes centroeuropeas consideradas actualmente un complejo con capacidad hibridogenética (denominado Rana kl. grafi), parecen estar hibridando poblaciones de Rana perezi en diferentes zonas de la Península y amenazando su existencia a través de un complejo mecanismo de sustitución genética.

Acciones de conservación:

No se ha realizado ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios

y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Petronia petronia**
Nombre valenciano: Pardal roquer
Nombre castellano: Gorrión chillón

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 15 cm, P 25-36 g. Pájaro robusto, con un llamativo pico cónico grande y de color pálido. Tiene un plumaje listado, de coloración pardo grisáceo, mostrando una llamativa lista ocular ancha pálida extendida por detrás del ojo. Presenta plumas con extremos blancos en la cola. Los adultos muestran una mancha amarilla en la parte baja de la garganta.

Distribución:

En la península Ibérica nidifica la subespecie nominal distribuida por Europa y Asia Menor. En España se presenta distribuido de forma continua por el interior peninsular, ausentándose de las tierras bajas y de los tramos medios y bajos de los diferentes valles fluviales. Tampoco aparece en toda la cornisa atlántica ni en el eje pirenaico. Aparece localmente en ambos archipiélagos. Tiene una escasa movilidad migratoria.

Hábitat:

Ocupa ambientes rupícolas variados. Prefiere terrenos abiertos, con escasa cubierta vegetal y con presencia de roca desnuda o muros. Puede ocupar caseríos aislados y ruinas. Nidifica en cavidades de árboles o de edificios.

Situación actual:

Nidificante ampliamente extendido por las tres provincias, ocupando las comarcas más agrestes y ausentándose de las amplias planas litorales. Tampoco aparece en algunas localidades de la comarca de La Plana de Requena-Utiel, donde no se dan hábitats propios. Ocupa en torno al 63 % de las cuadrículas UTM de la Comunidad Valenciana. Frecuenta todo el año las localidades donde cría y forma pequeños bandos fuera del periodo reproductor.

Amenazas:

Pueden ver afectados por extracción de áridos, con creación de canteras, por repoblación o por transformación en tierras de cultivo.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Pica pica**
Nombre valenciano: Blanca
Nombre castellano: Urraca

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Directiva de Aves
· Anexo II.2

Autor Foto: Luis Fidel

Descripción y biología:

L 46 cm, P 200-250 g. Pájaro muy singular, de tamaño medio-grande, con una cola muy larga y un pico fuerte. Su cuerpo es de color prácticamente negro, con reflejos morados y verdosos, pero tiene dos llamativos parches blancos en la espalda y toda la barriga blanca. La extremada longitud de la cola llama la atención en vuelo.

Distribución:

En la península Ibérica aparece una subespecie propia, que en España prácticamente sólo está ausente de algunas áreas de Andalucía y del litoral sudeste. Está ausente de ambos archipiélagos. Tiene una escasa movilidad migratoria, sin embargo puede desarrollar movimientos fuera del periodo reproductor.

Hábitat:

Ocupa una gran variedad de ambientes, prefiriendo los paisajes con formaciones arboladas abiertas. Está bien adaptada a los medios antropizados y puede ocupar todo tipo de ambientes agrícolas y ganaderos, entrando en el entorno urbano. Parece evitar formaciones de coníferas muy cerradas. Nidifica en árboles, en una plataforma abovedada de ramas.

Situación actual:

Nidifica extendido por toda la provincia de Castellón y por el interior de las provincias de Valencia y Alicante. Fuera de Castellón, se encuentra prácticamente ausente de las comarcas litorales y muestra amplias áreas de ausencia en las comarcas del Campo del Turia, Ribera Alta y en las del sur de Alicante. Ocupa en torno al 80 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una presencia superior a la registrada en los años ochenta, cuando se estimó en el 61 % de las cuadrículas UTM. En las últimas décadas se ha podido observar un aumento de presencia hacia el litoral en toda la provincia de Castellón y en las comarcas de La Huerta Norte, el condado de Cocentaina o La Marina. Fuera del periodo reproductor puede ser observado en localidades donde no nidifica.

Amenazas:

Es una especie que se adapta bien a los cambios de su entorno, anunque sufre una importante persecución y aparece afectada por la caza.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Picus viridis**
Nombre valenciano: Picot verd
Nombre castellano: Pito real

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 32 cm, P 180-220 g. Picapinos de tamaño grande. Su plumaje es de color verde, con la espalda y la base de la cola de color verde amarillento. Tiene una caperuza rojiza extendida desde la frente a la nuca, así como una bigotera rojiza. Pico fuerte. Vuelo ondulante típico.

Distribución:

La subespecie presente en España se distribuye por la península Ibérica y el sudeste de Francia. Se encuentra ampliamente extendido por España, mostrando algunas discontinuidades de presencia, principalmente en el valle del Ebro, en Extremadura y en valle del Guadalquivir. Ausente de ambos archipiélagos. Es una especie sedentaria.

Hábitat:

Ocupa una gran variedad de terrenos abiertos, con arbolado de coníferas o frondosas, pero también ocupa ambientes menos arbolados, con setos, cultivos arbóreos, e incluso zonas ajardinadas. Nidifica en agujeros que taladra en troncos de grandes árboles.

Situación actual:

Nidifica ampliamente distribuido por las tres provincias, estando más ausente en las comarcas del litoral y en las del sur de Alicante. Aparece ocupando poco más del 80 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una superficie similar o incluso superior a la que ocupaba en la década de los ochenta. Muy rara vez es visto en localidades donde no nidifica.

Amenazas:

La principal amenaza viene representada por la desaparición del arbolado viejo, del que depende para la construcción de sus nidos. La intensificación de la agricultura y de los usos forestales causa una disminución de sus poblaciones. Se puede ver afectado por pesticidas en zonas agrícolas o en jardinería. Puntualmente y debido a su gran tamaño, puede ser objeto de caza ilegal.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Plecotus austriacus**
Nombre valenciano: Rata penada orelluda meridional
Nombre castellano: Orejudo gris

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Hábitats
· Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Miguel Angel Monsalve

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Es un murciélago de tamaño mediano, en el que destacan los pabellones auditivos tremendamente desarrollados, aunque puede plegarlos, ocultandolos detrás de la cabeza. El color del dorso es gris parduzco oscuro, y la coloración ventral es blanco cremoso. Las alas son cortas y anchas, lo que le permite desarrollar un vuelo lento y maniobrable. No se ha descrito dimorfismo sexual, aunque las hembras son ligeramente mayores que los machos. El pelaje de la cara es gris oscuro. Morfológicamente es casi idéntico a P. auritus, requeriéndose la determinación en mano por parte de especialistas. La longitud es de alrededor de 4 a 6 cm., y la envergadura alar de 25 a 29 cm.♂Emiten ultrasonidos de ecolocación muy débiles, entre 85 y 25 KHz.♂

Distribución:

Ocupa una gran franja del área Euroasiática, que incluye desde Cabo Verde y el Mediterráneo occidental, hasta Mongolia y China occidental, incluyendo el Norte de Africa y Asia menor. Presente en toda Europa, excepto Escandinavia y Norte de Gran Bretaña. En la Comunidad Valenciana aparece en las tres provincias, evitando la franja litoral, y siendo más abundante en las áreas montañosas e interiores.

Hábitat:

Se refugia en grietas en la roca o en edificios, y las parideras suelen ubicarse en construcciones humanas (abandonadas o no) o en cuevas. Es frecuente hallar individuos solitarios en nidales de aves, o en cajas-refugio de murciélagos. Habita zonas con arbolado, ya sean agrícolas o forestales, y áreas abiertas, donde caza preferentemente grandes lepidópteros nocturnos.

Situación actual:

Se desconcoce la situación actual de la especie en la Comunidad Valenciana, aunque parece no ser excesivamente rara, y estar bien repartida por la zona interior.

Amenazas:

La restauración de edificios, o la destrucción de construcciones abandonadas, puede limitar la disponibilidad de refugios para la especie. Asimismo, es posible que los tratamientos químicos para la madera también puedan afectar a algunas poblaciones. Por último, los tratamientos fitosanitarios, tanto agrícolas como forestales pueden tener efectos negativos, tanto al reducir la disponibilidad de presas, como por la acumulación de toxinas en sus organismos.

Acciones de conservación:

Actualmente la Conselleria de Medi Ambient está desarrollando un programa específico dirigido a la conservación de los quirópteros de la Comunidad Valenciana. Las actuaciones previstas beneficiarán a la especie mediante la protección de ciertos refugios de especies cavernícolas, que son utilizados en ocasiones por la especie. Asimismo, se están instalando refugios artificiales para murciélagos en sierras del interior de Valencia y Castellón.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1996 - 2016

Autor ficha: Miguel Angel Monsalve Dolz
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Podarcis hispanica**
Nombre valenciano: Sargantana ibèrica
Nombre castellano: Lagartija ibérica

Autor Especie: **(Steindachner, 1870)**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III

Autor Foto: José Larrosa

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Lagartija generalmente pequeña y esbelta, de cabeza relativamente aplanada. Los machos alcanzan mayor talla. Color y diseño dorsal variable, desde pardo u ocre verdoso hasta verde brillante. Sobre dicho fondo pueden aparecer manchas negras más o menos contrastadas en un reticulado de disposición irregular o formando bandas dorsolaterales. También pueden existir pequeñas manchas conformando una línea vertebral más o menos discontinua; el diseño dorsal manchado es más frecuente en machos, mientras que en hembras suele aparecer un bandeado longitudinal en el que alternan franjas claras y oscuras. Los juveniles presentan color y diseño similar, si bien con frecuencia la cola es de color verde o azul.♂♂El ciclo anual de actividad es variable dependiendo de la climatología. Suele invernar durante diciembre y enero en grietas y fisuras del sustrato, con frecuencia en grupo. La actividad sexual se inicia tras la diapausa invernal y las cópulas tienen lugar durante la primavera temprana. Pueden realizar dos o tres puestas, de entre 1 y 5 huevos cada una, entre abril y julio. La incubación dura de mes y medio a dos meses. Los nacimientos se producen a lo largo del verano. Adquieren la madurez sexual al segundo año y su longevidad máxima parece que no supera los cuatro años.♂♂Dieta básicamente insectívora, si bien se ha mencionado la ingestión de materia vegetal y la depredación sobre juveniles de gecos y lacértidos (incluyendo puestas y juveniles de su propia especie). Entre sus presas más frecuentes están larvas de coleópteros y lepidópteros, dípteros, hemípteros y arácnidos. Puede, a su vez, ser presa de diversos saurios, ofidios, numerosas aves y algunos mamíferos.♂

Distribución:

Península Ibérica y norte de África. Presente en muchas islas e islotes tanto atlánticos como mediterráneos. Presente en la práctica totalidad de la Comunidad Valenciana, y en los islotes de Benidorm, donde alcanza densidades considerables, Descubridor y Portitxol.

Hábitat:

Puede aparecer en una amplísima variedad de biotopos, desde ruinas y troncos sobre dunas costeras como en la Devesa del Saler, donde convive con otros lacértidos, hasta relieves montañosos del interior. No obstante, prefiere terrenos con poca vegetación, sustratos rocosos y pedregosos y abunda en áreas humanizadas, donde le favorece la presencia de ruinas, hormas y muros.

Situación actual:

Se trata de una especie abundante y ampliamente distribuida que no reviste en principio problemas de conservación.

Amenazas:

Transformaciones agrarias, incendios forestales, agroquímicos.

Acciones de conservación:

No se ha realizado ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Podiceps cristatus**
Nombre valenciano: Cabrellot
Nombre castellano: Somormujo lavanco

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 48 cm, P 750-1.200 g. Somormujo de gran tamaño y cuello largo, con plumaje nupcial inconfundible, mostrando crestas llamativas en las mejillas y en la parte superior de la nuca que pierde tras la temporada de cría. Partes superiores parduscas contrastadas con las partes inferiores blancas. Vuela rápido a ras de agua, mostrando marcas blancas llamativas en las alas.

Distribución:

La subespecie presente en la Península Ibérica se distribuye por el centro y sur del continente Eurasiático. En España resulta algo localizado, aunque aparece ampliamente distribuido por las principales masas de agua continentales. En invierno puede ser frecuente en el mar, particularmente en tramos de costa baja, frente a las principales zonas húmedas y desembocaduras de ríos.

Hábitat:

Ocupa masas de agua, preferentemente dulce y de gran tamaño, con presencia de vegetación subacuática. Es común en embalses y en remansos de grandes ríos. En invierno también en el mar.

Situación actual:

Nidifica en el 4 % de las cuadrículas UTM del territorio y se estima una población nidificante algo superior a las 100 parejas Presente en los principales humedales del litoral de las tres provincias que presentan láminas de agua durante todo el año, particularmente l.Albufera de Valencia y El Hondo. También aparece en algunos embalses, particularmente en las provincias de Valencia y Alicante. En invierno puede aparece en otras localidades donde no nidifica, así como en el mar, en tramos de costa baja, preferentemente en los de playas de arena. La población invernante se sitúa en torno al centenar de ejemplares.

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales supone la principal amenaza. La pérdida de la calidad del agua, particularmente por contaminación, puede afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta. Durante la época de nidificación, la desecación artificial o los cambios en los niveles de inundación, particularmente en las masas de agua utilizadas para la agricultura, puede causar la pérdida de nidos o polladas. Algunos ejemplares pueden perecer en artes de pesca como el trasmallo, tanto en aguas continentales como marinas.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Pomatoschistus microps**
Nombre valenciano: Gobi d´arena
Nombre castellano: Cabuxino enano

Origen: Autóctono
Medio: Ambos

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna
· Anexo III

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Pez de pequeño tamaño con tallas que apenas alcanzan los 8 cm. Poseen dos aletas dorsales y la boca dirigida hacia arriba. De hábitos bentónicos, se desplazan siempre cerca del fondo donde se alimentan de pequeños invertebrados. La freza tiene lugar durante la primavera, cuidando el macho la puesta durante una semana aproximadamente.

Distribución:

Se distribuye por el Atlántico Este, desde Noruega hasta Marruecos, incluyendo las costas de Portugal y el oeste del Mediterráneo. Existen poblaciones importantes en el Delta del Ebro. En la Comunidad Valenciana podemos encontrarlo en aguas continentales en el río Bullent, en el Parque Natural de Oliva-Pego, y en las turberas del Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. También ha sido citada la especie en el tramo final del río Segura y en el Hondo de Elche.

Hábitat:

Se trata de una especie de carácter eurihalino, que vive en las costas pero que penetra en los cursos bajos de los ríos o en aguas interiores litorales. Prefiere vivir en aguas estancadas o de corriente no muy fuerte y con fondos arenosos o con cantos.

Situación actual:

No se conoce la evolución de sus poblaciones o distribución, aunque en algunos lugares donde se encuentra hoy en día es bastante frecuente.

Amenazas:

La disminución de la calidad del agua por problemas de contaminación parece ser el factor más negativo que incide en la conservación de la especie.

Acciones de conservación:

No se ha llevado a cabo ninguna acción específica de conservación sobre la especie.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1995 - 2016

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Psammodromus algirus**
Nombre valenciano: Sargantana cuallarga
Nombre castellano: Lagartija colilarga

Autor Especie: **(Linnaeus, 1758)**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: José Larrosa

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Lagartija grande (hasta 90 mm de longitud cabeza-cuerpo) de cola relativamente muy larga. Escamas del dorso y cuello imbricadas y fuertemente aquilladas. Sobre el dorso destacan dos líneas dorsolaterales claras o amarillentas. Presentan ocelos azulados sobre la base del miembro anterior, más conspicuos en los machos; éstos, durante el celo, presentan tonalidades anaranjadas en cara, garganta ambos lados del cuello.♂♂Las poblaciones costeras pueden presentar actividad durante todo el año. Su termorregulación la realizan tanto en el suelo como encaramándose a la vegetación. El celo tiene lugar en primavera y las cópulas, en las que el macho muerde a la hembra en la cabeza y los costados, se extienden hasta principios de verano. Las puestas se producen entre mayo y julio y constan de 2 a 11

huevos. Periodo de incubación entre uno y dos meses. ♂♂Su dieta, básicamente insectívora, es muy variada e incluye principalmente hemípteros, coleópteros, ortópteros, arácnidos y hormigas. Se ha comprobado también la predación ocasional de pequeños lacértidos y el consumo de materia vegetal. Sus depredadores incluyen ofidios, ardeidas, rapaces diurnas y nocturnas y ciertos carnívoros.♂

Distribución:

Región meridional de Europa occidental y norte de África. Ocupa casi toda la península Ibérica, si bien está ausente de la cornisa Cantábrica y Pirineos. En la Comunidad Valenciana se trata de uno de los reptiles de más amplia distribución y más abundantes. Se le puede ver tanto en la costa, a pocos metros del mar, como en los puntos más interiores y montañosos. Ha sido citada en el islote del Descobridor.

Hábitat:

Prefiere terrenos con densa vegetación como zarzales, jarales y coscojares, especialmente áreas con profusión de hojarasca y materia vegetal entre la que se puede refugiar. No obstante, se presenta en una amplia variedad de hábitats siempre que presenten cierta cobertura, desde cordones dunares de vegetación semifija o fija, donde puede convivir con otras especies de lacértidos como las lagartijas colirroja y cenicienta, hasta herbazales y bosques de ribera y monte mediterráneo. Es también buena trepadora y con frecuencia se observa encaramada a la vegetación arbustiva.

Situación actual:

Es la lagartija más abundante de la mitad sur de la península Ibérica y se considera de forma general como una especie no amenazada. Sin embargo, sus poblaciones se han visto seriamente reducidas como consecuencia de la extensión de los monocultivos cerealistas, la masiva desforestación y los incendios forestales. Estos efectos parecen especialmente importantes en los límites septentrionales de su área de distribución.

Acciones de conservación:

Ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Psammodromus edwarsianus**
Nombre valenciano: Sargantana cendrosa
Nombre castellano: Lagartija cenicienta

Autor Especie: **Fitzinger, 1826**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: José Larrosa

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Lagartija pequeña y de aspecto grácil (hasta 50 mm de longitud cabeza-cuerpo). Escamas dorsales imbricadas y fuertemente aquilladas. En una misma población puede existir un fenotipo liso, sin diseño, de color ocre grisáceo junto a una forma que presenta cuatro líneas longitudinales de color claro sobre las que se intercalan pequeñas manchas más claras. Los machos en celo presentan sendas líneas laterales de intenso color verde.♂♂Se trata de una especie de difícil localización, es muy rápida y se esconde a la menor señal de alarma. Las poblaciones de la zona costera pueden presentar actividad todo el año, interrumpiendo su actividad en las horas más calurosas del día durante el verano, mientras que las del interior pueden permanecer inactivas durante el invierno. El celo y el periodo de puesta se presentan en primavera. La hembra deposita entre dos y seis huevos, pudiendo existir dos puestas anuales. Su longevidad apenas supera los tres años.♂♂Su dieta se basa en pequeños artrópodos que captura activamente, especialmente hormigas, chinches de campo y arañas.♂

Distribución:

Presente en el sureste mediterráneo de Francia y norte de África. En la península Ibérica falta en toda la franja eurosiberiana que incluye la cordillera pirenaica, prepirineo y la cantábrica. Falta, asimismo, en casi toda Galicia, buena parte del norte de Portugal y la submeseta norte, así como de la zona norte del sistema Ibérico. En la Comunidad Valenciana está presente la subespecie oriental, Psammodromus hispanicus edwardsianus, si bien los límites de su distribución están aún por precisar claramente.

Hábitat:

Es una lagartija propia de hábitats subáridos de sustrato suelto y escasa cobertura. Prefiere zonas despejadas, con amplias áreas sin vegetación; así, mientras que en la costa ocupa el cordón dunar junto con Acanthodactylus erythrurus, en el interior vive en tomillares y terrenos baldíos con escasa cobertura vegetal.

Situación actual:

Sus poblaciones presentan, en general, bajas densidades. No obstante, se considera una especie no amenazada que mantiene buenos efectivos en la franja costera y valles cálidos del interior. La situación de las poblaciones costeras puede verse amenazada por la ocupación urbanística.

Amenazas:

Transformaciones agrarias y extensión de monocultivos. Desaparición del hábitat y expansión de áreas urbanizadas en el litoral.

Acciones de conservación:

Ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1981 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Ptyonoprogne rupestris**
Nombre valenciano: Roquer
Nombre castellano: Avión roquero

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

L 14 cm, P 20-22 g. Insectívoro aéreo pequeño y robusto, con alas curvadas y cola muy poco ahorquillada. Las partes superiores son de color pardo oscuro y las inferiores de color pardo claro, sin barra pectoral. Presenta unos ápices subterminales blancos en las plumas de la cola.

Distribución:

Especie monotípica de distribución circunmediterránea y asiática. En España aparece ampliamente distribuido por los diferentes sistemas montañosos de la península, incluyendo los de la isla de Mallorca. Está ausente en las principales planicies del interior, de los valles fluviales y del litoral bajo. No nidifica en Canarias. Durante los meses invernales se desplaza hacia localidades más meridionales y de menor altitud, resultando común en aquellas regiones con invierno más suave.

Hábitat:

Ocupa terrenos abruptos, tanto del interior como de la costa, desde cantiles de alta montaña hasta acantilados marinos. Nidifica formando pequeñas colonias laxas, en zonas protegidas de cantiles, pero también en puentes y otras grandes construcciones aisladas, así como en algunas ciudades. Construye una media taza de barro adosada a una pared. En invierno frecuenta zonas bajas abiertas, marismas, humedales e incluso ciudades.

Situación actual:

Nidifica en las comarcas montañosas de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, estando más extendido en la provincia de Castellón. Aparece de forma más discontinua por las comarcas interiores de la provincia de Valencia y por las del norte de la provincia de Alicante. En general, ocupa tanto los relieves de las estribaciones ibéricas como las de orientación bética, hasta alcanzar los acantilados marinos alicantinos. Ocupa algo más del 60 % de las cuadrículas UTM, una cantidad muy similar a las ocupadas en los años ochenta. Fuera del periodo reproductor aparece en las comarcas más litorales, formando grandes bandos laxos, frecuentando relieves y edificaciones litorales.

Amenazas:

Parece sufrir pocas afecciones, ya que sus localidades de cría se localizan en zonas de montaña, sin embargo, durante los meses invernales frecuenta zonas bajas, agrícolas y urbanas, donde puede entrar en contacto con contaminantes. Sus colonias pueden sufrir molestias por montañismo y escalada, particularmente en época de cría, por la presencia prolongada de escaladores o por la destrucción accidental de nidos.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Pyrrhocorax pyrrhocorax**
Nombre valenciano: Gralla de bec roig
Nombre castellano: Chova piquirroja

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: J.J. Rico

Descripción y biología:

L 40 cm, P 280-360 g. Pájaro de tamaño medio-grande y color completamente negro, con brillos metálicos. En vuelo muestra unas alas anchas y redondeadas. El pico es de color rojo, largo, fino y ligeramente curvado hacia abajo. Las aves juveniles tienen el pico de color amarillento. Emite una voz, "chiah", característica.

Distribución:

En la península Ibérica aparece la subespecie de presencia europea meridional. En España se extiende por los principales sistemas montañosos y por los acantilados marinos del Atlántico, siendo más irregular en la mitad occidental de la península. Está ausente de las Baleares y en Canarias existe una subespecie propia en la isla de La Palma. Tiene una escasa movilidad migratoria, sin embargo desarrolla movimientos fuera del periodo reproductor, preferentemente desde las montañas que ocupa hacia los llanos próximos

Hábitat:

Durante el periodo de cría ocupa ambientes rupícolas de montaña, alcanzando elevaciones altas. Frecuenta cantiles, paredes, cárcavas, y diversos tipo de terrenos abruptos, incluyendo acantilados marinos. Fuera del periodo reproductor se extiende por otros terrenos más llanos y abiertos, ocupando pastizales, paisajes agrícolas y otros terrenos en cotas bajas. Evita formaciones forestales densas. Nidifica en oquedades de paredes de roca, en cantiles e incluso en castillos.

Situación actual:

Nidifica en terrenos abruptos del interior de las provincias de Castellón y Valencia, así como en las comarcas montañosas de La Safor y del norte de la provincia de Alicante, en las sierras de Salinas, Mariola, Aitana, Bernia, El Montgó, entre otras. En la época de cría ocupa en torno al 37 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una presencia similar a la registrada en los años ochenta. Fuera del periodo reproductor puede ser visto en los terrenos del pie de monte próximos a sus localidades de cría, cuando aparece en bandos ocasionalmente numerosos, incluso cerca de la costa.

Amenazas:

La especie se ve desplazada por alteraciones o molestias en las paredes donde instala sus colonias (escalada, apertura de pistas, montañismo, canteras, etc). Cuando ocupa castillos y otras ruinas puede verse afectada tanto por caída de los edificios como por trabajos de restauración que evitan su utilización definitivamente. Debido a su dieta, es sensible al uso de los pesticidas en los terrenos agrícolas que ocupa fuera del periodo reproductor.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Rattus norvegicus**
Nombre valenciano: Rata comuna
Nombre castellano: Rata parda

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· No evaluado

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Es el mayor de los roedores presente en la Comunitat, con una longitud de cabeza y cuerpo que puede alcanzar los 25 centímetros, con cola algo más corta y peso entre 200 y 400 gramos, aunque puede superar el medio kilo. De color variable, los jóvenes tienen un pelaje grisáceo que se torna parduzco con la edad. Se diferencia de la rata campestre (Rattus rattus) por su mayor tamaño, y cola y orejas proporcionalmente más cortas Como el resto de múridos, tiene una alta capacidad reproductiva, con gestación rápida (21-25 días), grandes camadas (hasta 16 crías), corto periodo de lactancia (menos de un mes) y camadas continuas durante todo el año en caso de disponer de alimento suficiente. La esperanza de vida en libertad rara vez supera el año. Tiene una alimentación omnívora. En entornos urbanos se alimenta de basuras y desperdicios, mientras que en medios agrícolas lo hace de frutos, cereales, invertebrados,

huevos, pollos, pequeños vertebrados y carroñas. Respecto a sus predadores, dado su gran tamaño es escasa su presencia en la dieta de la lechuza común (Vericad et al., 1976; Martín y Vericad, 1977), pero puede ser frecuente en la de otras rapaces nocturnas más grandes, como la lechuza campestre (Jiménez et al., 1989).

Distribución:

De origen asiático, penetra en Europa a principios del siglo XVIII y se extiende por todo el mundo, siempre favorecida por la actividad humana. En España está presente en toda la península e islas. En la Comunitat Valenciana llega en el siglo XIX (Boscá, 1916) y se extiende por todo el territorio, aunque en el interior sólo aparece en el entorno de viviendas o zonas alteradas por la actividad humana.

Hábitat:

Se comporta como una especie comensal, muy ligada a viviendas, zonas urbanas y vertederos. Aparece también en zonas de cultivos y tiene querencia por las zonas húmedas (Faus, 1990a; Faus, 1992), siendo buena nadadora. Es también buena cavadora, construyendo madrigueras subterráneas. Vive en grupos familiares y tiene actividad fundamentalmente nocturna, aunque no es raro verlas activas de día.

Situación actual:

Especie de amplia distribución y localmente abundante.

Amenazas:

Ninguna específica en la Comunitat. Es una especie considerada como plaga cuando está presente en la vecindad de viviendas y en cultivos agrícolas, siendo objeto de campañas de control (Faus, 1992). En zonas húmedas desplaza a la rata de agua (Arvicola sapidus) (Faus, 1990a).

Acciones de conservación:

Ninguna específica. Puede depredar sobre aves coloniales que crían en el suelo, por lo que puntualmente puede ser objeto de campañas de control.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2016

Autor ficha: Juan Jiménez Pérez
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Rhinechis scalaris**
Nombre valenciano: Serp blanca
Nombre castellano: Culebra de escalera

Autor Especie: **(Schinz, 1822)**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Víctor Ciscar

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Culebra relativamente grande, que puede superar los 150 cm. Cabeza bien diferenciada de hocico apuntado merced a su escama rostral prominente. Presenta sendas bandas oscuras entre la parte posterior del ojo y la comisura de la boca. Color dorsal ocre o pardo sobre el que destacan dos líneas oscuras longitudinales y paralelas que van desde la parte posterior de la cabeza hasta el final de la cola, donde convergen. Las hembras mantienen durante más tiempo el diseño típico de juveniles y subadultos, que da nombre a la especie: dos líneas longitudinales oscuras que se encuentran conectadas por bandas transversales, como los peldaños de una escalera.♂♂Presenta actividad tanto diurna como nocturna. Es un ofidio agresivo, rápido y ágil, capaz de trepar y nadar. Las cópulas tienen lugar entre abril y junio, y la hembra deposita entre 4 y 24 huevos en julio. Los nacimientos se producen entre agosto y octubre. Se alimenta sobre todo de pequeños mamíferos, aves (frecuentemente preda sobre nidos de paseriformes) y saurios. Son, a su vez, presa de rapaces, ciertos carnívoros y otras culebras. ♂

Distribución:

Península Ibérica (excepto la comisa cantábrica) y Menorca (introducida), sudeste de Francia y región de Liguria en Italia. Está presente en toda la CV, aunque se carecen de datos en algunas zonas.

Hábitat:

Ofidio típicamente mediterráneo, selecciona activamente enclaves secos y cálidos adecuados a su termofilia, si bien también puede alcanzar zonas de elevada altitud. Presente en tomillares, áreas de matorral, pinares, bosques mixtos, bordes de marjal y cultivos. Prefiere áreas soleadas y secas y con escaso estrato arbustivo. Aunque aparece bastante bien distribuida, no parece localmente abundante conviviendo a veces con Malpolon monspessulanus con la que puede entrar en competencia al ocupar un nicho ecológico similar.

Situación actual:

Se trata de una de las culebras más ampliamente distribuidas y abundantes en la Comunidad Valenciana. No parece presentar problemas de conservación.

Amenazas:

Como en otros ofidios de amplia valencia ecológica, la principal amenaza la constituye la degradación y transformación de su hábitat, la intensificación de la agricultura y la consiguiente reducción en la disponibilidad de presas. Como las culebras de herradura y bastarda, es víctima frecuente de atropellos.

Acciones de conservación:

Ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.
Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Rhinolophus ferrumequinum**
Nombre valenciano: Rata penada de ferradura gran
Nombre castellano: Murciélago grande de herradura

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Hábitats
· Anexo II
· Anexo IV

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Es el representante más grande del género en Europa (longitud cabeza-cola 57-71 mm). Las poblaciones europeas pertenecen a la forma nominal, que alcanza el noroeste de África y Asia menor (Mitchell-Jones et al., 1999; Simmons, 2005; Dietz et al., 2009). Murciélago grande, aspecto que, junto con unos repliegues cutáneos nasales característicos,

lo diferencia de sus congéneres. Los adultos tienen las partes superiores y patagio marrones o pardas, y las partes inferiores blanquecino-grisáceas o blanco-amarillentas. Los jóvenes son grisáceos hasta los dos años de edad. En reposo, normalmente se envuelve por completo con la membrana alar, a diferencia de lo que ocurre con los murciélagos de herradura mediterráneo y mediano, que se cubren parcialmente. (Ibáñez, 1998; de Paz, 2007). Biometrías Dietz et al., 2009: · Antebrazo: 46,2-62,4 mm. · Peso: 14,6-31,6 g. Comunitat Valenciana (datos propios): · Antebrazo adultos: machos 54,8 [46,2-57,1] mm (n=24); hembras 55,8 [52,6-57,9] mm (n=32). · Peso adultos (machos y hembras no gestantes): machos: 18,2 [14,7-24,0] g (n=24); hembras 20,2 [14,5-24,6] g (n=32). Sus emisiones ultrasónicas se inician y terminan con breves componentes de frecuencia modulada. La componente principal es una frecuencia constante cuya máxima energía se encuentra entre 79 y 81 kHz. Duración de los pulsos: (20) 30-50 (66) milisegundos. Estas vocalizaciones no se solapan con las del resto de representantes del género en la península, por lo que resulta fácilmente identificable con un detector heterodino (Russo y Jones, 2002; Obrist et al., 2004; de Paz, 2007). Especie típicamente cavernícola. En realidad, utiliza un amplio espectro de refugios (cuevas, minas, bodegas, túneles, casas abandonadas), siempre que estos reúnan condiciones adecuadas de temperatura y humedad. De los más de 100 refugios conocidos en la Comunitat Valenciana, el 75 % corresponden a lugares de naturaleza hipogea (sobretodo cavidades, una mina y un túnel abandonados). El resto son edificaciones de distinta naturaleza. Se conocen varios refugios de cría de la especie. Los más importantes corresponden a dos cavidades situadas en el norte de la provincia de Valencia y noroeste de Alicante, respectivamente. Estas dos cuevas concentran 150 y 200 hembras reproductoras. El resto de colonias de crianza agrupan desde unos pocos individuos hasta varias decenas. Los refugios de cría son ocupados por las hembras a partir de mayo (Dietz et al., 2007). Los partos tienen lugar entre finales de mayo y mediados de julio. Dan a luz una cría por parto, y los neonatos vuelan en 3-4 semanas (Ibáñez, 1998; Dietz et al., 2007). Los apareamientos tienen lugar principalmente en otoño, cuando se forman harenes de 1-8 hembras por macho (Ibáñez, 1998; Dietz et al., 2007). Los refugios de hibernación se sitúan en lugares frescos (5-12 °C) y con humedad próxima a la saturación. En la Comunitat Valenciana, el periodo de hibernación abarca desde mediados de octubre hasta mediados de marzo, variable en función de la climatología y del alimento. Una cavidad en Castellón y dos cavidades en la provincia de Valencia albergan en invierno números superiores a los 100 ejemplares. El resto de localidades de hibernación incluyen desde agrupaciones de unos 70 individuos, hasta individuos aislados. Se considera una especie sedentaria.

Distribución:

El murciélago grande de herradura es una especie paleártica, que ocupa de manera continua el sur de esta región. Aparece en todo el entorno de influencia mediterránea de Europa y en el norte de África, alcanzando por el norte el sur de Gran Bretaña. Por el este alcanza Japón, a lo largo de una estrecha franja que incluye Oriente próximo, China, norte de India y Corea (Mitchell-Jones et al., 1999; Quetglas, 2007; Dietz et al., 2009). Se extiende por la práctica totalidad de la Península Ibérica e Islas Baleares, destacando su ausencia en las mayores elevaciones y en extensas áreas de Aragón y Castilla-La Mancha (de Paz, 2007). Se encuentra a lo largo de casi todo el territorio valenciano. Dadas sus preferencias de hábitat y de refugio, que incluyen áreas humanizadas con presencia de edificios, su distribución debe ser más amplia que la representada en la cartografía. La presencia de la especie podría encontrarse limitada en el sur de Alicante por una menor disponibilidad de áreas de forrajeo adecuadas y de refugios.

Hábitat:

Siempre que disponga de refugio, ocupa una gran variedad de ambientes provistos de una mínima cobertura arbustiva o arbórea (Ibáñez, 1998; de Paz, 2007). Las colonias de crianza suelen situarse por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que los machos e individuos no reproductores pueden aparecer a alturas mayores. (Ibáñez, 1998; de Paz, 2007; Dietz et al., 2009). Las áreas de campeo incluyen masas arboladas, setos, riberas, pastizales y cultivos herbáceos, por lo que manifiesta un alto grado de asociación a los ambientes humanizados. Pueden efectuar desplazamientos de una distancia media de entre 2 y 5 kilómetros hasta sus cazaderos (Dietz et al., 2009). Suelen utilizar varios cazaderos en la misma noche. En sus desplazamientos hacia los cazaderos o entre los diferentes refugios, utilizan como referencia estructuras lineales como valles, setos o líneas de arbolado, evitando en general las áreas abiertas (Dietz et al., 2009).

Situación actual:

La amplia representación del murciélago grande de herradura en la Comunitat Valenciana no se corresponde con densidades elevadas. Únicamente se conocen dos colonias de reproducción que concentran números importantes, una cavidad en la sierra Calderona y otra en la sierra de Salinas con 150 y 200 ejemplares, respectivamente. Además, se han encontrado otras dos colonias de crianza en edificios abandonados, compuestas por varias decenas de hembras. Un 71 % de las observaciones (n=277) corresponden a agrupaciones de menos de 20 individuos, lo que sugiere bajas densidades relativas de la especie a lo largo del territorio. Unas pocas concentraciones estivales e invernales reúnen, probablemente, a una parte importante de la población, que ha sido estimada en unos 1.500 individuos (Castelló et al., 2005). Este hecho hace muy vulnerable a la especie ante cualquier evento reductor de sus efectivos.

Amenazas:

En la actualidad, las principales amenazas sobre las poblaciones de esta especie son la pérdida de refugios y de hábitats de caza. La transformación del paisaje, en particular su simplificación estructural, y los cambios de uso del suelo, reducen las áreas de forrajeo de murciélago grande de herradura (de Paz, 2007; Dietz et al., 2009). Las

molestias en las colonias y una reducción de la disponibilidad de refugios artificiales, por perturbaciones o ruina de los mismos, representan un importante factor de rarefacción. Dos de los refugios más importantes para la especie en territorio valenciano sufren visitas frecuentes de excursionistas o espelólogos que no respetan las limitaciones temporales ni los cerramientos. No obstante, las colonias parecen mantener sus números en los últimos años. Las colonias de cría o hibernación aparecen únicamente en lugares con unas condiciones climáticas muy particulares, de manera que su desaparición puede afectar gravemente a la supervivencia de la especie, sobre todo en los periodos críticos En Gran Bretaña y centroeuropa se ha identificado el uso de pesticidas en agricultura y frente a los insectos xilófagos, en los últimos 100 años, como un grave factor de rarefacción. La utilización de insecticidas de amplio espectro ha supuesto la reducción de sus presas, en particular coleópteros y lepidópteros de gran tamaño, mientras que los tratamientos para la protección de la madera, en especial el uso de organoclorados, han afectado a la especie por intoxicación directa (Hutson et al., 2001; Dietz et al., 2009). Las reducciones numéricas de sus poblaciones, originadas por una regresión de las condiciones óptimas para la supervivencia, o a través de eventuales episodios de mortalidad, resultan muy difíciles de recuperar. Al igual que la mayoría de especies de murciélagos, el murciélago grande de herradura manifiesta una baja tasa de renovación poblacional.

Acciones de conservación:

Las actuaciones de conservación han contemplado la protección de varios refugios, aspecto fundamental para el mantenimiento de las poblaciones de murciélago grande de herradura y otras especies de quirópteros cavernícolas. Estos lugares han sido dotados de una protección genérica, e incluidos en catálogos específicos (Ley 11/1994, Decreto 65/2006) y en la Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE). Adicionalmente, se han establecido limitaciones temporales a las visitas, e instalado vallados perimetrales de protección en una cavidad de crianza e hibernación y en otro refugio de invierno. En ambos refugios se han instalado paneles informativos sobre la presencia de quirópteros y las causas de los cerramientos. Dichas acciones fueron impulsadas a través de un proyecto europeo específico de conservación de quirópteros (LIFE-Nature), desarrollado entre 2001 y 2004, y coordinado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. En la actualidad esta Conselleria realiza un seguimiento periódico de los refugios principales de la especie, y el mantenimiento de los vallados y la cartelería. Desde la Conselleria se realiza también una importante tarea de sensibilización, que ha facilitado la colaboración del colectivo de espeleólogos en la difusión de la necesidad de conservar los refugios, y en su control y mantenimiento.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1990 - 2016

Autor ficha: Antonio José Castelló
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Riparia riparia**
Nombre valenciano: Parpalló
Nombre castellano: Avión zapador

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 12 cm, P 12-18 g. Insectívoro aéreo pequeño, con alas curvadas y cola poco ahorquillada. Las partes superiores son de color pardo pálido y las inferiores de color blanco, con una barra pectoral parda transversal característica.

Distribución:

En la península Ibérica se encuentra la subespecie nominal, distribuida por el oeste del continente Eurasiático. Se extiende de manera muy dispersa por España, ocupando las diferentes cuencas fluviales, siendo más abundante en la cuenca del Duero y mucho más irregular en la mitad sur de la península. No nidifica en las islas Baleares ni en las Canarias. Es un migrante transahariano que se desplaza a sus cuarteles invernales africanos tras la reproducción.

Hábitat:

Especie vinculada con vegas y cursos fluviales. También aparece en otros paisajes abiertos con presencia de láminas de agua, evitando localidades elevadas. Instala sus colonias en taludes de materiales aluviales, generalmente junto a cursos fluviales, pero también en graveras. Nidifica en una galería algo profunda, excavada en arenas, limos o arcillas de los taludes donde se instalan las colonias.

Situación actual:

Nidifica localmente en los tramos medios y bajos de las cuencas de algunos ríos de las provincias de Valencia y Alicante, destacando las de los ríos Turia y Xúquer. Es mucho más ocasional en la provincia de Castellón. En ocasiones forma colonias muy pequeñas, aunque se han registrado algunas colonias con varios centenares de parejas. Aparece en torno al 14 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que representa una ocupación similar o ligeramente superior a la de las últimas décadas. Su población total se estimó en 1.000-1.500

parejas nidificantes durante los años ochenta, pero muestra importantes variaciones interanuales. Tras la época de cría tiende a formar concentraciones previas a la migración, en ocasiones con varios miles de individuos. Estas concentraciones pueden tener lugar en localidades donde no nidifica, con presencia de alimento en abundancia, como en las inmediaciones de embalses o de zonas húmedas litorales.

Amenazas:

Las principales amenazas vienen representadas por la vulnerabilidad de sus colonias que se ven destruidas tanto por causas naturales, como por la extracción de áridos o por obras de encauzamiento. Se ve afectado por el uso de plaguicidas agrícolas. Así mismo, la especie ha experimentado importantes declives tras sufrir prolongadas sequías en sus localidades invernales, situadas en el Sahel africano.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. Aparece clasificada como Vulnerable en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 de febrero).Se llevan a cabo censos periodicos realizados por personal dependiente de la Conselleria de territorio y Vivienda.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Saxicola torquatus**
Nombre valenciano: Bitxà comú
Nombre castellano: Tarabilla común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 13 cm, P 14-17 g. Pájaro insectívoro que suele posarse erguido en lugares aventajados (arbustos, tendidos). Tiene las partes superiores pardas, profusamente marcadas de negro, con manchas escapulares blancuzcas. Los machos adultos tienen la cabeza negra, con una mancha blanca en los laterales del cuello y una pechera rojiza. Las hembras y los jóvenes son de color pardusco general, con las partes inferiores más pálidas que el macho. Captura insectos en el aire desde posadero de forma típica.

Distribución:

En la península Ibérica y en Baleares se presenta la subespecie de distribución europea occidental, excepto en Galicia, donde aparece una subespecie presente en la Bretaña francesa y en las islas Británicas. Ausente de las islas Canarias. Se encuentra ampliamente extendida por casi toda España, mostrando discontinuidades en los valles del Ebro y Guadalquivir, La Mancha y el sudeste ibérico. Su población es parcialmente migratoria y durante la invernada se reciben importantes efectivos procedentes de otros países de Europa, resultando muy común en todo el territorio.

Hábitat:

Prefiere espacios abiertos con formaciones herbáceas y arbustivas, páramos, brezales, así como zonas arboladas abiertas, tanto de la costa como del interior. Nidifica entre la vegetación arbustiva densa, en una taza de hierbas. Fuera de la época de cría se hace común en gran variedad de ambientes abiertos.

Situación actual:

Nidificante extendido por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, ocupando prácticamente el 100 % de las cuadrículas UTM, sin embargo, no resulta abundante y puede estar ausente como nidificante en zonas de bosque muy

cerrado o de vegetación excesivamente escasa, así como en las zonas más urbanizadas. Durante los meses de otoño e invierno representa una de las aves más comunes, sin resultar abundante, encontrándose omnipresente en casi todo el territorio.

Amenazas:

No presenta graves amenazas aunq ue, puntualmente, puede verse desplazada por la transformación (puesta en cultivo, urbanización) de los ambientes que ocupa. Es sensible a la intensificación agrícola, particularmente por la desaparición de la cubierta natural vegetal.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Sciurus vulgaris**
Nombre valenciano: Esquirol, farda
Nombre castellano: Ardilla roja

Autor Especie: **Jorge Crespo**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Las ardillas son animales bien conocidos que despiertan la simpatía en el público en genral. Roedores de cuerpo rechoncho y pelaje rojizo en el dorso, destaca sobremanera su larga y tupida cola, especialmente en los ejemplares adultos. Otras características igualmente vistosas son su hocico corto y sus orejas en punta, que pueden presentar "pinceles" durante el periodo invernal. Con la longitud total m¨axima en torno a 25 centímetros, las ardillas adultas pueden llegar a alcanzar los 400 gramos de peso. Se trata de animales diurnos, curiosos, y que no presentan problemas de convivencia juanto al ser humano, siendo frecuente su presencia en zonas ajardinadas de áreas residenciales.

Distribución:

La ardilla roja está presente en las áreas boscosas de la práctica totalidad de Europa. Ampliamente distribuida en la Península Ibérica, ocupa toda España, rarificándose hacia el cuarto suroccidental, pudiéndola encontrar también en el norte de Portugal

Hábitat:

Es el más arborícola de los mamíferos ibéricos. En la región mediterránea, esta especie aparece ligada a los bosques maduros de coníferas, siempre que proporcionen abundante cantidad de piñas que les sirvan de alimento, siendo las del pino carrasco y pino albar las preferidas, por ofrecer más alimento. En la Comunitat Valenciana, los factores que inciden principalmente sobre la abundancia de ardillas son la densidad de pinos grandes, donde encuentran refugio y alimento.

Situación actual:

Se le considera una especie común sin grandes problemas de conservación. La información obtenida a partir de estudios sobre la fauna atropellada llevados a cabo en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana evidencia una ampliación de su área de distribución en los últimos años.

Amenazas:

Las principales amenazas para la especie son la transformación y destrucción de espacios forestales. En este sentido, especialmente dañinos para las poblaciones de ardillas son los incendios, que pueden llegar a causar extinciones locales.

Acciones de conservación:

No existe ninguna medida específica, aunque la declaración de espacios naturales protegidos sin duda ha contribuido a preservar sus poblaciones en la Comunitat Valenciana. La existencia de corredores entre manchas forestales y la recuperación y posterior desarrollo de las areas boscosas más degradadas están entre las medidas más deseables para ésta y otras especies de similares requerimientos

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2017

Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Sterna hirundo**
Nombre valenciano: Xatrac d'albufera
Nombre castellano: Charrán común

Origen: Autóctono
Medio: Ambos

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 35 cm, P 90-150 g. Charrán de tamaño medio-pequeño. Las aves adultas ♂tienen el dorso grisáceo y las partes inferiores blancas, con un capirote ♂negro extendido desde la frente a la nuca, sin cresta. El pico es fino y de ♂color rojo con la punta negra. Las patas son rojas. Los inmaduros carecen ♂del capirote oscuro y presentan unas marcas cremosas en el dorso durante las ♂primeras semanas de vida.♂♂

Distribución:

Especie distribuida por el continente Eurasiático y Norteamérica. En España ♂aparece nidificando localmente a lo largo del litoral Mediterráneo y ♂raramente en algún punto de la meseta. Nidifica escasamente en Baleares y ♂Canarias. Durante la invernada la población europea se desplaza a sus ♂cuarteles invernales en África.♂

Hábitat:

Especie marina y litoral que nidifica en playas e islotes de deltas y ♂saladares, puede ocupar islotes en lagunas y embalses del interior, así como ♂substratos rocosos en cantiles bajos. Nidifica en el suelo, entre vegetación ♂baja poco densa, generalmente en islotes, formando colonias. Se alimenta ♂principalmente en el mar, pero también en otras masas de agua continentales. ♂Durante la migración aparece a lo largo del litoral, preferentemente en ♂tramos de costa baja.♂♂

Situación actual:

La especie nidifica en l'Albufera de Valencia, en las salinas de Santa Pola ♂y en otras localidades del Baix Vinalopó. Actualmente parece recuperada de ♂una grave crisis demográfica sufrida durante la década de los setenta. Ha ♂nidificado tradicionalmente en l'Albufera de Valencia, aunque durante los ♂años setenta desaparece como reproductor, reinstalándose a partir de 1983 y ♂manteniendo una colonia que oscila entre las 100 y 200 parejas durante la ♂década posterior. A partir de 1993, la regeneración del saladar del Racó de ♂l'Olla posibilitó un incremento gradual de sus efectivos en esta localidad ♂hasta alcanzar las 2.434 parejas en 2003. En las salinas de Santa Pola su ♂nidificación se conoce desde 1978, con una colonia inicial formada por muy ♂pocas parejas que ha experimentado un aumento gradual hasta alcanzar las 522 ♂parejas del 2000. También ha nidificado en la laguna de La Mata desde los ♂años ochenta, con una colonia que ha pasado de unas pocas decenas hasta ♂superar las 200 parejas en el año 2000, y más ocasionalmente ha nidificado ♂en la laguna de Torrevieja y en el embalse de La Pedrera, así como en El ♂Hondo. A partir del año 2000 algunas parejas han nidificado en el marjal de ♂El Moro. La especie puede ser vista en migración a lo largo de la costa y ♂las citas plenamente invernales son muy raras.♂

Amenazas:

La concentración de sus efectivos en unas pocas localidades de cría le hacen ♂sensible a la presión ejercida por depredadores, particularmente los ♂introducidos por el hombre, como los perros o las ratas. Pese a ser menos ♂exigente que otros charranes, no tolera molestias en sus colonias de cría, ♂lo que causa una carencia de localidades alternativas de nidificación que ♂limitan el aumento de su población. La pérdida de la calidad del agua, ♂particularmente por contaminación, puede afectarle directamente o a las ♂especies de las que se alimenta. La especie puede verse afectada por la ♂escasez de recursos ante la sobrepesca actual de algunos caladeros.♂

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal y aparece catalogada como Vulnerable en el ♂Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 ♂de febrero). La regeneración de un saladar ha permitido el aumento de sus ♂efectivos en l'Albufera de Valencia y la colonización de El Moro como nueva ♂localidad de cría. Sus colonias se localizan en zonas húmedas protegidas y ♂en el caso de l'Albufera de Valencia, donde se desarrollan prácticas de ♂manejo del hábitat para favorecer su reproducción. Las medidas adoptadas en ♂la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de ♂agua continentales.♂♂

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1983 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Sternula albifrons**
Nombre valenciano: Mongeta
Nombre castellano: Charrancito común

Origen: Autóctono
Medio: Ambos

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable
Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM
· Anexo II

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 24 cm, P 50-65 g. Charrán de pequeño tamaño. Las aves adultas tienen el ♂dorso grisáceo pálido y las partes inferiores blancas, con un capirote negro ♂extendido hasta la nuca, sin cresta y con la frente blanca. El pico es fino ♂y de color amarillo con la punta negra. Las patas son anaranjadas. Los ♂inmaduros carecen del capirote oscuro y presentan unas marcas oscuras en el ♂dorso durante las primeras semanas de vida.♂♂

Distribución:

Especie distribuida por el continente Eurasiático. En España aparece ♂nidificando localmente a lo largo del litoral Mediterráneo, la costa ♂andaluza atlántica, las marismas del Guadalquivir, Extremadura y alguna ♂localidad de La Mancha húmeda. Ausente de Baleares y Canarias. Durante la ♂invernada la población europea se desplaza a sus cuarteles invernales en ♂África.♂

Hábitat:

Especie litoral que nidifica en playas e islotes de deltas y saladares, que ♂puede ocupar islotes en lagunas y embalses del interior, así como substratos ♂rocosos. Nidifica en el suelo, entre vegetación baja poco densa, ♂generalmente en islotes, formando colonias laxas. Se alimenta principalmente ♂en el mar, pero también en otras masas de agua continentales. Durante la ♂migración aparece a lo largo del litoral, preferentemente en tramos de costa ♂baja♂

Situación actual:

Nidificante tradicional en los principales humedales litorales de la ♂Comunidad Valenciana. Se trata del único charrán cuya población está ♂experimentando un declive gradual de efectivos. Su población nidificante ♂total ha sido de unas 400 parejas de promedio desde los años ochenta, sin ♂embargo, ha pasado de máximos superiores a las 500 parejas hasta 1995, a ♂mínimos por debajo de las 300 parejas en los últimos años. Su principal ♂localidad de cría se encuentra en las salinas de Santa Pola, donde mantiene ♂efectivos superiores a las 200 parejas, con una ligera tendencia regresiva. ♂Otras localidades de su entorno, como las lagunas de La Mata y Torrevieja, ♂han albergado efectivos ocasionalmente superiores a las 100 parejas ♂nidificantes. Unas pocas parejas nidifican habitualmente en El Hondo y el ♂embalse de La Pedrera, y más ocasionalmente en el Clot de Galbany, Balsares ♂de Elx, saladares de Aguamarga o la desembocadura del Segura. La segunda ♂localidad en importancia se encuentra en l.Albufera de Valencia, donde la ♂especie ha llegado a contar con 200 parejas, favorecidas por la regeneración ♂de la reserva del Racó de l.Olla en 1993, sin embargo sus efectivos han ♂mostrado una tendencia decreciente acusada, situándose recientemente por ♂debajo de las 100 parejas, muchas de las cuales instalaron sus nidos en el ♂interior del puerto de Valencia, en superficies no utilizadas del espigón ♂Príncipe Felipe. La especie ha nidificado escasamente en el Prat de ♂Cabanes-Torreblanca, pero no lo hace desde 1994. En 1990 dos parejas ♂nidificaron en el delta del Millars. Ha nidificado ocasionalmente en la isla ♂de Nova Tabarca. La especie puede ser vista en migración a lo largo de la ♂costa y las citas plenamente invernales son muy raras.♂

Amenazas:

La especie ha abandonado muchas zonas de playa donde nidificaba por la ♂alteración del paisaje litoral, la destrucción de los sistemas dunares y las ♂molestias ocasionadas por los bañistas. Algunas de sus colonias se ven ♂afectadas por trasiego de personas o perros. Pese a ser el charrán menos ♂exigente, no tolera molestias en sus colonias de cría, lo que causa una ♂carencia de localidades alternativas de nidificación que limitan el aumento ♂de su población. Esto se agrava por el hecho de verse desplazado por otras ♂especies de charranes y gaviota que nidifican en los sitios con las mejores ♂condiciones de conservación. La pérdida de la calidad del agua, ♂particularmente por contaminación, puede afectarle directamente o a las ♂especies de las que se alimenta. La especie puede verse afectada por la ♂escasez de recursos ante la sobrepesca actual de algunos caladeros.♂♂

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal y aparece catalogada como Vulnerable en el ♂Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, de 27 ♂de febrero). La especie se instala en nuevas localidades con facilidad y ♂responde bien a actuaciones de regeneración de ambientes de nidificación, ♂como los realizados en l.Albufera de Valencia, donde ocupa el Racó de l.Olla ♂y la duna de La Punta. Sus colonias se localizan en zonas húmedas protegidas ♂Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la ♂calidad de las masas de agua continentales.♂

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



Mapa de distribución:

Acercar a



Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Strix aluco**
Nombre valenciano: Gamarús
Nombre castellano: Cárabo común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Benjamín Albiach Galán

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 38 cm, P 330-590 g. Rapaz nocturna de tamaño medio y silueta rechoncha, sin las típicas "orejas" de otros búhos. Tiene los ojos de color negro. Su plumaje es jaspeado y puede ser tanto de color grisáceo como pardusco. Emite un ulular trémulo muy lúgubre, entre largas pausas, típico de los bosques que ocupa.

Distribución:

En la península Ibérica nidifica una subespecie distribuida por Europa occidental. Presenta una distribución algo irregular en España, mostrando amplias discontinuidades de presencia en ambas mesetas, en el valle del Ebro y en las

zonas más áridas. Ausente de ambos archipiélagos. Especie eminentemente sedentaria, aunque las aves juveniles pueden desarrollar dispersiones postgenerativas.

Hábitat:

Especie típicamente forestal, prefiriendo masas abiertas, pero puede aparecer en otros ambientes, incluso con carencia de árboles, como en zonas de matorral. También puede ocupar grandes parques de ciudades. Nidifica en cavidades, generalmente de árboles, pero también en edificios rurales.

Situación actual:

Nidifica en las tres provincias, preferentemente en localidades del interior, ocupando poco más del 45 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana. Está más extendido en las comarcas interiores de la provincia de Castellón y parece menos regular en la de Alicante. No se ha cuantificado su población, sin embargo se extiende actualmente por una superficie parecida a la ocupada a finales de los años ochenta, cuando aparecía en un número muy similar de cuadrículas UTM.

Amenazas:

La principal amenaza está representada por la desaparición de las masas forestales que ocupa, por transformaciones, talas o grandes incendios, sin embargo muestra una gran plasticidad de respuesta y puede ocupar hábitats subóptimos alternativos. La desaparición de grandes árboles con huecos limita sus lugares de nidificación.

Acciones de conservación:

La especie goza de protección oficial.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Suncus etruscus**
Nombre valenciano: Musaranya nana
Nombre castellano: Musgaño enano

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna
· Anexo III

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Es el más pequeño de nuestros mamíferos terrestres, y de hecho uno de los menores del mundo. La longitud de cabeza y cuerpo se sitúa alrededor de los 5 centímetros, a los que hay que sumar 2-3 centímetros de cola, pesando entre 1 y 3 gramos. De color grisáceo, se distingue de la musaraña común, aparte de su tamaño considerablemente menor, por tener la cabeza y orejas proporcionalmente mayores. Como el resto de musarañas, tienen un ciclo vital muy acelerado, con gestación rápida (27-30 días), partos entre 2 y 5 crías y rápida maduración sexual. Se alimenta de invertebrados del suelo. Dado su pequeño tamaño para mantener su actividad es muy voraz, hasta el punto de consumir diariamente el doble de su peso.

Distribución:

Se extiende desde el norte de África, a través de Europa meridional hasta Asia central. En la España peninsular está bien repartida, excepto en el cuadrante noroccidental. En la Comunitat Valenciana está bien distribuida, aunque parece más frecuente en la mitad oriental.

Hábitat:

Es una especie con preferencia por ambientes cálidos y con escasa cobertura vegetal, como matorrales y zonas de cultivo, frecuentando para refugiarse muros y acúmulos de piedra. Su distribución en altitud se vería restringida por las temperaturas más frías.

Situación actual:

Es una especie difícil de observar y trampear, a causa de su pequeño tamaño. A juzgar por su reducida presencia en egagrópilas de rapaces nocturnas (Vericad et al., 1976; Martín y Vericad, 1977; Jiménez et al., 1989; Such y Calabuig, 2002), debe ser menos abundante que otros micromamíferos.

Amenazas:

Ninguna específica en la Comunitat.

Acciones de conservación:

Ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2011

Autor ficha: Juan Jiménez Pérez
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Sus scrofa**
Nombre valenciano: Porc senglar
Nombre castellano: Jabalí

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Dado lo conocido y singular del aspecto de esta especie, no cabe señalar aspectos descriptivos para diferenciarlo de otras especies de ungulados. Los jabalíes de la Comunitat Valenciana son generalmente de menor tamaño que en su área de distribución mundial, con hembras que no suelen superar los 50 kilogramos y machos que sólo ocasionalmente superan los 100 kilogramos. La organización social del jabalí gira alrededor de grupos matriarcales formados por una o varias hembras acompañadas de ejemplares juveniles, siendo los machos adultos generalmente solitarios, salvo durante el celo, cuando se unirán al grupo. Las cópulas son habituales en otoño, con partos en invierno y principios de primavera, aunque en condiciones favorables pueden reproducirse en otros periodos del año. Las camadas sueles ser de tres o cuatro crías, aunque pueden ser más numerosas. Si consideramos además que las hembras pueden ser fértiles a partir del año, el jabalí resulta ser el ungulado con mayor capacidad de crecimiento poblacional entre los que

pueblan la Comunitat Valenciana, lo que explica su expansión, como se verá más adelante. En la comarca de la Marina Baixa, Arques et al. (2009) determinan, a partir de encuestas, densidades medias alrededor de 5 ej/km2, con máximos que superan los 20 ej/km2. Es una especie omnívora, componiendo su dieta una mayoría de alimentos de origen vegetal (sobre todo frutos y raíces) complementados por otros de origen animal (invertebrados, pequeños vertebrados, huevos y carroña) y hongos.

Distribución:

El jabalí, especie de la que se origina el cerdo doméstico, se distribuye de forma natural por gran parte de Asia, Europa y norte de África. Desde este origen ha sido introducido en gran parte del continente americano, en Oceanía y en muchas islas. Tiene una distribución amplia en Europa, incluyendo las principales islas del Mediterráneo. En los últimos años ha experimentado una considerable expansión, particularmente hacia el norte, recolonizando territorios donde se extinguió. En España se extiende por toda la península, faltando en las islas. En la Comunitat Valenciana el jabalí se extinguió en el siglo XIX, estando presente quizás sólo de forma ocasional. Vuelve a aparecer en la provincia de Castellón hacia los años 40 del siglo pasado, haciéndolo en la de Valencia hacia los años 60. En Alicante su reaparición es posterior, ya que sólo aparece en las estadísticas cinegéticas en buen número a partir de los años 80. Desde su aparición, no ha parado de extender su distribución hasta cubrir todo el territorio salvo la Vega Baja del Segura.

Hábitat:

Es una especie muy adaptable que puede encontrar recursos en prácticamente cualquier hábitat, desde los forestales, hasta los agrícolas y zonas húmedas. Sometido a presión cinegética requerirá de zonas con abundante vegetación para refugiarse

Situación actual:

Es una especie sometida a una gran presión cinegética, lo que no parece detener su proliferación. En las estadísticas de caza de la Comunitat Valenciana ha pasado de contabilizar entre 1.000 y 2.000 ej/año en los años 70 y 80 a 5.000 a 7.000 en los años 90 y principios de este siglo. Los datos para la temporada 2010/11 superan los 15.000 ejemplares (datos del Servicio de Caza y Pesca).

Amenazas:

Es la especie silvestre que genera mayores daños a los cultivos. En la Marina Baixa, Arques et al. (2009) recogen mediante encuestas que, por orden de magnitud decreciente, se producen en huertas, cultivos de secano, frutales de regadío, viñedo y cereal.

Acciones de conservación:

Su aprovechamiento está regulado por la normativa cinegética, concediéndose frecuentemente permisos de caza fuera de la temporada hábil para evitar daños en los cultivos.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez Pérez
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Sylvia melanocephala**
Nombre valenciano: Busquereta capnegra
Nombre castellano: Curruca cabecinegra

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 13,5 cm, P 10-12 g. Pájaro insectívoro de color grisáceo, más pálido en las partes inferiores. Los machos tienen una capucha negra, fuertemente contrastada con una garganta blanca. Las hembras y los jóvenes tienen la capucha gris oscuro y las partes superiores algo parduscas. Tiene un anillo ocular rojizo.

Distribución:

En la península Ibérica se presenta la subespecie nominal, distribuida por Eurásia. En España ocupa la mitad sur de la península, se extiende hacia el norte por todo el litoral Mediterráneo y se adentra en todo el valle del Ebro, apareciendo muy localmente en la comisa atlántica. Nidifica en ambos archipiélagos. Tiene una escasa movilidad migratoria.

Hábitat:

Ocupa una amplia variedad de ambientes, prefiriendo las formaciones arbóreas y arbustivas densos, pero también ocupa otras formaciones vegetales abiertas, así como áreas agrícolas y parque urbanos en sus áreas de presencia. Nidifica en arbustos densos, en una taza de hierbas.

Situación actual:

Nidifica ampliamente extendida por las tres provincias. Solamente parece mostrarse ausente de ciertas áreas en las comarcas del Rincón de Ademuz, Los Serranos, Plana de Requena-Utiel y del Bajo Vinalopó. Ocupa algo más del 90 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, lo que supone una presencia similar a la obtenida durante los años ochenta. En algunas localidades, particularmente en aquellas con monte bastante antropizado,

representa una de las especies más regulares, aunque no suele resultar abundante. Es relativamente común en jardines de los diferentes núcleos urbanos y de urbanizaciones.

Amenazas:

Se trata de una especie bastante adaptable a los cambios ambientales en sus áreas de presencia. Su proximidad al entorno humano hace que sea sensible al contacto con pesticidas utilizados en agricultura y en jardinería.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1981 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Sylvia undata**
Nombre valenciano: Busquereta cuallarga
Nombre castellano: Curruca rabilarga

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Aves
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: J.J. Rico

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 12,5 cm, P 9-12 g. Pájaro insectívoro pequeño de cola muy larga. Tiene las partes superiores de color gris con tintes marrones y las partes inferiores de color rojo vino, más intenso en los machos y más pálido en las hembras y los jóvenes. Tiene un anillo ocular rojizo.

Distribución:

En el nordeste de la península Ibérica y en Baleares se presenta la subespecie nominal, de distribución europea, mientras que en el noroeste y en el sur peninsular se presentan sendas subespecies. La especie se encuentra extendida por toda la península, mostrando alguna discontinuidad mayor en las regiones con inviernos más rigurosos. Está ausente del archipiélago canario. Tiene una escasa movilidad migratoria, pero realiza desplazamientos hacia las localidades con mayor confort invernal.

Hábitat:

Ocupa una amplia variedad de ambientes, prefiriendo las formaciones arbustivas, tanto de especies vegetales atlánticas como mediterráneas, siendo más abundante en brezales y en jarales. Evita zonas con inviernos rigurosos. Nidifica en arbustos densos, en una taza de hierbas. Durante el periodo invernal puede aparecer en otros ambientes, como en saladares litorales.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Tachybaptus ruficollis**
Nombre valenciano: Escabussonet
Nombre castellano: Zampullín común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 27 cm, P 100-200 g. Somormujo de muy pequeño tamaño, con mejillas y cuello de color castaño en el plumaje nupcial. Pico corto con llamativas comisuras blancas en su base. Las aves no reproductoras son más pálidas. No muestra blanco en las alas durante el vuelo.

Distribución:

La subespecie presente en la Península Ibérica se distribuye por el sudoeste del continente Eurasiático. En España aparece ampliamente distribuido por todo el territorio y resulta una especie común.

Hábitat:

Ocupa masas de aguas dulces, preferentemente con presencia de vegetación subacuática. Ocupa incluso humedales pequeños o de encharcamiento temporal. También aparece en los cursos fluviales, particularmente en los tramos de corriente más lenta, así como en embalses, canales y balsas de riego, incluso en las de menor entidad.

Situación actual:

Nidifica en el 12 % de las cuadrículas UTM del territorio y se estima una población reproductora que puede alcanzar las 500 parejas, aunque este valor puede estar infravalorado debido a su dispersión y a la difícil valoración de sus efectivos. Presente en casi todos los humedales del litoral de las tres provincias, tanto en los grandes como en los de pequeña extensión. Es menos común en los de aguas más salinas, así como en el interior. Aunque la estima es algo imprecisa, la población invernante se sitúa en torno a los 1.000 ejemplares.

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales supone la principal amenaza. La pérdida de la calidad del agua, particularmente por contaminación, puede afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta. Durante la época de nidificación, la desecación artificial o los cambios en los niveles de inundación, particularmente en las masas de agua utilizadas para la agricultura, puede causar la pérdida de nidos o polladas

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. Su población en la Comunidad Valenciana es objeto de seguimiento por la Generalitat Valenciana. La protección y conservación de los humedales y de los cursos fluviales garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Tadarida teniotis**
Nombre valenciano: Rata penada de cua llarga
Nombre castellano: Murciélago rabudo

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Directiva de Hábitats
· Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Las poblaciones valencianas pertenecen a la subespecie T. t. teniotis. Se trata del murciélago de mayor envergadura que podemos encontrar en la Comunitat Valenciana. Es un quiróptero de alas alargadas de vuelo rápido y potente, que acostumbra a elevar el vuelo mucho más que el resto de las especies, a menudo varios cientos de metros por encima del suelo, para buscar los insectos de los que se alimenta. Los sonidos de ecolocalización son emitidos en campo abierto. Son sonidos de frecuencia casi constante con máxima amplitud a 10-15 kHz, en el umbral audible por los humanos. Cuando hay varios ejemplares cazando en el mismo lugar emplean dos bandas de frecuencias diferenciadas supuestamente para reducir las interferencias entre ellos: una con máxima amplitud entre 9 y 11 kHz y otra entre 13 y 15 kHz. Las bajas frecuencias que utiliza esta especie es una adaptación a la caza en campo abierto (las hondas llegan más lejos) y a las especies de polillas que suelen cazar (usan frecuencias por debajo de límite detectable por sus órganos auditivos) (Rydell y Arlettaz, 1994). El ejemplar más longevo conocido tenía 13 años (Ibáñez y Perez-Jordá, 1998). Las hembras son maduras sexualmente a partir del primer año y tienen una sola cría al año. Los nacimientos ocurren principalmente entre finales de junio y principios de julio (Balmori, 2001), aunque también pueden darse en agosto. En las colonias se pueden encontrar hembras lactantes hasta octubre. Se refugia normalmente en grietas y huecos de roquedos y acantilados. Habitualmente utiliza grietas inaccesibles en paredes verticales de cortados rocosos y barrancos. También ocupa grietas en grandes puentes y en fachadas de edificios altos. Ocasionalmente en huecos de árboles altos y aislados (Dietz et al., 2009). Normalmente las colonias de cría están formadas por sólo hembras, que forman grupos de entre 5 y 50 ejemplares, a veces hasta 400 (Ibáñez y Pérez-Jordá, 2004). Normalmente se disponen dentro del refugio separados entre sí, no formando agrupaciones de ejemplares como ocurre con otras especies. Son fieles a los mismos refugios todos los años. Fuera de la época de crianza se juntan con los machos. Las cópulas se dan en otoño y a principios de la primavera, en abril. No se conoce bien el desarrollo embrionario, no se sabe si tiene lugar fertilización o implantación retardada. El celo se produce en pequeños grupos de 1 macho y entre 1 y 15 hembras. Los machos cantan en esta época de forma característica al atardecer y tienen comportamientos agresivos con otros machos. Las hembras abandonan los harenes en avanzado estado de gestación

para acudir a los refugios de cría. Los machos se quedan solitarios en los refugios de los harenes a partir de julio. Entre agosto y octubre vuelven las hembras para volver a formar los harenes (Balmori, 2001). En invierno no se aletargan como ocurre con el resto de las especies europeas, aunque se han descrito pequeños periodos de aletargamiento de incluso más de una semana. Se les puede observar volando con temperaturas muy bajas. Los ejemplares salen todas las noches a cazar volando alto y muy veloces en espacios abiertos, entre 10 y 300 metros sobre el nivel del suelo. A veces ascienden a gran altura describiendo amplios círculos con fuerte batido de alas. Recorren normalmente menos de 20 kilómetros hasta las zonas de caza.

Distribución:

En Europa la especie ocupa las regiones que rodean el Mediterráneo (Dietz et al., 2009). Se desconoce el número o la densidad de la especie en el territorio de la Comunitat Valenciana. Es una especie relativamente abundante y presente en todo el territorio, y prácticamente todo tipo de hábitats, siempre que existan cortados o edificios (Monsalve et al., 2003).

Hábitat:

En áreas mediterráneas se puede encontrar a cualquier altura, desde el nivel del mar hasta por encima de los 2.000 metros. Normalmente está asociado a grandes cortados o acantilados marinos donde tiene sus refugios de cría y descanso. Caza habitualmente por encima de los bosques o cultivos de porte arbóreo (Rainho et al., 2002), aunque también lo hace por encima de ambientes lacustres y ribereños, y sobre otros cultivos. En zonas de clima desértico está asociado a cursos de agua y oasis. Normalmente se alimenta en estas zonas aunque a veces también lo hace dentro de las ciudades alrededor de grandes farolas aisladas que atraen a los insectos o de los edificios altos donde se refugia.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana no se dispone de ninguna información sobre la magnitud ni sobre el estado de las poblaciones. Tampoco hay indicadores de las tendencias de las poblaciones. Se supone bastante abundante al menos allí donde existen suficientes refugios, en áreas con abundantes barrancos y cortados y en las grandes ciudades.

Amenazas:

No se conoce bien como puede afectarles los procesos que eliminan sus presas, los insectos, en grandes cantidades, como el uso de fitosanitarios o los incendios forestales.

Acciones de conservación:

Actualmente no se realiza ninguna acción dirigida a la conservación de esta especie

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1990 - 2016

Autor ficha: Miguel Angel Monsalve Dolz
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Tadorna tadorna**
Nombre valenciano: Ánec blanc, tadorna
Nombre castellano: Tarro blanco

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Casi amenazada

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Convenio de Bonn
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE



Autor Foto: Carlos Pache

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 61 cm, P 1.100-1.450 g. Anátida nadadora de gran porte, de coloración general blanca, con capuchón verdoso oscuro, dos bandas negruzcas longitudinales en el dorso y una banda pectoral de color castaño. El pico es rojo, con una protuberancia nasal muy prominente en los machos adultos. Los ejemplares inmaduros tienen un plumaje más tenue. Presentan blanco y negro en las alas durante el vuelo.

Distribución:

Especie distribuida por el oeste y sur del continente eurasiático. Muy localizada en España, donde ocupa los principales humedales salobres en el litoral Mediterráneo, como el delta del Ebro y los saladares de Alicante, Murcia e islas Baleares, y algunas localidades de la Mancha húmeda y de las marismas del Guadalquivir. Algo más repartida durante la invernada, apareciendo incluso en algunos ambientes litorales, como estuarios y rías.

Hábitat:

Prefiere humedales costeros, estuarios y otros ambientes de aguas saladas. En invernada puede aparecer también en otras láminas de agua, como los arrozales inundados. Nidifica en ambientes dunares y en saladares, generalmente lejos del agua, ocupando madrigueras de conejo.

Situación actual:

Nidifica con regularidad y en muy bajo número en los saladares alicantinos, al menos desde los años 80. Parece haber experimentado un gradual aumento de efectivos nidificantes que en la actualidad oscilan entre las 10-50 parejas, según los años, principalmente distribuidas entre las salinas de Santa Pola y las lagunas de Torrevieja y La Mata. En los últimos años ha nidificado ocasionalmente en el Clot de Galbany, las salinas de Calpe y en l.Albufera de Valencia. Durante la invernada se reciben efectivos foráneos y aparece algo más disperso. Se viene registrando

una media superior a los 300 ejemplares invernantes, superando los 800 ejemplares en los mejores años, concentrados en las principales localidades donde cría.

Amenazas:

El deterioro o desaparición de los humedales supone la principal amenaza. La pérdida de la calidad de la vegetación en los saladares perimetrales a las lagunas que ocupa limita su reproducción. Al nidificar lejos del agua, es sensible a depredadores terrestres asociados con la antropización, como los perros, y a las barreras artificiales, como los canales de drenaje o las carreteras. Se han registrado ejemplares abatidos por caza ilegal con cierta regularidad y aparece afectado por plumbismo. La contaminación de los medios acuáticos puede afectarle directamente o a las especies de las que se alimenta.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal. La protección y conservación de los humedales que ocupa y de su entorno, garantiza la pervivencia de sus poblaciones. Las actuaciones de recuperación del saladar del Racó de l.Olla en l.Albufera de Valencia y del Clot de Galbany en Elx ha permitido su nidificación en estas nuevas localidades. Las medidas adoptadas en la depuración y el uso racional del agua mejoran la calidad de las masas de agua continentales.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1999 - 2016

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Timon lepidus**
Nombre valenciano: Fardatxo
Nombre castellano: Lagarto ocelado

Autor Especie: **(Daudin, 1802)**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Es el mayor de nuestros saurios (hasta 260 mm de longitud cabeza-cuerpo). Cabeza voluminosa, especialmente en machos, y aspecto robusto y cola muy larga. Coloración dorsal verde con tonalidades amarillentas y un abigarrado jaspeado negro, a veces formando círculos negros sobre el fondo verde. En los costados aparecen conspicuos ocelos de color azul alineados en varias filas. También existen morfotipos de tonalidad uniforme ocre grisácea o parda (la forma nevadensis presenta tonos más apagados y menos contrastados, con ausencia de escamas de color negro). Los juveniles presentan un característico diseño en el que, sobre fondo ocre o verdoso, aparecen ocelos amarillentos rodeados de un borde oscuro y dispuestos en series transversales.♂♂Su periodo anual de actividad es variable en las distintas zonas climáticas, extendiéndose generalmente de marzo a octubre. Durante el verano su actividad diaria es bimodal, pudiendo presentar actividad crepuscular. El celo tiene lugar en primavera (incluso antes en las zonas más cálidas) y los machos presentan un comportamiento territorial. Las hembras excavan una oquedad al amparo de grandes piedras o matorrales en la que depositan entre 5 y 22 de contorno subcilíndrico y color blanco. Pueden realizar dos puestas y los recién nacidos aparecen hacia el final del verano, tras un periodo de incubación de dos a tres meses y medio.♂♂Su dieta, aunque de amplio espectro, se basa fundamentalmente en invertebrados y consume principalmente insectos, gasterópodos y arácnidos. También pueden cazar diversos reptiles, anfibios, micromamíferos y consumir huevos y pollos de aves, además de frutos y materia vegetal más ocasionalmente. A su vez es presa de numerosas especies de aves, particularmente rapaces, mamíferos y algunos ofidios.♂

Distribución:

Francia meridional, noroeste de Italia y en la práctica totalidad de la península Ibérica y diversos islotes costeros, tanto atlánticos como mediterráneos. En la CV ocupa las tres provincias y está también presente en las islas de l'Olla y Mitjana.♂ (Alicante). Existen dos subespecies cuyas áreas de distribución se solapan en la Comunidad Valenciana; L. l. lepida ocuparía la mitad noroccidental de la Comunidad, mientras L. l. nevadensis habita el sector suroriental. Ambas llegan a coexistir en la franja central de contacto.♂

Hábitat:

Puede aparecer en una amplia variedad de ambientes, desde islotes y zonas costeras hasta sierras interiores, tanto en áreas de escasa cobertura como en matorral mediterráneo, pinares y zonas agroforestales y rurales e incluso

periurbanas. No obstante, prefiere áreas soleadas adecuadas a su termofilia con presencia de rocas y grandes piedras y vegetación aclarada.

Situación actual:

Aunque su distribución es muy amplia y puede vivir en áreas urbanas, se ha observado un declive generalizado de sus poblaciones; en muchas áreas ha dejado de ser abundante y en otras ha desaparecido.

Amenazas:

Transformación de hábitats naturales, intensificación de la agricultura, incendios forestales, captura y persecución directa, atropellos.

Acciones de conservación:

No se ha realizado ninguna específica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez; Ignacio Lacomba; Vicente Sancho; Pilar Risueño. 2002. Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. 271 pp.

Año ficha: 2002

[imprimir]

Nombre científico: **Triturus pygmaeus**
Nombre valenciano: Tritó pigmeu
Nombre castellano: Tritón pigmeo

Autor Especie: **(Wolterstoff, 1905)**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

Urodelo de mediano que alcanza los 120 mm de longitud total; los machos son menores que las hembras. Poseen un color verdoso con manchas irregulares más oscuras, incluso negras, con una línea vertebral anaranjada en las hembras y jóvenes. En los machos esta línea alterna colores claros y oscuros y en época de cría se desarrolla formado una cresta dorsal muy patente. El período reproductor se inicia en otoño, cuando los machos desarrollan un elaborado cortejo. La hembra recoge el espermatóforo y deposita hasta 350 huevos que deposita en las plantas acuáticas, proceso que puede durar hasta 3 meses; tras 15 días se verifica la eclosión y las larvas requieren de al menos 3 meses de desarrollo hasta completar la metamorfosis. En el agua, los adultos se alimentan de huevos y larvas de anfibios, insectos y crustáceos, mientras las larvas comen zooplancton

Distribución:

Endemismo ibérico, se limita al centro y sur de Portugal y mitad meridional de España. La población más oriental se sitúa en la Laguna de los Ojos de Villaverde (Albacete), a unos 150 km de Crevillent.

Hábitat:

T. pygmaeus se reproduce en charcas y lagunas de carácter temporal o permanente, balsas, cunetas o tramos fluviales de clima preferentemente mesomediterráneo, en zonas de alcornocal, encinares o quejigares. Alcanza los 1.450 msnm en el Sistema Central.

Situación actual:

En la Comunidad Valenciana solo se conoce una población, introducida, en el t.m. de Crevillent. Esta población es fruto de una introducción a partir de ejemplares procedentes de Malagón (Ciudad Real), sobre el año 2003. Se ha extendido por algunas pequeñas pozas aisladas a lo largo de un barranco. En un muestreo realizado en 2013 se localizaron 15 adultos y multitud de larvas.

Amenazas:

Se ve especialmente afectado por las especies exóticas (cangrejo y carpas) introducidas en sus charcas de reproducción. La transformación de sus hábitats y el abandono de los usos tradicionales lo ha hecho desaparecer de grandes áreas, sobre todo en su distribución más oriental.

Acciones de conservación:

Se trata de una población establecida y reproductora que ha mostrado su viabilidad después de 10 años. Puede considerarse como una "Introducción Benigna" en el sentido de la UICN (1998), que las define como "un intento para establecer una especie, con el propósito de conservación, fuera de su área de distribución registrada pero dentro de un hábitat y área ecogeográfica apropiada". Su presencia no parece revestir un problema para la conservación de la biodiversidad por lo que no se considera necesario llevar a cabo ninguna labor de control o erradicación. Además, la precaria situación de las poblaciones más orientales de la especie aconseja su conservación y seguimiento.

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 2013 - 2015

Autor ficha: Vicente Sancho
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Tudorella sulcata**

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas
· Anexo I - Vulnerable

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Concha sólida, ovoidea-cónica y un poco ventruda, formada por 4_-5 vueltas de espira con suturas profundas y cuya superficie presenta una ornamentación reticular. Coloración desde amarilla hasta anaranjada. Ombligo abierto y pequeño. Opérculo grueso, calcáreo, con núcleo lateral, que se introduce notablemente en el interior de la abertura. Animal con cuerpo de color blanquecino con manchas grisáceas en la cabeza y a ambos lados del pie. Especie con sexos separados y dimorfismo sexual muy acusado, siendo las hembras de mayores dimensiones que los machos. Las dimensiones máximas de la concha de las hembras son 23,23 mm de altura y 16,40 mm de diámetro, mientras que en los machos 19,9 mm de altura y 14,65 mm de diámetro. Vive entre la pinocha y debajo de piedras, en colonias generalmente. Según Ibáñez y Alonso (1978) vive debajo del Chamaerops humilis (margalló) de la que se alimenta.

Distribución:

Se trata de una especie de distribución mediterránea occidental: SE de Francia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta y El Maghreb. En Portugal se conoce de la localidad de Portimao, en El Algarve. En España se conoce de Granada, en la localidad el Tajo de Escalante (Motril) y, en Alicante, de Pilar de la Horadada (Paraje Natural Río Seco) y Orihuela (barranco de La Cañada de la Estaca y los primeros barrancos al N y al S del barranco de la Estaca), en la comarca de la Vega Baja.

Hábitat:

Especie asociada a suelos calcáreos y pedregosos ligados a pinares y matorral mediterráneo, en áreas cercanas a la costa y a una altitud que no supera los 100 m.

Situación actual:

Se han encontrado cuatro poblaciones vivas muy próximas en un área muy localizada de la provincia de Alicante. Todas ellas se encuentran en el término de Orihuela, en el barranco de la Cañada de la Estaca y en los barrancos al N y al S del mismo, y en el paraje natural del río Seco, y están siendo fuertemente urbanizadas, lo que ha provocado la

destrucción su hábitat. Actualmente podemos considerar que, excepto los pocos ejemplares que quedan en la microreserva vegetal del Paraje la Estaca y los traslocados a una nueva localidad próxima, esta especie ha desaparecido de la zona.

Amenazas:

La presión urbanística sobre estas localidades, que ha puesto en claro riesgo de desaparición de la Comunidad Valenciana a esta especie, así como los incendios.

Acciones de conservación:

Protección de su hábitat y de las poblaciones. Alguna de estas poblaciones se conserva en una microreserva vegetal en el Barranco de la Estaca. Recientemente se han traslocado ejemplares para su conservación a otra localidad cercana y protegida por la Generalitat Valenciana.

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1993 - 2016

Autor ficha: Alberto Martínez
Año ficha: 2004

Nombre científico: **Turdus merula**
Nombre valenciano: Merla
Nombre castellano: Mirlo común

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo III
Directiva de Aves
· Anexo II.2

Descripción y biología:

L 25 cm, P 80-110 g. Pájaro insectívoro de porte medio y aspecto muy conocido. Los machos adultos son de color completamente negro uniforme, con el pico y el anillo ocular amarillos. Las hembras y los jóvenes son de color pardo oscuro, con el pico amarillento. Suele andar a saltos por el suelo, pero también se posa en lugares aventajados de árboles, abriendo su larga cola. Emite voces estridentes de alarma.

Distribución:

En la península Ibérica y Baleares se presenta la subespecie de distribución europea occidental. Se encuentra ampliamente extendida por España, ocupando prácticamente todo el territorio peninsular y las islas Baleares. En las islas Canarias más occidentales nidifica una subespecie endémica. Su población es parcialmente migratoria y durante la invernada se reciben efectivos procedentes de otros países de Europa

Hábitat:

Ocupa una amplia gama de ambientes, prefiriendo los bosques densos y otras formaciones arboladas abiertas, en general con sotobosque bien desarrollado. En zonas más áridas y deforestadas, aparece vinculado con setos fluviales y con regadíos. Utiliza jardines de ciudades con gran regularidad. Nidifica entre la vegetación arbustiva densa, en una taza de hierbas.

Situación actual:

Nidificante extendido por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, ocupando prácticamente el 100 % de las cuadrículas UTM. Puede resultar muy común, incluso en las zonas antropizadas donde existen cultivos de regadío, siendo común en el naranjal, y en los núcleos urbanos con parques y jardines.

Amenazas:

Es sensible al uso de pesticidas en la agricultura, jardinería y de salud pública (tratamientos de plagas urbanas). Puede verse afectado por la caza ilegal.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Upupa epops**
Nombre valenciano: Puput, palput
Nombre castellano: Abubilla

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo II
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Autor Foto: Luis Fidel

Ver más imágenes

Descripción y biología:

L 28 cm, P 55-80 g. Ave de aspecto curioso, con el cuerpo de color rosa salmón y una espectacular cresta en la cabeza que se despliega en abanico, con apéndices negros en sus plumas. Las alas son anchas y redondeadas, de color negro con anchas bandas blancas. La cola en larga y negra, con una amplia banda blanca. Pico largo y muy fino. Emite una voz trisilábica típica, "pú-pú-pú", audible a gran distancia.

Distribución:

Especie distribuida por el continente Eurasiático y el norte de África. En España se encuentra ampliamente extendida por casi toda la península, siendo más irregular en los Pirineos, la cornisa Cantábrica y Galicia. Presente en ambos archipiélagos. La mayor parte de su población es migratoria estival, sin embargo existe una presencia invernal limitada a la mitad meridional de la península.

Hábitat:

Ocupa una gran variedad de ambientes abiertos, evitando las zonas boscosas cerradas y las montañas más elevadas. Ocupa paisajes rurales y otros ambientes antropizados, generalmente vinculados con la presencia de ganadería. Tiene mucha actividad terrestre y come habitualmente en el suelo. Nidifica en cavidades de árboles y edificaciones rurales, entre otras.

Situación actual:

Nidifica ampliamente distribuido por las tres provincias, ocupando cerca del 100 % de las cuadrículas UTM del territorio de la Comunidad Valenciana, siendo una especie muy común, pero poco abundante. Evita los cascos urbanos de las principales ciudades, pero puede nidificar en su perímetro y en grandes parques. Presente también durante los meses

invernales, particularmente en las localidades de climatología más confortable, siendo algo menos común durante este periodo.

Amenazas:

La transformación del paisaje conlleva, en ocasiones, la desaparición de sus lugares de cría, como árboles con cavidades o edificios viejos, limitando así su reproducción. La intensificación agrícola y el uso elevado de pesticidas (tanto en agricultura como en jardinería) puede afectarle directamente o reducir las presas de las que se alimenta.

Acciones de conservación:

La especie tiene protección legal.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2017

Autor ficha: Ignacio Dies Jambrino
Año ficha: 2004

[imprimir]

Nombre científico: **Vulpes vulpes**
Nombre valenciano: Rabosa
Nombre castellano: Zorro rojo

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Preocupación menor

Ver más imágenes

Descripción y biología:

El zorro es un cánido bien conocido y fácil de identificar, en buena medida por ser personaje común en cuentos y en el imaginario popular. Se caracteriza por su larga y poblada cola, rostro enmarcado por grandes orejas y afilado hocico y peso entre 3 y 8 kilogramos, siendo mayores los machos. Su organización social es plástica, con ejemplares solitarios, otros emparejados, o formando pequeños grupos familiares. Entra en celo en invierno, produciéndose los partos en primavera con camadas entre una y siete crías, que se dispersarán del núcleo familiar a partir de finales de verano y que pueden reproducirse a partir del año de edad. Su actividad es esencialmente nocturna, aunque puede verse a la luz del día tras el amanecer o antes del ocaso. Se trata de un carnívoro oportunista, que aprovecha distintas fuentes de alimentación según su abundancia en cada lugar y época del año. En la provincia de Valencia, Urios (1990) determinó que la aparición más frecuente en estómagos y excrementos era materia vegetal (48,8 %), seguida de aves (26,3 %), invertebrados (17,0 %), micromamíferos (13,4 %) y carroña (12,3 %). En el entorno de poblaciones humanas la basura puede ser parte importante de su dieta

Distribución:

La distribución original del zorro abarca desde el norte de África, cubriendo la práctica totalidad de Europa, Asia y Norteamérica, exceptuando las regiones árticas. En España está presente en toda la península, estando ausente en las islas. En la Comunitat Valenciana está presente en todo el territorio, siendo de hecho uno de nuestros mamíferos más comunes y de mayor distribución territorial

Hábitat:

El zorro puede aparecer y encontrar recursos prácticamente en todos los ambientes, tanto naturales como modificados por la actividad humana, en zonas costeras y en montañas, en terrenos áridos o en zonas húmedas y bosques. Es frecuente en zonas agrícolas y penetra en núcleos urbanos en busca de comida (basuras).

Situación actual:

Dada su alta capacidad reproductiva y gran adaptabilidad, el zorro es una especie abundante en toda la Comunitat y probablemente en aumento. Esta situación se produce a pesar de la intensa persecución de la que es objeto para controlar su densidad, fundamentalmente por motivos cinegéticos. A partir del análisis de autorizaciones de control y

resultado de las capturas, Urios (1990) estimó que en la provincia de Valencia se mataban en los años 70 y 80 del pasado siglo entre 1.000 y 3.000 zorros al año. Según la estadística cinegética, en toda la Comunitat se cazaron más de 14.000 zorros en la temporada 2010-2011 (datos del Servicio de Caza y Pesca).

Amenazas:

El zorro es perseguido por su predación sobre especies cinegéticas, aunque éstas sólo son importantes en su dieta cuando son muy abundantes. También genera preocupación su condición de reservorio de enfermedades transmisibles al hombre o animales domésticos, particularmente a los perros, como la rabia (no en el caso de la Comunitat Valenciana), leishmania, moquillo, sarna y diversas parasitosis.

Acciones de conservación:

Como ya se ha indicado es una especie sometida a control, regulado por su condición de especie cinegética.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1983 - 2017

Autor ficha: Juan Jiménez Pérez
Año ficha: 2013

ANEJO Nº3.2.2 FICHAS DE ESPECIES DE FLORA CON FIGURA DE PROTECCIÓN

Nombre científico: **Acacia cyclops**

Autor Especie: **A. Cunn. ex G. Don fil.**

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA Arbusto o arbolito de 2-4 m de altura, a menudo muy ramoso, con copa redondeada. Las ramitas son angulosas y de color castaño-verdoso cuando son jóvenes y posteriormente se vuelven oscuras y redondeadas. Las hojas son alargados, rectas o algo curvadas, correosas y de color verde amarillento. Las flores tienen cinco pétalos de color amarillo. El fruto es una legumbre que madura en verano y que permanece en el árbol, de modo que expone las semillas a los agentes dispersores. Las semillas son la parte más llamativa del árbol, ya que están rodeadas por un funículo carnoso de color naranja vivo.

Hábitat:

Acacia cyclops es una especie originaria del sudoeste de Australia, donde crece en habitats dunares costeros.

Situación actual:

Acacia cyclops se comporta como invasora en hábitats dunares de la provincia de Alicante, donde ya se ha constatado su reproducción sexual en el LIC Dunas de Guardamar. Esta especie incide negativamente en la recuperación de las dunas con enebro marino (Juniperus macrocarpa), uno de los hábitats más escasos y amenazados de nuestro territorio y uno de los hábitats prioritario de la Directiva 92/43/CEE.

Amenazas:

A. cyclops es una las especies más agresivas en otras áreas de clima mediterráneo del mundo, como Sudáfrica, donde constituye un gravísimo problema ecológico. Sus semillas ¿ que conservan la viabilidad en el suelo durante muchos años - son dispersadas activamente por aves, las cuales las trasladan a formaciones vegetales nativas. Una vez establecida es muy dificil de erradicar. Se trata de una especie que elimina eficazmente a la vegetación nativa por competencia. En Sudáfrica, se ha puesto en marcha campañas de lucha biológica contra la especie, mediante el empleo de una roya - el hongo Uromycladium -.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1997 - 2014

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Acacia farnesiana**

Nombre castellano: Mimosa

Autor Especie: **(L.) Willd.**

Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
· Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA Arbolito o arbusto muy ramificado desde la base que alcanza 3-5 m de altura. Tronco de corteza oscura y ramaje tortuoso en zig-zag. Follaje semicaduco en ocasiones. Hojas bipinnadas, linear-oblongas, verdes, con dos espinas blancas y rectas de 2-3 cm de longitud en la base de las mismas. Flores en glomérulos dispuestos en grupos de 2-6 cabezuelas, de color amarillo dorado, fragantes, de 1-1.5 cm de diámetro. Florece de Enero a Mayo. Legumbre indehiscente, de color negruzco, de unos 5-9 cm de longitud. Cada fruto con 8-15 semillas insertas en una pulpa blanca.

Distribución:

Es una especie invasora en Fiji, la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Islas Salomon y Asutralia. Se ha naturalizado en España, Francia, Italia y Sicilia. En los países en los que se comporta como invasora crece en formaciones espinosas impenetrables de hasta 4m de altura. Es dispersada por los herbívoros, que consumen ávidamente las nutritivas legumbres.

Hábitat:

Probablemente originaria de América tropical. Ha sido introducida en numerosos países tropicales para aprovechar su corteza, resina o madera, como especie ornamental o para controlar la erosión. Prefiere hábitats secos y temperaturas cálidas y suelos arenosos o limosos. Crece desde el nivel del mar hasta los 1000 m.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana se comporta de manera invasora en las montañas semiáridas de Callosa i Orihuela ¿ ambos lugares de interés comunitario ¿ y afecta a hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE, como son los matorrales con Ziziphus, donde reemplaza a especies autóctonas muy raras y perfectamente adaptadas a la aridez, como Periploca angustifolia, Maytenus senegalensis subsp. europaea ¿ especie vulnerable - o el rabo de gato Sideritis glauca (una de las diez especies prioritarias de la Directiva Hábitats presentes en la Comunitat Valenciana).

Amenazas:

La especie afecta a sistemas naturales valiosos en la Comunitat Valenciana, si bien todavía de manera localizada. No obstante hay que tener en cuenta el carácter invasor de la especie en otras regiones de clima mediterráneo del mundo, así como su capacidad para desarrollarse en suelos pobres y su elevada capacidad productora de semillas, las cuales germinan rápidamente tras una perturbación edáfica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1950 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Acacia retinodes**

Nombre castellano: Acacia verde

Autor Especie: **Schlecht.**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Descripción y biología:

Pequeño árbol o arbusto grande de 4-6 m de altura de copa densa. Ramas angulosas de color castaño rojizo, desprovistas de pelos. Hojas (filodios) estrechamente elípticos, planos, de 3-20 cm x 3-15 mm, rectos o curvados, con el ápice agudo o mucronado, de color verde azulado o a veces glaucos, glabros. Nervio central destacado, los restantes poco aparentes. Pulvínulo de 2-3 mm de longitud. Glándula cerca de la base, poco prominente. Flores reunidas en inflorescencias con 6-15 cabecillas globosas de color amarillo pálido. Florece prácticamente durante todo el año, aunque de manera más profusa en primavera y otoño. El fruto es una legumbre linear, de 3-15 cm x 6-8 mm, recta. Semillas de forma oval invertida, de 4-6 mm de largo, de color negro o marrón oscuro brillante, dispuestas longitudinalmente.

Distribución:

Especie originaria del sur de Australia (Victoria y Tasmania).

Hábitat:

En sus regiones de origen crece en claros de bosque, en territorios de interior, sobre suelos encharcados o con drenaje deficiente.

Situación actual:

Especie que aparece de manera esporádica en la Comunitat Valenciana. No existen registros de invasiones biológicas para esta Acacia, por lo que es poco probable que en territorio valenciano llegue a comportarse como una invasora agresiva.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1987 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Acacia saligna**

Autor Especie: **(Labill.) H.L. Wendl.**

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
- Anex I
- Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA Acacia saligna es un árbol pequeño de entre 4-7m, denso, de copa amplia densa y colgante y tronco corto con corteza grisácea. Llega a alcanzar los 8 m de altura. Como muchas especies Acacia, tiene filodios de hasta 25 cm de largo de color verde-azulado en lugar de hojas verdaderas. En la base de cada uno de los filodios se sitúa una glándula nectaria, que secreta un fluido azucarado del cual se alimentan las hormigas, que a su vez proporcionan protección a la planta. Las flores amarillas aparecen al final del invierno y principios de la primavera, en glomérulos esféricos. Es un colonizador por excelencia: crecimiento muy rápido en la fase juvenil, abundante y temprana producción de semillas, sistema radicular extenso. Crece muy bien en suelo removido, como puede ser los bordes de nuevas carreteras. Sus semillas las distribuyen las hormigas y germinan rápidamente cuando se produce una aleración del sustrato. La planta rebrota vigorosamente, incluso si es cortada a ras de suelo.

Distribución:

Acacia saligna es una especie originaria del oeste de Australia. Ha sido plantada abundantemente en África, es un pequeño árbol de la familia de las Fabaceae. Acacia saligna ha sido plantada extensamente en áreas semiáridas de África, Oriente Medio y la cuenca mediterránea. En la Comunitat Valenciana ha sido extensamente utilizada para revegetar los taludes de vias de comunicación importantes

Hábitat:

Se trata de una especie muy rústica, capaz de crecer en pendientes secas sobre todo tipo de sustratos y con precipitaciones escasas. No tolera las heladas pero si las temperaturas frías. Crece de modo óptimo sobre suelos arenosos, en situaciones soleadas y con precipitaciones en el rango de los 400 mm anuales.Tolera los vientos marinos.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana puede verse naturalizada en los barrancos que lindan con la AP7, donde fue abuntamente plantada o lo largo de sus márgenes.

Amenazas:

Acacia saligna es un seria invasora en regiones del mundo con clima mediterráneo, como por ejemplo en Sudáfrica donde compite eficazmente con la vegetación nativa y altera el régimen de incendios, provocando graves modificaciones de la dinámica de la vegetación natural. En la Comunitat Valenciana ocupa de momento hábitats degradados en las proximidades de vías de comunicación.

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1989 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2009

[imprimir]

Nombre científico: **Achillea santolinoides**

Autor Especie: **Lag.**

Libros Rojos

Lista roja de Flora Vascular
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Hierba perenne hasta de 60 cm, ± pubescente, de color grisáceo, densamente foliosa. Raíz vertical, articulada. Tallos tomentosos, blanquecinos. Hojas sésiles, pinnatipartidas o pinnatisectas, con los lóbulos ± redondeados, tomentosas y blanquecinas. Inflorescencia en capítulo; capítulos hasta de 8 mm, agrupados en un pseudocorimbo; brácteas normalmente tomentosas con los márgenes escariosos. Flores de color amarillo. Fruto en aquenio con costillas fuertemente marcadas. Florece de mayo a julio. Más información sobre conservación de germoplasma y cultivo en: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=82491&idioma=C

Distribución:

Elemento iberonorteafricano confinado a los suelos yesíferos del SE ibérico y del norte de Marruecos. La subespecie wilhelmsii (K. Koch) Greuter muestra una distribución mucho más amplia, que se extiende desde Asia Central hasta el NW de África. En la Península Ibérica, la subespecie tipo se encuentra escasamente localizada en diversos puntos del SE ibérico, incluida la Comunitat Valenciana, donde aparece de forma puntual en los sectores Alicantino-Murciano y Setabense (subsector Cofrentino-Villenense).

Hábitat:

Matorrales y herbazales sobre suelos de margas o yesos en territorios de ombrótipo semiárido, siempre en poblaciones reducidas que suelen mostrar preferencia por lugares nitrificados con cierta perturbación e influencia antrópica. Gypsophiletalia. TM-MM, SA. 500-900 m.

Situación actual:

Descrita a principios del siglo XIX en Orihuela por M. Lagasca y citada por primera vez en 1870, por M. Willkomm y J. Lange, y posteriormente por A. Rigual, hasta principios de los años 70, en diversas localidades alicantinas: Alicante, Santa Pola, Elx, Villena, Orihuela y Sant Vicent del Raspeig. Estas poblaciones carecen de información actualizada

que permita confirmar su permanencia. Sólo se tiene constancia de su existencia en dos localidades del NW de la provincia, en Villena y en Pinoso, sin disponer de datos demográficos detallados, aunque se ha estimado la población total en más de 5000 ejemplares.

Amenazas:

El escaso número de poblaciones que se conocen en nuestro territorio y los riesgos que afectan de forma generalizada a las comunidades vegetales que colonizan las estepas sobre yesos, constituyen las principales amenazas sobre éste y otros gipsófitos con los que convive. El escaso atractivo paisajístico de estos hábitats, debido a su aspecto desértico e improductivo, los ha llevado a ser objeto de un sobrepastoreo excesivo con consecuencias nefastas sobre la vegetación, o han sufrido transformaciones agrarias a gran escala en tierras de regadío. En los casos más graves, han sido destinados a albergar vertederos y minas dedicadas a la extracción de yesos y áridos, que han sido las causantes de la desa - parición del hábitat de esta especie en San Vicent del Raspeig y sus alrededores.

Acciones de conservación:

Se conservan semillas en el Banco de Germoplasma del CIEF que, junto con investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, han establecido los protocolos de germinación. Se ha iniciado el seguimiento exhaustivo de las poblaciones, disponiéndose de la cartografía detallada de las áreas de ocupación y de los primeros censos. Disfruta de medidas indirectas de protección por ser una especie asociada a comunidades gipsícolas, que aparecen explícitamente designadas como hábitat prioritario en el anexo I de la Directiva Europea (Código Natura 2000: 1520*), requiriendo la designación de Zonas de Especial Conservación, como las establecidas en el LIC Sierra de Salinas. También goza de las medidas que derivan de su calificación como Habitat Protegido, figura establecida por la legislación valenciana.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1816 - 2017

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Agave americana**
Nombre valenciano: Pitera
Nombre castellano: Agave

Autor Especie: **L.**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
· Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA. Planta robusta originaria del este de Méjico, de color gris azulado en forma de roseta sin tallo, de un diámetro que puede alcanzar los 2-3m. Las hojas, rígidas y suculentas, miden entre 1 y 2m y entre 15 y 30cm de ancho. El número de hojas por planta depende de su la edad del especimen concreto y oscila entre 20 y 60. Florece en pleno verano una única vez durante su ciclo vital, momento en el que produce una inflorescencia elevada de hasta 8m con unas 25-30 ramificaciones. Las flores son de color amarillo pálido y son polinizadas por insectos ¿ lepidópteros- y también por murciélagos. Después de florecer a los 10 o 20 años, la planta madre muere. La planta se reproduce activamente por vía asexual a partir de los rizomas de los que brotan abundantes rosetas. Precisa suelos bien drenados y exposiciones soleadas para desarrollarse vigorosamente. Es muy resistente a la sequía y a las temperaturas elevadas. Aguanta heladas ligeras si éstas no son muy frecuentes

Distribución:

Se trata de una especie originaria del este de Méjico. Actualmente se encuentra ampliamente naturalizada por todas las provincias litorales mediterráneas y suratlánticas, desde Gerona hasta Huelva y también en los dos archipiélagos. Su tendencia poblacional es expansiva.

Hábitat:

En la Comunidad Valenciana aparece en terrenos matorrales degradados, márgenes de vías de comunicación de zonas costeras de baja altitud. También es muy abundante en acantilados y las dunas litorales donde claramente se comporta como una especie invasora que excluye a la vegetación autóctona por competencia por el espacio. Es muy poco abundante en hábitats forestales

Situación actual:

En la Comunidad Valenciana es una de las especie exóticas con mayor grado de ocupación, ya que se encuentra presente en un total de 125 cuadrículas. En la provincia de Castellón, el 61,2% de las cuadrículas poseen poblaciones de Agave americana, la segunda especie alóctona mejor distribuida tras Robinia pseudacacia. La razón para esta distribución tan extendida se explica por su uso ornamental generalizado, su elevada adaptabilidad a ambientes áridos y por su reproducción vegetativa por estolones, que supone la rápida colonización de todo tipo de ambientes costeros, desde acantilados medios y bajos hasta arenales (Chritmo-Limonion, Ammophilion, Crucianelletum maritimae) En 2003, la cartografía de la especie en la franja litoral de la Comunidad Valenciana aporta los siguientes resultados: un total de 83,28 Ha se encuentran afectadas; de éstas, 22,70 Ha pueden considerarse ocupadas, lo que supone el 27,26% del total afectado. La provincia que más resulta afectada por la invasión por Agave es Alicante, que posee el 69,57% del total valenciano en medio litoral.

Amenazas:

Es una especie cuyo comportamiento invasor está claramente demostrado en diversas regiones del mundo, desde el sur de Estados Unidos a las islas del Pacífico, Australia (Queensland), Sudáfrica y la cuenca mediterránea (desde Portugal hasta Asia menor, incluidas las principales islas). En la Comunidad Valenciana son especialmente graves las invasiones de los ecosistemas dunares y acantilados, donde compiten eficazmente por el espacio con la vegetación nativa.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1936 - 2017

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2006

[imprimir]

Nombre científico: **Agave sisalana**

Nombre castellano: Sisal o Henequen

Autor Especie: **Perr. ex Engel.**

Origen: Exótico

Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Descripción y biología:

Planta suculenta perenne con hojas gruesas linear lanceoladas de hasta 2 m de altura y 10-12 de anchura, de color verde azulado, agrupadas en un roseta basal. Flores de color amarillo verdoso reunidas en inflorescencias en forma de panícula de 5-6 m de altura. Los frutos son cápsulas, si bien rara vez se forman y las semillas, si se producen, no suelen ser viables. En su lugar, se desarrollan pequeñas plantas en la base de las flores (planta vivípara), las cuales se desprenden y enraízan para dar lugar a nuevas plantas Se trata de una especie que muere después de florecer.

Distribución:

A. sisalana es nativa de México. Ha sido introducida en áreas tropicales y subtropicales de Norteamérica, las islas del Caribe, Africa, Australia, Asia, Sudáfrica y España. Es empleada como planta ornamental y de cultivo, especialmente en Brasil, Tanzania, Uganda y Kenya, para la producción de fibras vegetales.

Hábitat:

El hábitat original de A. sisalana no se conoce con precisión, pues es una especie cultivada desde tiempos precolombinos. Se trata de una planta capaz de crecer en una gran diversidad de medios, por lo que a menudo escapa de los jardines o áreas donde se cultiva para colonizar el medio adyacente.

Situación actual:

Es frecuente verla a lo largo de áreas perturbadas, cunetas, y todo tipo de ecosistemas secos, lo que sugiere un potencial para ocupar áreas mucho más amplias de las que ocupa en la actualidad. De hecho su capacidad para formar grupos de plantas mono-específicos que compiten con la vegetación nativa es indicativa de sus habilidades como planta invasora. A pesar de lo anterior, es una especie que solo aparece de manera puntual en la Comunitat Valenciana.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 2006 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro

Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Aloe arborescens**

Nombre castellano: Aloe candelabro, planta pulpo

Autor Especie: **Mill.**

Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA Arbusto muy ramificado de hasta 3 metros de altura y hojas de hasta 60cm, de color verde grisáceo en el haz y verde claro en el envés, con dientes curvados en el contorno. Inflorescencia no ramificada de hasta 80 cm de longitud, que sobresale por encima de las hojas. Flores de unos 4 cm, de color rojo anaranjado, con manchas verdes. Una de las características que permiten diferenciar esta planta del resto de aloes son sus hojas contorneadas hacia abajo

Distribución:

Especie originaria de Sudáfrica

Hábitat:

En la Comunitat Valenciana es una especie utilizada de manera muy frecuente en jardinería, por lo que habitualmente se observa como una especie subespontánea en medios ruderales y soleados, o en lugares de vertido de restos de poda de jardines y obras, donde se naturaliza a partir de jardines. En la Marina Alta crece en comunidades de Pegano-Salsoletea.

Situación actual:

Se comporta como una especie litoral. Sin embargo, esta distribución sesgada hacia la franja litoral puede explicarse por una mayor superficie de zonas ajardinadas que actúan como vector de introducción.

Amenazas:

Esta especie puede potencialmente llegar a formar grandes masas de elevada densidad y porte, momento en el cual su erradicación puede llegar a ser muy problemática.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1984 - 2014

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Ammochloa palaestina** Autor Especie: **Boiss.**

Libros Rojos

Lista roja de Flora Vascular
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Hierba cespitosa de pequeño tamaño (2-5 cm), anual, verde, con hojas (4-15cm x 1,5-4mm)que superan la inflorescencia, planas yescabras, provista de lígula membranosa, lacerada, de1-2mm.Tronco de 0,2-8cm.Inflorescencia (1-1,5 cm)en panícula subglobulosa, densa, formada por un glomérulo de (1)2-8(10) espículas (0,7-1,3cm) sésiles o subsésiles, comprimidas lateralmente, con 8-14(18) flores; glumas (2-5 mm)subiguales, ovadas, uninerviadas, con margen escarioso; lemas(4-5, 5 mm)anchamente ovadas, mucromadas, escabras, de y 5 nervios. Florece entre febrero y marzo.

Distribución:

Gramínea de distribución mediterránea meridional y sahariana, cuya área alcanza su extremo oriental en la Península Arábiga e Irán. Muy escasa en la Península Ibérica, se conoce en unas pocas localidades próximas al litoral del

cuadrante sudoriental: Almería, Murcia y las tres provincias valencianas, donde aparece de forma bastante puntual, incluso en arenales interiores de la provincia de Alicante

Hábitat:

Arenales litorales e interiores y diversas comunidadesruderales con suelos arenosos, preferentemente en área de clima árido o semiárido.

Situación actual:

Presente en localidades dispersas por el litoral de las tres provincias valencianas, aunque también está presente en los arenales interiores de Villena.En Castellón queda restringida a los arenales de Almenara y Moncofa; en Valencia, a las dunas de Canet d¿En Berenguer, del Saler y Oliva. En Alicante, se ha confirmado su presencia en arenales de Dènia, en la Dehesa de Campoamor (Orihuela)y en los arenales interiores de Villena. Las poblaciones muestran notables fluctuaciones interanuales, habitualmentecon tamaños poblacionales bastante reducidos, aunque ocasionalmente se han observado explosiones demográficas que se aproximan al millar de ejemplares, como la detectada en la playa de Almenara (Castellón) en 2011. No obstante, en los años posteriores no se han observado ejemplares en la zona. El censo realizado en 2010 en Les Marines (Dènia, Alicante) no alcanzó la cincuentena de ejemplares.

Amenazas:

Las poblaciones del litoral alicantino, con un número reducido de ejemplares y amenazadas por la construcción de viviendas e infraestructuras, la nitrificación del medio, etc.,han visto reducido el número de plantasconocidas. No obstante, la separación entre los dos núcleos conocidos y la presencia de hábitat favorable entre ambos, sugiere la posibilidad de encontrar nuevos núcleos poblacionales en un futuro. Las poblaciones del sur de Castellón se ven amenazadas por la regresión de la línea de costa, especialmente activa en el tramo litoral donde se localiza la conocida en la playa sur de Moncofa.

Acciones de conservación:

Se dispone de censos y cartografía de precisión de algunos núcleos poblacionales, concretamente de la Playa de Almenara, donde se censaros 900 ejemplares en 2011, y de los arenales costeros de Les Marines (Dènia, Alicante), con sólo 33 ejemplares en 2010. Diversas poblaciones se localizan en Espacios Naturales Protegidos: P.N. l¿Albufera de Valencia, LIC ¿La Marjal d¿Almenara¿. Además, las poblaciones del sur de Castellón cuantan con la protección adicional de la figura Microrreserva de Flora, con poblaciones estables en la MRF ¿Platjad¿Almenara¿ y ¿Platja de Moncofa¿.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1945 - 2017

Autor ficha: Simón Fos
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Ammoides pusilla**

Autor Especie: **(Brot.) Breistr.**

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Descripción y biología:

Hierba anual grácil con raíz axonomorfa y tallos erectos (5-70 cm), estriados, glabros, ramificados y glaucos. Hojas basales (1,5-6,5 x 0,3-1 cm) 2-pinnatisectas, oblongas, con 7-12 pared de segmentos opuestos, los medianos divididos en 3-5 segmentos denticulados y los superiores, en 2-3 divisiones filiformes. Hojas caulinares más pequeñas, 1-2-pinnatisectas, con 3-5 segmentos. Inflorescencia en umbela compuesta con 5-15 radios desiguales, muy delgados, provistas de 5 bracteolas desiguales, dimorfas: 3 lineares o filiformes y 2 espatuladas e hinchadas en el ápice. Flores con pétalos blancos, emarginados a lobulados, con el pétalo marginal exterior más desarrollado. Frutos anchamente ovoides, comprimido lateralmente, con merispermos provistos de 5 costillas cilíndricas y prominentes. Florece entre abril y junio.

Distribución:

Se extiende por las zonas bajas de la Región Mediterránea, incluyendo el centro y el sur de la Península Ibérica. En la Comunitat Valenciana, resulta bastante escasa en la zona meridional del territorio.

Hábitat:

Forma parte de pastizales anuales en ambientes semiáridos ligeramente pedregosos, taludes, bordes de caminos, etc., sobre sustratos básicos.

Situación actual:

Presente en diversas poblaciones de las Sierras de Orihuela y de Callosa y en las inmediaciones del Cap de Santa Pola(Alicante). Recientemente, ha sido encontrado en el P.N. del Carrascar de la Font Roja (Ibi, Alicante).

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1975 - 2009

Autor ficha: Simón Fos
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Anarrhinum fruticosum**
Nombre valenciano: Anarrí fruticós
Nombre castellano: Anarrino fruticoso

Autor Especie: **Desf.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro crítico
Lista roja de Flora Vascular
· En peligro crítico

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Descripción y biología:

Arbusto pequeño (hasta 90 cm) perenne, muy ramificado, con tallos delgados, erectos, lignificados en la zona basal, herbáceos y simples en la superior y densamente cubiertos por hojas (foliosos) en toda su longitud. Las hojas son simples, alternas y sésiles, las basales espatuladas y levemente carnosas, las caulinares enteras o raramente dentadas, de lineares a linear-lanceoladas y aplicadas sobre el tallo. Las flores son hermafroditas, pequeñas (2,5-3,5 mm), blancas, con 2 labios marcadamente distintos y sin espolón, reunidas inflorescencias situadas en el extremo de los tallos. Éstas corresponden a racimos simples y laxos con numerosas flores cortamente pediceladas. Fruto en cápsula bilocular y polisperma, de forma globosa a elipsoidal, glabra, con dehiscencia foraminal. Semillas densamente

tuberculadas de color marrón oscuro. Los ejemplares adultos florecen anualmente de mayo a julio y producen abundantes semillas que llegan a germinar de forma abundante, aunque la gran mayoría de las plántulas muere durante las primeras semanas de vida.

Distribución:

Elemento mediterráneo suroccidental de distribución principalmente norteafricana que se extiende por Marruecos, Argelia, Libia y Túnez, alcanzando el sudeste ibérico en una única población europea, localizada en la Sierra de Crevillente (Alicante).

Hábitat:

Coloniza lajas calizas con cierta inclinación, sometidas a la acción erosiva del viento y a las aguas de escorrentía, en suelos poco profundos y pobres en materia orgánica, en áreas mediterráneas áridas y semiáridas con influencia marítima, en un rango altitudinal bastante limitado (100-300 m). En la Sierra de Crevillente, forma parte de tomillares calcícolas (Thymo moroderi-Siderition leucanthae) desarrollados sobre suelos poco profundos formados a partir de conglomerados cuaternarios bastante desintegrados, bajo ombrotipo seco-semiárido. En estas comunidades aparece acompañada por Sideritis leucantha, Teucrium carolipaui, Thymus moroderi, Satureja canescens, Thymus vulgaris, Stipa tenacissima, entre otras especies.

Situación actual:

Hasta 2009, todos los efectivos ibéricos conocidos apenas superaban el centenar de ejemplares en dos núcleos poblaciones de desigual tamaño localizados en el entorno del embalse de Crevillente. El núcleo mayor que concentraba más del 90% de los efectivos totales, fue totalmente destruido por el aumento del nivel del embalse. Afortunadamente, ese mismo se localizaron diversos núcleos poblacionales en el extremo occidental del embalse y en el entorno del núcleo urbano que representaron un incremento muy significativo del número de ejemplares conocidos en el sur de Alicante. Los censos realizados en 2013 estimaron un tamaño poblacional superior al millón de ejemplares. Este descubrimiento permitió reducir la categoría de protección de esta especie, de En Peligro de Extinción a Protegida No Catalogada.

Amenazas:

La alteración antrópica del área por su proximidad al núcleo urbano de Crevillent, el desarrollo de cultivos de secano y los vertidos de basuras y escombros, constituyen una amenaza significativa, probablemente responsable de la extinción del pequeño núcleo poblacional conocido desde 2001. La localización de algunos núcleos poblacionales en terrenos con calificados como urbanizables también supone un cierto riesgo para su conservación.

Acciones de conservación:

Las poblaciones son objeto de seguimiento demográfico por técnicos del Servicio de Vida Silvestre y por Agentes Medioambientales. Se han desarrollado estudios sobre su biología reproductiva y se dispone de semillas depositadas en los Bancos de Germoplasma del Jardí Botànic de la Universitat de València y del Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF). Estos centros han establecido los protocolos de germinación y de propagación en vivero. Más información sobre conservación de germoplasma y cultivo en http://www.agroambient.gva.es/documents/91061501/163206600/Fichas+de+especies+vulnerables/7f46e4b7-de6f-4749-9e9c-a7a7af294116. El material producido ha servido para dearrollar diversas actuaciones destinadas a la creación de una población de seguridad en la Microrreserva de Flora ¿Barranc del Boix¿ (Crevillent, Alicante), muy próxima a las poblaciones naturales.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2015

Autor ficha: Simón Fos
Año ficha: 2016

[imprimir]

Nombre científico: **Aptenia cordifolia**

Autor Especie: **(L. f.) Schwantes**

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Planta sud-africana - proviniente de la costa oriental de Provincia del Cabo y del Parque Nacional Kruger en el Transvaal (Sudáfrica) - herbácea, perenne, de vida corta, crasa y muy ramificada, con tallos de hasta 3 m, postrados. Aptenia posee hojas opuestas, planas y suculentas, cordadas o anchamente ovadas. Las flores, de púrpura intenso, aparecen en las axilas y en el extremo de las ramas Se propaga de forma vegetativa a través de los fragmentos del tallo, que son capaces de enraizar. Presenta un periodo de floración muy largo que va desde principios de primavera hasta entrado el otoño. Es una especie autocompatible y produce abundantes semillas que germinan fácilmente en suelos arenosos y secos. Se desconoce la capacidad real de dispersión por semillas, aunque como en otras aizoáceas, se ha indicado su dispersión por pájaros de sus frutos carnosos.

Distribución:

Su introducción en Europa se remonta a finales del siglo XVIII. Actualmente se encuentra naturalizada en puntos dispersos del litoral tanto mediterráneo (Cataluña y Valencia) como atlántico (Galicia, Asturias y Cantabria), muy raramente en el interior peninsular (Granada).

Hábitat:

Ocupa ambientes muy iluminados aunque tolera la sombra. Resiste largos periodos de sequía aunque experimenta un crecimiento muy rápido cuando recibe abundante agua en suelos bien drenados. Tolera una moderada salinidad.

Situación actual:

Cultivada como ornamental, para fijar taludes o recubrir muros, desde donde se escapa e invade huertos y terrenos baldíos, en comunidades de Artemisietea vulgaris. En la comarca del Baix Maestrat se ha naturalizado en repisas de acantilados, gravas y arenas. El patrón de distribución de la especie es básicamente litoral (73,3% del total) o de zonas próximas, fuertemente relacionado con la presencia de zonas ajardinadas. Una tercera parte de las cuadrículas con acantilados en la C. Valenciana poseen Aptenia cordifolia como especie naturalizada, aunque no falta en ecosistemas dunares, siempre asociada a escapes de jardines contiguos. De las 15 cuadrículas ocupadas en la C. Valenciana, el

80,0% se encuentran en la provincia de Castellón. Habita zonas de clima semiárido o secosubhúmedo, en zonas poco o nada arboladas y que no hayan sufrido incendios.

Amenazas:

Compite activamente con la vegetación autóctona al formar masas densas con un recubrimiento elevado que impide el crecimiento de plantas de menor altura, reduciendo la diversidad vegetal e impidiendo el normal desarrollo de las otras especies. Aunque se trata de una especie que no posee grandes superficies invadidas, muestra elevadas tasas de expansión vegetativa sobre zonas acantiladas. Según experiencias de erradicación llevadas a cabo en la Microrreserva de Flora de Cullera, la especie es capaz de persistir en las zonas donde se ha eliminado, gracias a su banco de semillas.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2006

[imprimir]

Nombre científico: **Apteranthes munbyana ssp. hispanica**

Autor Especie: **(Coincy) M.B. Crespo & Mateo**

Nombre castellano: Chumberillo de lobo

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas



Autor Foto: José Juarez

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Planta de aspecto cactiforme, poco elevada, pero con un sistema radicular muy desarrollado. Tallos suculentos, de sección tetragonal o pentagonal con aristas de borde aserrado-sinuoso. Hojas reducidas a pequeñas láminas caducas de pocos milímetros. Flores pardo-rojizas, malolientes, con segmentos lineares y estrechos. Fruto en largo fol'culo pardusco. Florece de abril a junio.

Distribución:

Endemismo del SE ibérico, con poblaciones en Murcia, Albacete y Alicante, conocióndose de esta ¿ltima unas pocas localidades en los alrededores de Millena, Pinoso, y en la Serra de la Cortina.

Hábitat:

Planta adaptada a roquedos o pedregales bastante térmicos e insolados, bajo bioclima termo-mesomediterráneo semiárido-seco

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 2013 - 2013

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1998

[imprimir]

Nombre científico: **Argyrolobium uniflorum**

Autor Especie: **(Decne.) Jaub. & Spach**

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro
Lista roja de Flora Vascular
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Descripción y biología:

Planta perenne sufruticosa de pequeño tamaño (8-30 cm) erecta o ascendente, con indumento seríceo formado por pelos aplicados. Hojas alternas, pecioladas, trifoliadas y provistas de estípulas lanceoladas, libres entre sí, pero soldadas a la base del peciolo; peciolo semicilíndrico sin surco en la cara adaxial; foliolos (3,5-12 x 1,5-4 mm) elípticos, seríceos por ambas caras. Flores solitarias opuestas a las hojas, con 3 bracteolas lineares o lanceoladas, glabras en el haz y seríceas en el envés, situadas en la mitad superior del pedicelo. Cáliz ± seríceo con el labio superior bífido y el inferior trífido. Corola amarilla ± intenso, en ocasiones, con el estandarte y parte de las alas de color purpúreo. Estandarte mucronado en el ápice y auriculado en la base, glabro en su mayor parte y con algunos pelos en el nervio central del dorso; alas mçás pequeñas que el estandarte y la quilla. Fruto en legumbre (16-20 x 3-3,5 mm), sentado, seríceo, dehiscente, con 3-7 semillas. Semillas ovoideas o subglobosas, de color pardo-verdoso, con máculas negruzcas.Florece entre marzo y abril. Similar a su congénere Argyrolobiumzanonii, se diferencia por sus hojas con estípulas y folíolos algo menores, sus flores siempre solitarias, con cáliz algo menor (5- 6 mm) y corola bastante menor (5-6 mm), con el estandarte glabrescente.

Distribución:

Se conoce de las zonas áridas de Oriente Medio (Arabia, Palestina, Siria),el norte de África y la Península Ibérica, donde queda restringida al extremo sudoriental, concrtamente a las provincias de Murcia y Almería, alcanzando nuestro territorio en los montes entre Orihuela y Crevillente (Alicante).

Hábitat:

Crece en matorrales basófilos y termófilos de orientación sur, normalmente degradados, y en pastizales vivaces secos y soleados, bajo condiciones bioclimáticas de termomediterráneo semiárido.

Situación actual:

Citada en 1995 en las zonas bajas de la Sierra de Crevillente, próximas al embalse, no ha vuelto a ser localizada a pesar de los rastreos realizados en toda el área y de las campañas de seguimiento que se desarrollan periódicamente para el seguimiento de otra planta norteafricana presente en la zona: Anarrhinumfruticosum.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1995 - 1995

Autor ficha: Simón Fos
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Arundo donax**
Nombre valenciano: Canya
Nombre castellano: Caña

Autor Especie: **L.**
Origen: Cultivado
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA Planta con apariencia gramínea de gran tamaño, perenne, con tallos huecos robustos y erectos de hasta 8 m de altura y provista de rizomas leñosos subterráneos reptantes. Hojas péndulas de hasta 6cm de anchura. Flores reunidas en inflorescencia grande y plumosa, muy ramificada. Florece de julio a diciembre. En nuestro territorio la caña se reproduce de manera vegetativa mediante sus rizomas. Los fragmentos de rizoma tienen capacidad de enraizamiento y son dispersados por la corriente, al igual que los tallos jóvenes, cuyos entrenudos pueden enraizar. Se trata de una especie que requiere humedad para desarrollarse vigorosamente, si bien tolera la desecación y las temperaturas estivales. Es sensible a las heladas y por ello se muestra ausente de los territorios en los que hiela con frecuencia en invierno.

Distribución:

Según algunos autores las cañas son originarias de zonas riparias del este de Asia pero en opinión de otros proceden del centro y sur del continente asiático. Actualmente, se encuentra extendida por la mayor parte de las regiones templadas o cálidas del mundo, donde invade zonas riparias de los tramos bajos de los ríos. En Europa se encuentra naturalizada en todos los países meridionales.

Hábitat:

Márgenes de riberas fluviales, sobre suelos de todo tipo, siempre que la humedad se presente en el substrato durante parte del año. Tolera bien la salinidad moderada.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana es una especie en expansión que ha colonizado los tramos medios y bajos de la totalidad de cursos fluviales y ramblas de nuestro terriorio, en algunos casos formando masas monoespecíficas, densas e impenetrables.

Amenazas:

La Unión internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN) considera a la caña como una de las 100 especies de animales o plantas más peligrosas por lo que se refiere a su capacidad de invasión y de alteración de los hábitats que coloniza. Entre sus impactos destaca la capacidad de esta especie para excluir por competencia por el espacio a las especies autóctonas hasta su total sustitución y el empobrecimiento consiguiente de las Comunidades vegetales y animales. Reduce también el flujo de agua promueve la sedimentación y colmatación de los cursos de agua y fomenta la evapotranspiracion. Estos impactos se traducen en una disminución global de la disponibilidad de recursos hídricos. Por último, modifica el régimen de incendios, debido a la elevada cantidad de biomasa que llega a acumular.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1864 - 2017

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Astragalus alopecuroides ssp. grosii**
Nombre valenciano: Botja de muntanya
Nombre castellano: Boja amarilla

Autor Especie: **(Pau) Rivas Goday & Rivas-Mart.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas



Autor Foto: Carles Fabregat

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Arbusto hasta de 30 cm. Tallos erectos, con pelos esparcidos. Hojas hasta de 20 cm, a lo largo de todo el tallo, imparipinnadas, con 11-13 pares de folíolos; folíolos 23-27, hasta de 1 cm, obocordados; estípulas 9-13 mm, ovadas o lanceoladas, largamente soldadas al pecíolo, glabras. Inflorescencia en racimo, ± esférico, denso; brácteas casi tan largas como el cáliz. Cáliz con los dientes algo más cortos que el tubo, villoso. Corola de color amarillo pálido. Fruto en legumbre, globoso, trígono, tomentoso. 2n = 16. Florece de abril a julio. Más información sobre conservación de germoplasma y cultivo en: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=82491&idioma=C

Distribución:

Endemismo iberolevantino de óptimo bético, restringido al SE ibérico, concretamente a las provincias de Almería, Granada, Murcia y Alicante. Estas últimas, localizadas en las comarcas centrales y meridionales, representan el límite

septentrional de su área de distribución. Alicantino.

Hábitat:

Crece sobre margas o yesos, preferentemente en matorrales termófilos bajos o muy abiertos, sometidos a una fuerte insolación. Anthyllidetalia terniflorae. TM, SA. 200-580 m.

Situación actual:

Las observaciones más recientes se localizan en diversos puntos de la base del Maigmó (Tibi), Monte Hurchillo y Sierra de Pujálvarez (Orihuela). Las referencias de los años 70, que indicaban su presencia en la Serra de Crevillent y en la del Maigmó, no han sido confirmadas recientemente. Las poblaciones de la Sierra de Pujálvarez y Maigmó son pequeñas, sin sobrepasar los 50 ejemplares; sin embargo, en la primera existe una gran cantidad de hábitat óptimo y la población podría ser mayor. Por el contrario, la del Maigmó, aparece en un matorral en el margen de la carretera fragmentado por campos de cultivo próximos que impide la expansión de la población.

Amenazas:

La fragmentación de las poblaciones ya es una amenaza intrínseca, con 3 grandes áreas en el territorio: la base del Maigmó, la Serra de Crevillent y las sierras próximas a Orihuela. La progresiva reducción y aislamiento de las poblaciones aumenta los riesgos que ya vienen sufriendo por presión antrópica y modificación o destrucción de su hábitat, como ha ocurrido en la sierra de Pujálvarez (transformaciones de cultivos). En el Maigmó se han proyectado zonas residenciales e industriales muy cerca de la población existente.

Acciones de conservación:

Se ha recopilado información para la localización y estudio demográfico de todas las poblaciones, preveiéndose el inicio de estos trabajos y la recolección de germoplasma para el periodo 2009-2010. Parte de las poblaciones se encuentran localizadas en el LIC Sierra de Orihuela, gozando de las medidas de protección asociadas a la Red Natura 2000.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1988 - 2014

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Austrocylindropuntia subulata**
Nombre valenciano: Agulles d'Eva
Nombre castellano: Alfileres de Eva

Autor Especie: **(Engelm.) Backeb.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Opuntia subulata Foto: Gregorio Ros

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Planta de crecimiento columnar, con tallos ramificados y cilíndricos de 2 a 4 m de alto, con diámetro de hasta 8 cm. La superficie del tallo está cubierta de tubérculos aplanados con 1 ó 2 espinas amarillas de 6-8 cm. Las hojas cilíndricas aparecen en los extremos de los tallos que se forman en primavera y caen al comienzo del invierno. Posee espinas reunidas en areolas, con gloquidios cortos, generalmente no más de 1 o 2 espinas, robustas, amarillo pálido, erectas, de hasta 8 cm de largo. Florece a medidados de primavera o en verano, momento en que los ejemplares de mayor tamaño muestran flores rojizas con la parte interior anaranjada, de unos 7 cm de longitud. Los frutos son bayas en forma de pera, de color verdoso, cubiertos de espinas cortas.

Hábitat:

Coloniza fundamentalmente matorrales degradados, taludes y laderas así como desprendidmientos y paredes rocosas continentales o litorales (ocasionalmente)

Situación actual:

Se trata de la segunda especie del género Opuntia más frecuente en la C. Valenciana, especialmente en la provincia de Castellón. Manifiesta cierta preferencia por las altitudes bajas

Amenazas:

Aunque en España es considerada una especie invasora peligrosa por algunos autores, en la Comunitat Valenciana no se observa fuera de ambientes muy antropizados y ruderales.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 2014 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro
Año ficha: 2013

Nombre científico: **Brasiliopuntia brasiliensis**

Autor Especie: **(Willd.) A. Berger**

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Descripción y biología:

Cactus arbustivo de morfología irregular que alcanza los 4 m de altura. Tronco habitualmente único que se lignifica con la edad y carece de segmentos. Segmentos (palas) irregularmente ovales y muy delgados en comparación con otras opuntias, de unos 15 cm de longitud por 6 cm de ancho. Algunos segmentos pueden ser cilíndricos y medir hasta 1m de longitud. Las areolas están muy distanciadas entre sí con 1 a 3 espinas de 3 a 6 cm de largo. Esto confiere al cactus un aspecto poco espinoso. Las flores se abren durante el día y son de color amarillo de hasta 6 cm de diámetro, los frutos muestran una coloración y morfología variables, si bien en general son rojos o granates.

Distribución:

Su área de distribución original comprende un amplio territorio que incluye Brasil, Paraguay, este de Bolivia, Perú y norte de Argentina. Se ha naturalizado en algunos estados de Norteamérica, como Florida, sin que se comporte como una especie invasora.

Hábitat:

En su área de distribución nativa crece en restingas, riberas de cursos de agua temporal, y bosques tropicales secos, especialmente en sustratos arenosos profundos y en afloramientos rocosos. En la Comunitat Valenciana aparece esporádicamente en baldíos.

Situación actual:

Especie exótica con presencia muy esporádica en el territorio valenciano. No se conoce comportamiento invasor para esta especie en otras regiones del mundo. No obstante, sí que se ha naturalizado en otros países.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1996 - 1996

Autor ficha: Vicente Deltoro
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Bupleurum gibraltaricum**
Nombre castellano: Cuchilleja

Autor Especie: **Lam.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Autor Foto: Luis Serra

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Este arbusto se caracteriza por sus hojas persistentes, lanceoladas, de más de 1 cm de anchura, con nervios laterales no alcanzando el margen del limbo, y por sus numerosos radios en las inflorescencia, con brácteas persistentes en la fructificación

Distribución:

Taxón ibero-norteafricano bastante raro en la Comunidad Valenciana, donde se encuenra escasamente diseminado an laderas pedregosas, soleadas y calizas de la provincia de Alicante (Hurchillo, Torremendo, Crevillente, San Miguel de Salinas, S° del Cid y Montgó) y sur de la de Valencia, como límite septentrional.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1965 - 2015

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1994

[imprimir]

Nombre científico: **Carpobrotus acinaciformis** Autor Especie: **(L.) L. Bolus**

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
· Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Descripción y biología:

Planta perenne Originaria de África del Sur, carnosa, de largos tallos rastreros de base leñosa. Hojas crasas opuestas unidas en la base de color verde vivo, a veces púrpura en los extremos, con textura cérea y 4-13 cm de longitud, con sección media en triángulo equilátero. Flores solitarias, que se abren a pleno sol, muy vistosas, de 80-1000 mm de diámetro y color púrpura intenso. Florece de marzo a junio y la planta es fecundada por insectos, de los órdenes Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera y Thysanoptera. Los frutos son ingeridos por gaviotas y pequeños mamíferos que contribuyen así a su dispersión. En Menorca, parece ser que la dispersión de las semillas se realiza a través de conejos y ratas.

Distribución:

La especie se encuentra distribuida en distintas regiones del mundo, siempre vinculada a ambientes costeros. En California es un serio invasor de los ambientes costeros. También ha colonizado las costas de Australia y varias islas del Pacífico. Aparece naturalizada con comportamiento invasor en la costa mediterránea francesa y en Córcega. También se comporta como invasora en Portugal, en Gran Bretaña e Irlanda. En España invade algunas áreas de las costas de Austurias y Cantabria, de la Costa Brava, de Menorca y Mallorca, así como del litoral andaluz. En la Comunitat Valenciana está ampliamente extendido por todo la costa.

Hábitat:

En su región de origen, los territorios costeros del extrremo sudoeste de Sudáfrica, crece sobre arenas sueltas y afloramientos rocosos, donde llega a cubrir áreas extensas. La elevada adaptabilidad a ambientes áridos, rápido crecimiento vegetativo y capacidad de fijación del suelo de esta especie han motivado su uso en repoblaciones dunares y jardinería litoral, lo que ha supuesto la rápida colonización de todo tipo de ambientes costeros, desde acantilados medios y bajos hasta arenales (Chritmo-Limonion, Ammophilion, Crucianelletum maritimae, etc.), donde desplaza por exclusión competitiva al resto de la vegetación.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana Carpobrotus edulis y acinaciformis se comportan como especies de ecología fundamentalmente litoral, por lo que se puede afirmar que se trata del taxon naturalizado más invasor en estos ambientes. En este sentido, un gran número de los ambientes dunares valencianos están ocupados por la especie. Prácticamente todos los municipios litorales presentan alguna localidad donde crece una u otra especie. El total cartografiado, en 2003, para la costa valenciana asciende a 120,57 Ha. La provincia más afectada por la invasión de Carpobrotus spp es la de Alicante.

Amenazas:

Carpobrotus acinaciformis provoca graves impactos en la vegetación autóctona. Por un lado, su denso sistema radicular superficial le permite interferir eficazmente en la captación de agua con las plantas propias de hábitats dunares. Por otro, reduce el pH del suelo, modificando los ciclos de nutrientes en el medio edáfico (d´Antonio y Mahall, 1991). Además, Carpobrotus dificulta la polinización de las plantas nativas, al reducir por competencia el número de polinizadores que acceden a ellas, pero también al colmatar los estigmas de las especies autóctonas con su polen (Moragues y Traveset 2003). Por último, Carpobrotus compite eficazmente por el espacio con la flora nativa, ya que un solo individuo de esta especie puede formar densas matas de hasta 20 m de ancho y 50 cm de grosor.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1964 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Carpobrotus edulis**
Nombre valenciano: Curatall
Nombre castellano: Uña de gato

Autor Especie: **(L.) N.E. Br. in E.P. Phillips**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
· Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA. Planta perenne Originaria de África del Sur, carnosa, de largos tallos rastreros de base leñosa. Hojas de color verde vivo, a veces púrpura en los extremos, con textura cérea y sección triangular, de 4-13 cm de longitud, con sección media en triángulo equilátero, muy crasas. Flores solitarias, que se abren a pleno sol, muy vistosas, de 80-1000 mm de diámetro. Florece de marzo a junio y la planta es fecundada por insectos, de los órdenes Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera y Thysanoptera. Los frutos son ingeridos por gaviotas y pequeños mamíferos que contribuyen así a su dispersión. En Menorca, parece ser que la dispersión de las semillas se realiza a través de conejos y ratas.

Distribución:

La especie se encuentra distribuida en distintas regiones del mundo, siempre vinculada a ambientes costeros. En California es un serio invasor de los ambientes costeros. También ha colonizado las costas de Australia y varias islas del Pacífico. Aparece naturalizada con comportamiento invasor en la costa mediterránea francesa y en Córcega. También se comporta como invasora en Portugal, en Gran Bretaña e Irlanda. En España invade algunas áreas de las costas de Austurias y Cantabria, de la Costa Brava, de Menorca y Mallorca, así como del litoral andaluz. En la Comunitat Valenciana está ampliamente extendido por todo la costa.

Hábitat:

La elevada adaptabilidad a ambientes áridos, rápido crecimiento vegetativo y capacidad de fijación del suelo de esta especie han motivado su uso en repoblaciones dunares y jardinería litoral, lo que ha supuesto la rápida colonización de todo tipo de ambientes costeros, desde acantilados medios y bajos hasta arenales (Chritmo-Limonion, Ammophilion, Crucianelletum maritimae, etc.), donde desplaza por exclusión competitiva al resto de la vegetación.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana Carpobrotus se comporta como una especie de ecología fundamentalmente litoral, por lo que se puede afirmar que se trata del taxon naturalizado más invasor en estos ambientes. En este sentido, un gran

número de los acantilados valencianos están ocupados por la especie. Prácticamente todos los municipios litorales presentan alguna localidad donde C. edulis se ha naturalizado. El total cartografiado, en 2003, para la costa valenciana asciende a 120,57 Ha. La provincia más afectada por la invasión de Carpobrotus edulis es la de Alicante.

Amenazas:

Carpobrotus edulis provoca graves impactos en la vegetación autóctona. Por un lado, su denso sistema radicular superficial le permite interferir eficazmente en la captación de agua con las plantas propias de hábitats dunares. Por otro, Carpobrotus reduce el pH del suelo, modificando los ciclos de nutrientes en el medio edáfico (d´Antonio y Mahall, 1991). Además, Carpobrotus dificulta la polinización de las plantas nativas, al reducir por competencia el número de polinizadores que acceden a ellas, pero también al colmatar los estigmas de las especies autóctonas con su polen (Moragues y Traveset 2003). Por último, Carpobrotus compite eficazmente por el espacio con la flora nativa, ya que un solo individuo de esta especie puede formar densas matas de hasta 20 m de ancho y 50 cm de grosor.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1983 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Carum foetidum**

Autor Especie: **(Coss. & Durieu ex Batt.) Drude in Engler & Prantl**

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Descripción y biología:

Hierba perenne, con raíz napiforme (7-15 cm), desnuda, y tallos erguidos (hasta 120 cm), muy ramificados, asurcados y glabros, sin restos fibrosos en la base sin formar un collar fibroso. Las hojas basales (6-25 x 2-3 cm) largamente pecioladas, dos veces pinnatisectas, más o menos estrechamente triangular-ovadas, con lóbulos elípticos obtusos; las caulinares parecidas, pero más cortas o reducidas a un lóbulo. Flores pequeñas, blanquecinas, reunidas en umbelas compuestas, con 3-6 radios de 0,5-2,0 cm de longitud y desiguales en la fructificación, sin brácteas ni bractéolas u ocasionalmente presentes, siendo enteras y lineares. Umbélulas con 6-10 flores, pedicelos hasta 3 mm de longitud en la fructificación, carentes de bractéolas. Cáliz con sépalos y dientes inconspicuos. Estilos fructíferos recurvados, cortos (0,3-0,4 mm) de la misma longitud que el estilopodio o más cortos. Frutos (1,5-2 mm long.), subglobosos y glabros. Florece entre septiembre y noviembre.

Distribución:

Planta norteafricana, que alcanza levemente el sureste ibérico, donde se conoce en muy pocas localidades de Granada, Murcia y Alicante. En esta última, fue recolectada hace varias décadas en zonas salinas del sur y noroeste

de la provincia (Albatera, Orihuela, Villena, Elx y Crevillent) sin que exista ninguna confirmación reciente de su presencia. En la actualidad, se considera que podría haber desaparecido por la destrucción o transformación de su hábitat natural.

Hábitat:

Habita en juncales y pastizales vivaces húmedos sobre suelos salobres en los márgenes de lagunas salinas en áreas costeras y de lagunas endorreicas interiores.

Situación actual:

La ausencia de observaciones posteriores los años 60 y 70, fechas a las que corresponden las diferentes recolecciones realizadas por A. Rigual en los municipios indicados de Alicante lleva a considerarla como aparentemente extinta en la Comunitat Valenciana.

Amenazas:

No es posible concretar las amenazas que afectan a esta especie sin datos que confirmen su presencia actual en nuestro territorio.

Acciones de conservación:

No se han desarrollado acciones concretas de conservación. Algunas de las áreas donde fue recolectada podrían estar incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos, concretamente en el Parque Natural del Hondo (Elx-Crevillent) y en el LIC ¿Salero y Cabecicos de Villena¿.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1960 - 1975

Autor ficha: Simón Fos
Año ficha: 2016

[imprimir]

Nombre científico: **Centaurea lagascae**

Autor Especie: **Nyman**

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro crítico

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ib. Vulnerables

Autor Foto: Luis Serra

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Hierba perenne, de 8-25 cm, cubierta de indumento blanco-lanuginoso. Tallos postrados, ramificados en la zona apical. Hojas de color blanco-grisáceo; las inferiores en roseta, bipinnatisectas, con segmentos lineares; las caulinares pinnatisectas; las superiores lineares, enteras. Capítulos solitarios o por pares, cortamente pedunculados; involucro estrechado en el ápice; brácteas con apéndice pardo y con espina terminal 3-4 veces más larga que los cilios laterales. Flores de color rosado. Fruto en aquenio, de 3,5-4 mm. 2n = 18, c. 36. Florece de abril a junio. Dispersión anemocora. Más información sobre conservación de germoplasma y cultivo en: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=82491&idioma=C

Distribución:

Endemismo del N de África que alcanza el SE de la Península Ibérica, distribuyéndose por Albacete, Ciudad Real y Alicante. En esta última, ha sido localizado en el S de la provincia, en el Monte Hurchillo (Orihuela) y en la Serra de Crevillent (Albatera). Murciano Meridional y Alicantino.

Hábitat:

Se presenta en matorrales aclarados, generalmente sobre suelos pedregosos, en contacto con comunidades crasicaules (Sedion micrantho-sediformis). Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae. TMi, SA. 200-500 m.

Situación actual:

Descrita originalmente por M. Lagasca del Monte Hurchillo, quien la denominó C. incana, fue posteriormente renombrada por Nyman. Sólo se conoce en un par de localidades: en su localidad clásica, se extiende por tres cuadrículas de 1x1 km, aunque los censos más recientes sólo han contabilizado 39 ejemplares. En la Serra de Crevillent, se conoce una pequeña población constituida, según los censos realizados en 2002, por al menos 21 individuos naturales. Este número se ha incrementado con los resultados positivos de las actuaciones de refuerzo.

Amenazas:

La especie puede haber sufrido eventos de regresión por efecto del pastoreo. Además su número de ejemplares es excesivamente bajo para garantizar la supervivencia a largo plazo ante cualquier evento de carácter estocástico

(plagas o enfermedades, presencia de nuevos predadores, sequías excesivamente prolongadas, etc.).

Acciones de conservación:

Se han caracterizado y censado las poblaciones. También se ha recolectado material reproductivo y se ha reproducido en vivero a partir de semilla, aunque está pendiente la caracterización de su proceso germinativo y la disposición de suficientes accesiones en los bancos de germoplasma del JBUV y el CIEF. En cualquier caso, los ensayos permitieron disponer de planta suficiente para una primera actuación de reforzamiento. La población del Monte Hurchillo está incluida en una Microrreserva de Flora y ambas poblaciones se sitúan en zonas incluidas en la Red Natura 2000. Las citadas pruebas de producción de planta permitieron un primer intento de reforzamiento.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1816 - 2014

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Ceratophyllum submersum**

Nombre castellano: Ceratofilo

Autor Especie: **L.**

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ia. En Peligro de Extinción

Descripción y biología:

Hierba perenne, acuática, de color verde claro, desprovista de raíces. Tallos redondeados, flexibles, con nudos marcados. Hojas finamente laciniadas; lacinias filiformes que se bifurcan tres o cuatro veces. Flores solitarias, sentadas en la axila de las hojas, sin perianto, rodeadas de 8 a 10 pequeñas brácteas. Estambres cortos, casi sentados. Gineceo con un solo carpelo. Fruto en aquenio, de 4 mm, tuberculado, con espina apical o sin ella, de color negruzco. Florece de junio a septiembre.

Distribución:

Subcosmopolita, distribuida por toda Europa, aunque rehuyendo las zonas septentrionales. En la Península Ibérica aparece en el NE, Levante y SW. En la Comunitat Valenciana, se ha indicado su presencia en diversos marjales litorales como la Albufera, marjal de Castellón, Cabanes-Torreblanca y Peñíscola, resultando notable su presencia en el Hondo, pero su distribución dista de ser bien conocida por su confusión con C. demersum. Maestrazguero, Huer - tano y Alicantino.

Hábitat:

Forma parte de las comunidades vegetales enraizadas y sumergidas de aguas mesotróficas permanentes, remansadas o que fluyen muy lentamente en ríos, lagunas, marjales, acequias, balsas, azudes, etc., generalmente por áreas bajas, próximas al litoral, donde puede convivir con C. demersum. Indiferente edáfica. Ceratophyllion demersi. 2-60 m.

Situación actual:

Actualmente, la situación de C. submersum en la Comunitat Valenciana debe considerarse preocupante, porque su representación en las zonas húmedas valencianas ha quedado reducida a una única localidad. Las poblaciones de la Albufera de Valencia se consideran extintas, probablemente desde principios de los 90. En las sucesivas campañas de prospección solamente se ha detectado C. demersum. Las del Prat de Cabanes-Torreblanca (Castellón) y El Hondo (Elx-Crevillent, Alicante) no han sido localizadas en los últimos rastreos realizados en las turberas, canales y acequias de estos parques naturales; tampoco ha sido encontrado en la marjalería de Castellón. Sólo la población de la acequia Templera, en la marjal de Peñíscola (Castellón), está actualmente confirmada. Esta población muestra importantes fluctuaciones interanuales y en los últimos años ha sufrido una importante regresión, con una disminución importante en los canales de la zona de Horta de Marjaletes y en la propia acequia Templera. La población total fue estimada en unos 40.000 ejemplares en el año 2000, a partir de una densidad media de 150 pies/m2. Los seguimientos posteriores han dado cifras sensiblemente más bajas.

Amenazas:

La especie resulta muy vulnerable ante cambios ambientales locales en el Marjal de Peñíscola, dado su reducido tamaño poblacional y la escasa variabilidad genética asociada al predominio de la multiplicación vegetativa. La principal amenazada registrada es la limpieza y dragado de acequias y riberas que ha provocado la dramática reducción poblacional observada en los últimos años. El hábitat donde crece está además expuesto a una fuerte pérdida de calidad (eutrofización hídrica, salinización, desecación) causadas por las actividades agropecuarias, las transformaciones y el incremento de la urbanización.

Acciones de conservación:

Se han establecido los protocolos de multiplicación vegetativa, no siendo factible la obtención de plantas por vía sexual por la escasísima producción de semilla de la población conocida. Con el material obtenido, además de mantenerse plantas en cultivo en el CIPP, se han establecido nuevos núcleos poblacionales en las lagunas creadas durante la restauración de la Marjal de Peñíscola, tras su inclusión en el Catálogo Valenciano de Zonas Húmedas. Dichos núcleos quedan protegidos de las acciones de limpieza y dragado antes citadas.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1961 - 2016

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Chloris gayana**
Nombre castellano: Hierba de Rhodas, Pata de Gallo

Autor Especie: **Kunth**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II



Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA .Graminea cespitosa estolonífera, con hojas glabras e inflorescencia digitada formada por espigas de hasta 15cm de longitud. Florece de marzo a agosto y se reproduce fácilmente por semillas y estolones. Aunque crece de manera óptima en condiciones tropicales y subtropicales tolera bien la falta de agua y puede vivir con tan solo 300 mm anuales de precipitación. No tolera las heladas pero puede soportar la salinidad y el encharcamiento moderado.

Distribución:

Especie originaria de la zona comprendida entre Kenia y Sudáfrica. En la actualidad es una hierba adventicia e invasora en numerosas zonas tropicales y subtropicales y regiones cálidas de todo el mundo. En España solo se ha naturalizado en la Costa Mediterránea y algún punto de la costa Atlántica de Andalucía.

Hábitat:

Cultivos de regadío, ambientes ruderales y viarios sobre suelos con compensación edáfica.

Situación actual:

Prefiere formaciones puras o mezcladas con Hyparrhenia hirta (Micromerio graecae-Hyparrhenion hirtae). Al parecer la especie se introdujo como fijadora del sustrato en la autopista AP-7, donde ya era abundante en 1990 en los taludes de ésta en el tramo entre Benidorm y Alicante. Esta procedencia podría explicar el patrón de distribución de la especie en la Comunitat Valenciana, que se presenta en zonas litorales y en terrenos anexos al trazado de la autopista.

Amenazas:

En la Comunitat Valenciana su presencia se limita fundamentalmente a márgenes de zonas viarias y otros ambientes de escaso valor ecológico.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1983 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

Nombre científico: **Commicarpus africanus**

Autor Especie: **(Lour.) Dandy in F.W. Andrews**

Libros Rojos

Lista roja de Flora Vascular
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Arbusto pequeño, hasta de 1 m, postrado. Tallos leñosos en la base, con entrenudos largos. Hojas 2-3 cm, opuestas, ovado-deltoides, pecioladas, pubescentes en el envés. Flores axilares, largamente pedunculadas, agrupadas en inflorescencias umbeliformes o en verticilos. Cáliz cubierto de pelos cortos y curvados, con 5-10 glándulas en el ápice. Corola 10-13 mm, pentalobulada, tubular, blanquecina en la parte superior, pubescente en la inferior. Antocarpo 7-10 mm, papiloso, viscoso. Florece de mayo a noviembre. Más información sobre conservación de germoplasma y cultivo en: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=82491&idioma=C

Distribución:

Elemento africano que se distribuye por la región paleotemplada. En la Península Ibérica, sólo se encuentra en Almería, Murcia y Alicante, donde se tiene constancia de su presencia en las Sierras de Callosa (Callosa de Segura) y de Orihuela, y en las proximidades del Montgó (Teulada). Esta última se considerada relicta de una migración hacia el N de plantas de óptimo semiárido por el litoral de la península. La presencia de otros elementos, como Anthyllis

temiflora, Maytenus senegalensis subsp. europaea, Boerhavia repens o Withania frutescens, apoyarían esta afirmación. Diánico y Murciano Meridional.

Hábitat:

Se desarrolla en grietas o al pie de roquedos calcáreos, en posiciones secas o soleadas, formando parte de comunidades subnitrófilas y subrupícolas en abrigos y pequeñas cuevas. Parietarietalia judaicae, Asplenietalia petrarchae. TM, SA-SE. 50-200 m.

Situación actual:

Se conocen dos núcleos poblaciones, uno en el sur de Alicante, en la Sierra de Callosa, donde fue descubierta por Cavanilles, y en la vecina Sierra de Orihuela, localizada por A. Rigual, y otro recientemente localizado en el norte de la provincia, concretamente en Teulada (Serra de Seldetes), donde convive con Boerhavia repens. En las primeras, se ha localizado en dos cuadrículas de 1 x 1 Km de lado. Por el momento no se dispone de censos detallados de la Sierra de Callosa, en todo caso inferior a 500 ejemplares. En la población de Teulada hay al menos tres ejemplares adultos que muestran una gran producción de semillas, aunque no se detectan ejemplares jóvenes.

Amenazas:

El hábitat que ocupan ha sido objeto de sobrepastoreo en el pasado; además, la reducida extensión de sus áreas de ocupación y el escaso número de efectivos de las poblaciones exponen a la especie a riesgos endógenos, incluyendo una alta vulnerabilidad frente a posibles factores estocásticos, como plagas, expansión de alóctonas, etc.

Acciones de conservación:

La población de Teulada está siendo objeto de seguimiento por los riesgos asociados a la competencia interespecífica con Boerhavia repens, incluida igualmente en el Catálogo Valenciano, pero en una categoría superior de amenaza. El ayuntamiento de Teulada ha propuesto la creación de una Microrreserva de Flora, actualmente en trámite de declaración. Su ubicación cercana a la población actual la convierte en un área óptima para albergar un futuro reforzamiento. Se ha previsto desarrollar en breve la caracterización precisa del núcleo meridional, que se localiza en el LIC Sierra de Orihuela gozando de las medidas de protección como Espacio Protegido de la Red Natura 2000. Los trabajos permitirán recolectar semillas para mantener adecuadas accesiones de germoplasma y para iniciar las actividades de conservación ex situ.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1852 - 2016

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Convolvulus valentinus**
Nombre valenciano: Campaneta
Nombre castellano: Campanilla

Autor Especie: **Cav.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable
Lista roja de Flora Vascular
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Planta algo lignificada en la base, decumbente o ascendente, poco pilosa. Hojas linear-lanceoladas, con peciolo muy corto. Ped'nculos de longitud igual o ligeramente inferior a la de la hoja correspondiente. Sépalos externos ampliamente ovados, con pelos cortos y aplicados. Corola de 18-30 mm, blanca, rosada o azulada. Florece de marzo a julio.

Distribución:

Especie de distribución ibero-magrebí y balear, en la que la subespecie tipo es endémica de las áreas litorales y sublitorales del cuadrante NE de Alicante. Las poblaciones baleáricas se atribuyen a la subespecie suffruticosus

Hábitat:

Crece sobre suelos calizos degradados, frecuentemente algo nitrificados, en exposiciones soleadas, bajo bioclima termomediterr¿neo seco, formando parte de comunidades subnitr-filas ruderales, pastizales vivaces x¿ricos, e incluso, claros de matorral.

Amenazas:

Este taxon es actualmente bastante frecuente en su área de distribución; no obstante la construcción de nuevas urbanizaciones cercanas al mar puede ocasionar perjuicios importantes en el desarrollo de sus poblaciones.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1969 - 2017

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria
Año ficha: 1998

[imprimir]

Nombre científico: **Cortaderia selloana**

Nombre castellano: Plumeros, hierba de la Pampa

Autor Especie: **(Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.**

Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
· Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE POTENCIALMENTE INVASORA Gramínea robusta hasta de 4 m de altura, formadora de macollas, con hojas alargadas y estrechas (100-300 m × 0,5-1 cm), serradas, ásperas y cortantes al tacto. Tallos portadores de las flores erectos que llevan densas panículas blancas de flores de hasta 80 cm o más. Cada espiguilla lleva 3-7 flores con glumelas inferiores pelosas. Se trata de una planta dioica (sexos separados en plantas distintas) que florece entre julio y octubre y es polinizada por el viento. Produce una gran cantidad de semillas que son dispersadas por el viento a

distancias de varios kilómetros. Se trata de una planta muy rústica, tolerante de la sequía y las temperaturas extremas. Una vez instalada, forma poblaciones estables y no es atacada por los herbívoros, a causa de la presencia de agujas de sílice en las hojas.

Distribución:

Se trata de una especie procedente de América del Sur que actualmente se comporta como invasora en numerosas regiones del mundo, como California, Hawaii, Sudáfrica, Australia, Cerdeña, Córcega, Italia, Francia, Gran Bretaña, Portugal y Azores. En España Se distribuye preferentemente por la cornisa Cantábrica, donde está muy extendida, y en Cataluña. Se distribuye preferentemente por la cornisa Cantábrica, donde está muy extendida, y en Cataluña.

Hábitat:

Crece en márgenes y taludes de carreteras y caminos, así como en eriales y terrenos sueltos, marjales y malladas. Vive en todos los suelos, aunque prefiere los sueltos o arenosos algo húmedos y ricos en nutrientes, donde se desarrolla vigorosamente. Por esta razón, invade preferentemente riberas, zonas fluviales, dunas, malladas, y colas de estuarios. Se trata de una especie de crecimiento muy rápido.

Situación actual:

Es una especie que se naturaliza de manera puntual, si bien alli donde crece lo hace formando masas densas, pincipalmente en zonas litorales.

Amenazas:

Se trata de una planta que puede resultar invasora a medio plazo, especialmente en saladares y zonas interdunares. Una vez establecida es difícil de erradicar y sus formaciones densas compiten eficazmente por el espacio con la flora nativa. Otra especie de Cortaderia, C. Jubata, es actualmente una planta agresiva en California y Hawaii.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1988 - 2017

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Cylindropuntia pallida**

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
· Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex I

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Cactus ramificado, con tallos de forma cilíndrica completamente cubiertos por numerosas espinas de más de 5 centimetros de longitud, encapsuladas en una vaina papirácea de color pajizo que resulta ser la característica definitoria de este género. Produce flores verdoso-amarillentas en el extremo de sus tallos. Los tallos están divididos en segmentos de 10 hasta 25 cm de longitud y unos 4 o 5 de diámetro los cuales se rompen facilmente. lo cual, unido a las espinas, favorece la dispersión de la especie ya sea por la fauna o por cualquier otro vector, como el viento. La mayoría de los frutos de esta especie encierran semillas estériles. No obstante, la especie se dispersa con una gran facilidad gracias a la capacidad que tienen los fragmentos de tallo para enraizar.

Distribución:

Especie procedente del desierto de Sonora, del suroeste de los estados de Nevada y California. En la Comunitat Valenciana las poblaciones conocidas de la especie ocupan sectores semiáridos y crecen en romerales o ambientes degradados muy abiertos.

Hábitat:

Especie altamente invasora. Se presenta en sectores aún bastante delimitados de las tres provincias. En Castellón en Zorita del Maestrazgo. En Valencia, en los términos municipales de Lliria, Olocau, Bétera y Buñol, asi como en el barranco del Carraixet, entre Bétera y Montcada. En la provincia de Alicante ocupa un sector de unas 60 ha en la Sierra de Orihuela, donde fue descubierta en el año 2000. Su tendencia demográfica es claramente expansiva. En las poblaciones conocidas se observan claros fenómenos de dispersion activa de por vía vegetativa, a partir de fragmentos de tallo. No se ha comprobado fehacientemente que la especie sea capaz de reproducirse sexualmente en la Comunitat Valenciana, pero esta posibilidad no puede descartarse. De confirmarse, las posibilidades de erradicación de la especie disminuirían. En la actualidad se trabaja en la erradicación de los núcleos incipientes de colonización y se prevén actuaciones a corto plazo para erradicar sus mayores poblaciones.

Situación actual:

Junto con el jacinto de agua es la especie invasora vegetal más peligrosa en la Comunitat Valenciana. Es capaz de colonizar ambientes ruderales, pero también de instalarse en zonas bien conservadas y competir eficazmente con las formaciones vegetales autóctonas. Sus numerosas espinas son muy peligrosas tanto para el hombre como para la fauna doméstica.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 2013 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Cymodocea nodosa**

Autor Especie: **(Ucria) Asch.**

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM
· Anexo II



Ver más imágenes

Descripción y biología:

Fanerógama marina, tallo tipo rizoma en su gran mayoría horizontal enterrado en los sedimentos. Hojas acintadas en haces. Vainas abiertas y dos expansiones laterales.

Distribución:

Mediterráneo, Atlántico

Hábitat:

Infralitoral,fondos de arena o fango.

Amenazas:

Destrucción / Alteración de hábitats.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1966 - 2016

Autor ficha: Instituto de Ecologia Litoral
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Cynomorium coccineum** Autor Especie: **L.**

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Autor Foto: Luis Serra

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Planta parásita, rizomatosa, carnosa, con inflorescensi compacta, clavado-cilíndrica, rojiza y flores pequeñas, actinomorfas, bracteoladas y unisexuales

Distribución:

Se distribuye por la cuenca mediterránea y sudoeste de Asia. Ha sido registrada en algunos puntos de la provincia de Alicante (Villena, Santa Pola y La Mata)

Hábitat:

Vive especialmente sobre Quenopodiáceas de habitats salinos.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1961 - 2016

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1994

[imprimir]

Nombre científico: **Cystoseira algeriensis** Autor Especie: **Feldmann**

Estados Legales

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE

Descripción y biología:

Planta no cespitosa de unos 15 cm de altura, fijada al sustrato por un disco basal de contorno irregular. Cauloide generalmente simple, de hasta 10 cm de altura. Ápice del cauloide liso y no prominente. Tófulos muy abundantes, ovoides, lisos o rugosos y en algunos casos ligeramente espinosos. Ramas primarias cilíndricas, lisas en la base y recubiertas de apéndices espinosos. Ramas secundarias y terciarias idénticas a las primeras. Conceptáculos situados en la base de los apéndices espinosos de las ramas, a lo largo de los 2-4 cm apicales y no agrupados en receptáculos bien definidos.

Hábitat:

Vive en la zona sublitoral superior, en la parte más interna de plataformas superficiales de lugares batidos. También pueden vivir en cubetas en comunicación con el mar

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1981 - 2005

Autor ficha: Universidad de Alicante
Año ficha: 2006

[imprimir]

Nombre científico: **Disphyma crassifolium**

Autor Especie: **(L.) L. Bolus**

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA Planta rastrera de follaje denso, cuyas ramas tienen capacidad de enraizamiento a nivel de los nudos. Hojas triangulares, casi redondas, de color verde brillante en su juventud para después tomarse rojizas o amarillentas. Flores de color blanco, rosa o púrpura sobre pedúnculos cortos.

Hábitat:

Es una planta originaria de las zonas costeras de Sudáfrica y de la costa oeste de Australia, Nueva Gales del Sur.

Situación actual:

En la Comunidad Valenciana solo se dispone de citas dispersas de esta especie en el medio natural, lo que apunta a una naturalización incipiente de la especie. En otras provincias cercanas, como en la Isla de Menorca, Disphyma es especialmente abundante en la costa occidental, donde Forma una alfombra muy densa y continua que, aunque tiene un menor espesor que Carpobrotus, excluye por competencia la vegetación natural.

Amenazas:

Disphyma puede representar una amenaza solo en las zonas próximas a la costa y en zonas próxima a las urbanizaciones costeras. Al parecer no es capaz de reproducirse sexualmente - por semillas ¿, si bien si que es capaz de hacerlo a partir de fragmentos, por vía vegetativa. En áreas invadidas por esta especie en las que ha sido eliminada, esta característica ha dificultado las tareas de extracción.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1991 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Erophaca baetica**
Nombre valenciano: Astràgal lusitànic
Nombre castellano: Garbancillo del diablo

Autor Especie: **(L.) Boiss.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Hierba de hasta 120 cm, perenne, ciclo vital de septiembre a junio (en verano desaparece la parte aérea). Tallos cilíndricos, robustos y pelosos, con entrenudos largos. Hojas de 8 a 15 cm de largas con entre 7 y 12 pares de foliolos lanceolados, apiculados, glabros por el haz y pelosos por el envés, con 2 nectarios en su base. Estípulas linear-lanceoladas, libres y ciliadas. Inflorescencias axilares en racimo pedunculado, con entre 10 y 20 flores pedunculadas y péndulas, con el pedúnculo más corto que la hoja correspondiente. Caliz rojizo o verdoso, pubescente, con dientes linear-lanceolados. Corola blanca o blanco-amarillenta, glabra. Fruto de hasta 8 cm de longitud, que en la madurez se toma marrón oscuro. Semillas de 6-8 x 7x9 mm, parduscas y lisas. Floración vernal.

Distribución:

Se distribuye por la mitad sur de la península ibérica y por el noroeste de África. En la Comunitat Valenciana únicamente se encuentra en 2 localizaciones, una entre los términos municipales de Xàtiva, L'Olleria y Bellús y las otra en el término de Orihuela.

Hábitat:

En la Comunitat ocupa matorrales abiertos más o menos húmedos. En el resto de de su área de distribución se puede encontrar en sotobosques de encinares y otras quercínias e incluso en herbazales subnitrófilos.

Situación actual:

Las 2 localidades conocidas cuentan con un buen número de individuos. La localidad más septentrional cuenta con numerosos ejemplares distribuidos por unas 70 Ha. En la más meridional existe una Microrreserva de Flora, 'Punta de la Glea', también con numerosos ejemplares.

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1988 - 2017

Autor ficha: Albert Navarro
Año ficha: 2013

[imprimir]

Nombre científico: **Erucastrum virgatum ssp. baeticum**
Nombre valenciano: Ravenissa de roca
Nombre castellano: Jaramago de monte

Autor Especie: **(Boiss.) Gómez-Campo**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Autor Foto: Gerardo Stübing

Descripción y biología:

Hierba perennizante subnitrófila

Distribución:

Se trata de un endemismo ibérico registrado solamente en Gibraltar y Máñaga Murcia y Alicante (Sierras de Crevillente y Orihuela)

Hábitat:

Crece en laderas, bordes de caminos, etc... sobre suelos calizos en general pedregosos, en aéreas termomediterráneas semiáridas.

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1978 - 2014

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1994

[imprimir]

Nombre científico: **Euphorbia boetica**
Nombre valenciano: Lletera
Nombre castellano: Lechetrezna de arenal

Autor Especie: **Boiss.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Descripción y biología:

Arbusto pequeño, glabro, ± glauco. Tallos fuertemente leñosos en la base, algo flexuosos, con ramas estériles basales, ocasionalmente con 2-4 ramas laterales fértiles. Hojas mayoritariamente alternas, lineares o linear-lanceoladas, sésiles, enteras, a veces levemente denticuladas, trinervias en ambas caras. Inflorescencia en pleocasio, con 3-7 radios hasta de 35 mm; brácteas y bractéolas lineares, de morfología similar a las hojas; ciatio con nectarios en forma de media luna o terminados en un apéndice alargado en cada extremo; glándulas amarillas. Fruto en cápsula. Semillas con alvéolos poco numerosos e irregulares, de color oscuro. 2n = 18. Florece de febrero a junio.

Distribución:

Endemismo ibérico meridional que tiene su principal núcleo de distribución en el SW, aunque también se extiende hacia el SE hasta Málaga y en poblaciones aisladas de Albacete y S de Alicante (Orihuela y San Miguel de Salinas), que representan el límite oriental de su área de distribución. La cita de herbario, que la situaba en la Sierra de Callosa,

corresponde realmente a Euphorbia squamigera. Las antiguas citas, sin testimonio de herbario, para el Macizo del Mondúber no han podido ser confirmadas y parecen poco probables.

Hábitat:

Matorrales secos y claros en los pinares del litoral, sobre suelos arenosos y casi siempre silíceos. En la Comunitat Valenciana, vive sobre arenas consolidadas formando parte de los matorrales desarrollados en pinares degradados, junto a Thymus moroderi, Helianthemum marminorense, Teucrium homotrichum subsp. lagunae, Echium humile, Anthyllis terniflora y Sideritis murgetana subsp. littoralis, entre otras. Thymo-Sideritidion leucanthae. TM, SA. 40-100 m.

Situación actual:

Su presencia ha sido confirmada en San Miguel de Salinas y en Orihuela. No se dispone de información actualizada sobre la situación demográfica de los diferentes núcleos poblacionales, aunque se ha estimado un tamaño poblacional inferior a los 500 ejemplares. Se presenta en pequeños núcleos poblacionales aislados unos de otros como consecuencia de la fragmentación del hábitat por el uso del territorio.

Amenazas:

La presión urbanística en el sur de Alicante está reduciendo considerablemente los hábitats apropiados para esta planta, por lo que el riesgo de desaparición se ha incrementado en los últimos años, al tiempo que han desaparecido buenos enclaves alternativos para la expansión natural de la especie.

Acciones de conservación:

Se han iniciado trabajos orientados a la caracterización y censo detallado de las poblaciones y al desarrollo de actuaciones de conservación ex situ. También sería recomendable establecer medidas de protección de la especie y del hábitat mediante la declaración de alguna Microrreserva de Flora.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Halopeplis amplexicaulis**

Autor Especie: **(Vahl) Ung.-Sternb. ex Cesati & al.**

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable
Lista roja de Flora Vascular
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ib. Vulnerables

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Hierba anual, de 5-20 cm, glauco-pruinosa, glabra. Tallos erectos o decumbentes; entrenudos más largos que las hojas. Hojas semiamplexicaules, subglobosas, subapiculadas. Espigas numerosas, carnosas; brácteas carnosas, apiculadas. Flores incluidas en la depresión de las brácteas, dispuestas radialmente en torno al eje. Perianto c. 1 mm, membranáceo, brevemente tridentado en el ápice. Estambres con antera amarilla, exerta en antesis. Estilo corto; estigmas más largos que el ovario. Semillas c. 0,5-0,8 mm, pardo-amarillentas, subreniformes, papilosas o tuberculadas en la región dorsal, brillantes. 2n = 18. Florece de junio a agosto. Más información sobre conservación de germoplasma y cultivo en: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=82491&idioma=C

Distribución:

Regiones mediterránea y sáharo-síndica. En la Península Ibérica se localiza en el extremo meridional de Portugal (Algarve) y en determinadas áreas orientales y meridionales de España: Depresión del Ebro (Zaragoza y Teruel), marismas del Guadalquivir (Huelva), litoral de Cádiz y el Hondo (Elx-Crevillent, Alicante). También ha sido citada en Almería y Málaga. Las poblaciones del Hondo son las únicas conocidas en la Comunitat Valenciana. Alicantino.

Hábitat:

Se presenta en pastizales anuales salinos en los que abunda Frankenia pulverulenta o Mesembryanthemum nodiflorum, llegando a formar comunidades prácticamente monoespecíficas (Halopeplidetum amplexicauilis). Estos pastizales se hallan en el seno de saladares litorales, en las zonas despejadas de vegetación perenne de los hábitats de interés

comunitario 1310 "Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas" y 1510* "Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)". Thero-Salicornetalia, Frankenietalia pulverulentae. TM, SA. 0-350 m.

Situación actual:

Las 3 localidades conocidas en los años 80 y 90 no han sido observadas recientemente y se consideran desaparecidas como consecuencia de los cambios de uso del suelo. En la actualidad existe un polígono industrial y pistas deportivas que han provocado la desaparición del hábitat. Recientemente, se han encontrado dos nuevas localidades en el PN del Hondo (Elx-Crevillent, Alicante), donde se han censado cerca de 20.000 ejemplares. Dado su carácter anual, las poblaciones presentan grandes fluctuaciones interanuales, por lo que se debe realizar un seguimiento anual exhaustivo. La mayor población se encuentra en una parcela privada que se labra de forma periódica, por lo que debe realizarse un seguimiento de esta acción, a priori positiva para la eliminación de especies competidoras, pero que debe ajustar sus ciclos para mantener el banco de semillas.

Amenazas:

La pérdida de hábitat por la transformación de las parcelas donde podría aparecer y la sucesión vegetal, la afectan de forma muy negativa. Por otro lado, cualquier modificación intensa del régimen de inundación de los enclaves salinos donde vive, puede dar lugar a importantes variaciones de la dinámica de sus poblaciones, insuficientemente conocida.

Acciones de conservación:

Este taxón es objeto de seguimiento por el equipo del Proyecto AFA y por técnicos de la Conselleria, que han caracterizado la estrategia de colonización y el ciclo de vida de la especie. Una de las poblaciones se incluye en la MRF "El Fondo-Els Racons" y otra se encuentra en una finca propiedad de la Generalitat Valenciana. Las 3 poblaciones actualmente conocidas están dentro del PN del Hondo. Todavía no se han abordado actuaciones de conservación ex situ.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1984 - 2016

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Helianthemum almeriense**
Nombre valenciano: Esteperola morada
Nombre castellano: Jarilla

Autor Especie: **Pau**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Descripción y biología:

Arbusto. Se han descrito dos dos posibles táxones locales: 1) la subsp. scopulorum (Rouy) Alcaraz & al. de optimo murciano, preferentemente sabulícola y de aspecto más cercano a H. almeriense y 2)la var. minutifolium (Pau) Rigual, más cercana a H. violaceum

Distribución:

Endemismo del SE peninsular, que aparece por la Dehesa de Campoamor e inmediaciones.

Hábitat:

Interviene en matorrales calcícolas e incluso sabulícolas de áreas termo y mesomediterráneas semiáridas

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1864 - 2017

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1994

[imprimir]

Nombre científico: **Helianthemum caput-felis**
Nombre valenciano: Esteperola cap de gat
Nombre castellano: Jarilla de cabeza de gato

Autor Especie: **Boiss.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable
Lista roja de Flora Vascular
· En peligro
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Amenazadas
· Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ib. Vulnerables
Convenio de Berna
· Anexo I
Directiva de Hábitats
· Anexo II
· Anexo IV

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Arbusto pequeño, de 7-40 cm, ceniciento o blanquecino. Tallos tomentosos. Hojas 6-15 x 2-5 mm, oblongas, obtusas, gruesas, cortamente pecioladas, blanquecinas y estrellado-tomentosas por ambas caras. Inflorescencia congesta con 5-10 flores; brácteas más cortas que los pedicelos. Cáliz velloso, con apariencia de cabeza de gato cuando cerrado; sépalos externos anchamente ovados, mucronados, verdosos; los internos c. 6 mm, blanquecinos, densamente vellosos. Pétalos 9-12 mm, más largos que el cáliz, amarillos. Cápsula pelosa, más corta que el cáliz. Semillas c. 1,3 mm, foveoladocerebriformes. 2n = 24. Florece de febrero a mayo. Más información sobre conservación de germoplasma y cultivo en: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=82491&idioma=C

Distribución:

Taxon de distribución dispersa en el Mediterráneo occidental, presente en la costa oriental de la Península Ibérica, Baleares, Cerdeña, Italia, Argelia y Marruecos. En la Comunitat Valenciana ocupa una estrecha franja en el litoral costero de las comarcas alicantinas de La Marina Alta, desde el Portet de Moraira (Teulada) hasta el Penyal d'Ifac (Calpe), donde ya fue indicada por Cavanilles, y el Baix Segura, desde la Punta Prima (Torrevieja) hasta la Punta de La Horadada (Pilar de la Horadada). Diánico, Alicantino y Murciano Meridional.

Hábitat:

Especie que crece en ambientes costeros con elevada insolación, en taludes próximos al mar y en matorrales abiertos o muy degradados, xerófilos y heliófilos sobre suelos de naturaleza caliza, arenosa e incluso margosa. Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae. TM, SA-SE. 0-100 m.

Situación actual:

En la Marina Alta, su distribución es prácticamente continua entre los puntos indicados, aunque sólo cuenta con dos núcleos poblacionales importantes: Cala de les Bassetes (Benissa), donde se han censado más de 1200 individuos, y Portet de Moraira, con unos 1000 ejemplares. El resto de poblaciones son más pequeñas y no disponen de censos actualizados. La situación en el sur de Alicante no parece muy alentadora, con una fuerte fragmentación de las poblaciones. Aunque puede formar núcleos relativamente densos, sólo resulta localmente abundante al sur del Barranco Rubio y al norte de Cap Roig (Orihuela). Los censos realizados en estas poblaciones superan los 10.000 ejemplares. Las estimaciones realizadas a mediados de los 90 obtuvieron valores totales entre 70.000 y 150.000 plantas. Existe un pliego de herbario de 1955, recolectado en Santa Pola (Alicante), donde la planta no ha vuelto a ser encontrada.

Amenazas:

Gran parte de las poblaciones de esta especie, con núcleos relativamente grandes hasta época reciente, se han visto significativamente reducidas y fragmentadas por la destrucción de su hábitat, como consecuencia del desarrollo urbanístico y otras acciones asociadas (infraestructuras, zonas de ocio y deporte, vertederos ilegales, adecuaciones del litoral, etc.). Al alarmante descenso observado de sus efectivos deben unirse riesgos más recientes, como la creciente competencia que sufren por la antropización del hábitat y la expansión de diversas especies alóctonas invasoras. La fragmentación ha generado núcleos poblacionales excesivamente pequeños, cuya viabilidad puede estar comprometida por razones genéticas.

Acciones de conservación:

Esta especie cuenta con medidas de protección a escala autonómica desde 1985; además está incluida en la Directiva de Hábitats y en el Convenio de Berna. Se mantienen semillas en los bancos de germoplasma del JBUV y CIEF, que han establecido los protocolos de germinación y producción de planta. Los ejemplares producidos en vivero han sido destinados a acciones puntuales de refuerzo poblacional y para la creación de colecciones vivas de plantas. 5 poblaciones están incluidas en Microrreservas de Flora y son objeto de seguimiento periódico por técnicos de la Conselleria.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1797 - 2017

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Helianthemum viscarium**

Autor Especie: **Boiss. & Reut.**

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Autor Foto: Luis Serra

Descripción y biología:

Planta perenne sufruticosa

Distribución:

Es endémica del SE de la Península Ibérica (Almería, Murcia y Alicante) y del N de África (Argelia y Marruecos). En el territorio valenciano se encuentra en la comarca del Baix Segura

Hábitat:

Forma parte de matorrales y tomillares instalados sobre suelos calizos pedregosos

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1984 - 2012

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1994

[imprimir]

Nombre científico: **Ipomoea indica**
Nombre valenciano: Campanetes de jardí
Nombre castellano: Enredadera

Autor Especie: **(Burm.) Merr.**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
- Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

planta herbácea trepadora y perenne que llega a medir 15 m de longitud, que crece reptando por el sustrato o, más frecuentemente, sobre árboles y arbustos en orillas de bosques o ríos. Tallos cubiertos de pelos curvados hacia atrás. Hojas dispuestas de manera alterna de 5-18 cm de longitud y 3,5-16 de anchura con peciolos de 2-18 cm de longitud. Su morfología es muy variable y en una misma planta pueden verse algunas con forma de corazón hasta otras tri-lobuladas acabadas en una punta aguda. Ambas caras de la hoja están recubiertas de pelosidad. Las flores son de gran tamaño (7-10 cm de diámetro), con corola en forma de embudo de color azul-purpúreo intenso con un tubo central rosado o blanquecino. Esta especie se reproduce y distribuye fundamentalmente a partir de fragmentos que producen nuevas raíces en los nudos.

Distribución:

Es una especie de distribución pan-tropical cuyo origen es incierto.

Hábitat:

Es una planta propia de bosques tropicales húmedos. Generalmente crece en sitios perturbados, comportándose como colonizador oportunista. Requiere lugares abiertos con suficiente humedad y nutrientes abundantes para desarrollarse vigorosamente. Es una especie sensible a las heladas intensas.

Situación actual:

Se encuentra ampliamente distribuida en la Comunitat Valenciana. Por su hábito trepador y su crecimiento vigoroso tiene capacidad para competir con la vegetación nativa. Sin embargo, solo supone un problema de conservación importante de manera muy localizada y nunca se observan grandes infestaciones, como ocurre en otras zonas del mundo, tal vez porque el territorio valenciano solo ofrece condiciones marginalmente adecuadas para su desarrollo vigoroso.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1983 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Lafuentea rotundifolia**
Nombre valenciano: Orelleta de penya
Nombre castellano: Orejilla de roca

Autor Especie: **Lag.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Autor Foto: Luis Serra

Descripción y biología:

Hierba perenne leñosa en la base

Distribución:

Endemismo del cuadrantte sudoriental del Península Ibérica, que alcanza la parte meridional de la provincia de Alicante en las Sierras de Crevillente, Callosa y Orihuela

Hábitat:

Habita en roquedos calizos soleados y algo nitrófilos de las áreas cálidas y secas del piso termomediterráneo.

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1816 - 2009

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1994

[imprimir]

Nombre científico: **Lantana camara**
Nombre castellano: Banderita española

Autor Especie: **L.**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Descripción y biología:

Arbusto perenne de hasta 2 m que se ramifica abundantemente y adquiere morfologias diversas. Las partes jóvenes de la planta aparecen cubiertas por pilosidad. Las hojas son ovadas, pecioladas y opuestas, de color verde oscuro. Las flores aparecen reunidas en inflorescencias y son de color, desde anaranjado a amarillo. Produce un número elevado de frutos por inflorescencia, unos 24 como media y una planta de tamaño medio puede producir unos 12.000. Se trata de una especie capaz de rebrotar de cepa. No es consumida por herbívoros, dado su carácter tóxico.

Distribución:

Es una especie originaria de America Central y del norte de Sudamérica. En la actualidad se encuentra distribuida por más de 50 países, la mayor parte del África subsahariana y regiones tropicales, subtropicales y templadas de Asia. En Europa su naturalización todavía es incipiente, y solo se conoce de España, Italia y Portugal.

Hábitat:

Es una planta que invade ecosistemas alterados y abiertos, como eriales, cunetas o depoósitos fluviales. Necesita condiciones de elevada insolación por lo que no puede competir con especies arbóreas que produzcan sombra.

Situación actual:

Lantana es considerada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza uno de los 100 organismos invasores más peligrosos del mundo. Se conoce 650 variedades con capacidades de invasión diferentes y se sabe que sus poblaciones se expanden activamente en numerosas regiones del mundo, donde provocan severos impactos tanto en agricultura como en ganadería. También provoca serios daños a los sistemas naturals. Se han llevado a cabo numerosos programas de control durante un siglo y, aun así, se trata de una especie que provoca serios problemas en gran número de paises. En la Comunitat Valenciana se conocen escasas poblaciones naturalizadas en la Comarca de la Ribera Baja, si bien no existen datos definitivos sobre su posible interferencia en los ecosistemas Valencianos. Es por tanto necesario un mayor conocimiento del estatus de esta especie en nuestro territorio.

Amenazas:

Es una especie invasora agresiva en mas de 50 países. Provoca serios impactos sobre ecosistemas modificados por el hombre como sobre ecosistemas naturales. Es venenosa para el ganado y el hombre. Las hojas y los frutos producen fotosensibilización y desórdenes gástricos en ganado. Es responsable directa de la rarefacción de especies de flora y de hábitats naturales, en lugares como las Islas Galápagos y Nueva Caledonia.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1985 - 2017

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Launaea arborescens**

Autor Especie: **(Batt.) Murb.**

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro crítico

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ia. En Peligro de Extinción



Ver más imágenes

Descripción y biología:

Arbusto hasta de 150 cm, espinoso, denso. Tallos glabros, con numerosas ramificaciones divaricadas, en ángulo aproximadamente recto, muy intricados. Hojas caulinares enteras y lineares, o pinnatipartidas con segmentos linerares. Brácteas involucrares hasta de 12 mm, con margen escarioso, en varias filas imbricadas. Flores amarillas, con lígulas que pueden presentar una línea de color verde oliva. Fruto en aquenio, más estrecho en la base que en el ápice, papiloso; vilano de pelos simples dispuestos en varias filas. 2n = 16. Florece de marzo a mayo. Dispersión anemocora.

Distribución:

Mediterráneo SW e Islas Canarias. En la Península Ibérica tiene una distribución litoral y sublitoral más o menos continua entre Calblanque (Murcia) y La Rábita (Almería). En la Comunitat Valenciana, alcanza la provincia de Alicante

de forma finícola, con poblaciones en las comarcas de Baix Segura, Baix Vinalopo y Marina Baixa, que constituyen el límite septentrional de su distribución peninsular. Una cita de O. de Bolòs y J. Vigo la sitúa en áreas algo más interiores, al S de Orihuela, pero se carece de información complementaria. Alicantino.

Hábitat:

Forma parte de matorrales subnitrófilos secos que se instalan sobre terrenos yermos más o menos alterados y en márgenes de caminos, siempre en áreas de ombrótipo semiárido que no superan los 100 m de altitud. En Santa Pola forma parte de la comunidad dominada por Withania frutescens. Salsolo vermiculatae- Peganetalia harmalae. TM, SA. 5-10 m.

Situación actual:

De las cuatro poblaciones conocidas, tres de ellas contaban con un único ejemplar; en la cuarta, los últimos censos habían contabilizado 5 individuos. Sin embargo, los rastreos realizados en 2008 en todas estas áreas y sus alrededores resultaron infructuosos excepto en Santa Pola, la localidad con mayor número de ejemplares. Aquí sólo se ha observado un individuo de grandes dimensiones cuyas semillas aparecen total o parcialmente consumidas por insectos. Este mismo año, técnicos de la Conselleria localizaron otro ejemplar en Villajoyosa, en una localidad diferente a la conocida hasta ahora en el río Sella.

Amenazas:

Además de los riesgos asociados con la escasez generalizada de individuos, L. arborescens se encuentra amenazada por la presión urbanística sobre los medios que habita, especialmente en áreas litorales, las prácticas agrícolas y la ampliación de canteras. Estos factores provocan una drástica reducción de los hábitats óptimos que pueden ser colonizados y pueden ser los responsables de la desa parición de algunas de las poblaciones conocidas o comprometer la supervivencia del resto. En esta situación, la incidencia de fenómenos ambientales o demográficos estocásticos o las alteraciones asociadas con las actividades antrópicas puede provocar la extinción de la especie en nuestro territorio. Además, la escasa producción de semillas, su consumo por insectos y la ausencia de germinación comprometen más todavía su supervivencia.

Acciones de conservación:

Se han desarrollando trabajos exhaustivos de cartografía y censo de las poblaciones, que han incluido prospecciones en áreas próximas para la localización de nuevos núcleos poblacionales. También se han recolectado semillas del ejemplar existente en Santa Pola, pero sin obtenerse resultados favorables de germinación. Una de las poblaciones queda incluida en el LIC Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor. Dadas las circunstancias que afectan a esta especie, es imprescindible mantener e, incluso, intensificar la búsqueda de nuevos ejemplares y el seguimiento exhaustivo de los actualmente conocidos.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1985 - 2017

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Launaea lanifera**

Autor Especie: **Pau**

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ia. En Peligro de Extinción

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Arbusto hasta de 50 cm, espinoso. Tallos leñosos y densamente lanosos en la base, con numerosas ramificaciones divaricadas, en angulo aproximadamente recto, muy intricados. Hojas basales, de dentadas a pinnatisectas, divididas en segmentos triangulares, enteros o ligeramente espinulosos, densamente lanosas en la axila. Inflorescencia en capítulo terminal hasta de 14 mm; brácteas de margen escarioso. Fruto en aquenio, más estrecho en la base que en el ápice, con cuatro costillas prominentes, transversalmente rugosas y glabras; vilano hasta de 8 mm, persistente. n = 9; 2n = 18. Florece de marzo a mayo. Dispersión anemócora o epizoócora.

Distribución:

Su distribución mundial abarca el SE de la Península Ibérica, el N de África y Arabia. Se trata de un iberoafricanismo cuya población más septentrional se hallaría en la Comunitat Valenciana, concretamente en la localidad alicantina de Aspe, perteneciente al territorio lucéntico. Alicantino.

Hábitat:

Forma parte de los matorrales y albardinales termófilos, despejados, en ambientes secos e insolados, sobre suelos poco profundos. Anthyllidetalia terniflorae (Melico-Phagnalion intermedii). TM, SA. 240 m. de germinación que han resultado negativos. Se dispone de semillas en el BGFSV.

Situación actual:

Las localidades alicantinas se localizan en la Sierra Negra (Aspe) y en el Cap Roig (Orihuela). En esta última localidad se recolectó material para el Banco de Germoplasma de Flora Silvestre Valenciana (JBUV) en 1996, sin que haya sido observada con posterioridad. La primera localidad constituye el límite septentrional de su distribución y consiste en un rodal de muy pocos individuos que manifiestan un escaso desarrollo, aunque la presencia de ejemplares jóvenes denota que la población mantiene cierta capacidad reproductiva, que no ha sido confirmada por los recientes ensayos de germinación. Los censos realizados en 2008 y 2009 han contabilizado únicamente 25 y 11 individuos, respectivamente.

Amenazas:

La ausencia de incremento poblacional desde el descubrimiento de las plantas alicantinas, la escasa producción de semillas y los problemas germinativos apuntan a un fuerte empobrecimiento genético. La población también se encuentra amenazada por el desarrollo de un polígono industrial y diversas urbanizaciones, y puede verse afectada por trabajos y repoblaciones forestales si no se tiene en cuenta su ubicación. Sería aconsejable crear nuevas poblaciones de seguridad en áreas próximas de titularidad pública.

Acciones de conservación:

Los trabajos de conservación se han centrado en la localización y censo de las poblaciones conocidas y el rastreo de áreas próximas para la localización de nuevos núcleos poblacionales. También se han recolectado semillas y se han realizado ensayos

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1994 - 2016

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Leucaena leucocephala**

Autor Especie: **(Lam.) De Wit**

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex I

Ver más imágenes

Descripción y biología:

La Acacia pálida es un árbol mediano desprovisto de espinas, siempre verde, que puede alcanzar los 18m de altura. Posee hojas alternas bipinnadas con hasta 10 pares de segmentos. Se distingue de todas las demás mimosas por sus flores, ya que las anteras son pelosas y también por sus grupos (5-20) de grandes legumbres de hasta 19cm, colgantes, aplanadas y papiráceas. Estas legumbres se abren pasivamente y encierran entre 8 y 18 semillas.

Distribución:

Esta leguminosa, fijadora de nitrógeno y de crecimiento rápido es un árbol de origen neotropical, distribuido de modo natural por Méjico y América Central. Ha sido introducida en la mayoría de zonas tropicales y subtropicales del mundo, como ornamental y sobre todo como forrajera, pero también como cortavientos o como biocombustible. Hoy en día está naturalizada en todas las zonas de clima cálido del planeta.

Hábitat:

L. leucocephala es una invasora de hábitats abiertos, a menudo costeros o ribereños, seminaturales, alterados o ruderales. No se dispone de referencias acerca de su carácter invasor de zonas bien conservadas, con vegetación bien estructurada. Es una especie capaz de tolerar la escasez de precipitación y los periodos de sequía prolongados de hasta 8 meses y también la salinidad y el sombreado moderado. Sin embargo es bastante sensible al frío y no tolera las heladas intensas. En términos generales su hábitat óptimo son las áreas tropicales secas.

Situación actual:

Si bien es nativa de Méjico y America Central su área de distribución original ha sido difuminada por su cultivo como planta forrajera. En la actualidad tiene una distribución pantropical. Se ignora cuándo se introdujo en España. La primera cita en nuestro país corresponde a Tarragona, donde se localizaron ejemplares subespontáneos en 1989 en terrenos baldíos. En la Comunidad Valenciana es todavía poco abundante. Pueden verse ejemplares dispersos en barrancos y márgenes de vías de comunicación.

Amenazas:

L. leucocephala está clasificada como uno de los 100 organismos más invasores del mundo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se comporta como un invasor agresivo de zonas alteradas en numerosas regiones tropicales y subtropicales, formando densos bosquetes monoespecíficos y provocando la eliminación de la vegetación natural. Incluso aunque los terrenos colonizados no sean valiosos de la biodiversidad que albergan, su invasión supone un problema ya que impide el acceso y dificulta cualquier otro uso.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 2007 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro
Año ficha: 2011

[imprimir]

Nombre científico: **Limonium lobatum**
Nombre castellano: Siempreviva azul menor

Autor Especie: **(L. fil.) Chaz.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ia. En Peligro de Extinción

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Hierba anual, de 4-28 cm, con pelos erectos.Hojas 20-100 x 7-26 mm, de glabras a densamentepelosas. Escapo florífero glabro o con pelos cortos.Espiguillas 8-10 mm, generalmente con 2 flores;bráctea externa 2,1-3 x 1,3-2,3 mm, triangularovada;bráctea media 3,1-3,9 x 1,4-2,4 mm; brácteainterna 6-8,2 x 4,1-5,1 mm, de triangular a oblonga,con ápice trilobulado. Flores 5,5-7 mm de diámetro.Cáliz 9,5-12,3 mm; tubo glabrescente; margen claramentedentado, ± azul pálido, con dientes muy grandes,de 2-3 mm. Pétalos 9,2-11,2 x 1,8-2,4 mm. 2n =12. Florece de abril a agosto. Más información sobre conservación de germoplasma y cultivo en: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=82491&idioma=C

Distribución:

Se extiende por el S de las regiones mediterráneae irano-turaniana; a consecuencia de su naturalizacióntambién está presente en otras regiones,como Australia. En el Mediterráneo Occidental,alcanza el SE semiárido de la Península Ibérica, apareciendoen la Comunitat Valenciana en escasaslocalidades en el territorio Lucéntico, concretamenteen Elx, Santa Pola y Orihuela (Alicante).Murciano-Meridional y Alicantino.

Hábitat:

Forma parte de pastizales anuales secos, sobresuelos margosos y calizos, algo salinos o ligeramentenitrificados, en ambientes semiáridos próximos ala costa. Stipion retortae. TM, SA. 50 m.

Situación actual:

Conocido en Alicante desde finales del sigloXIX, concretamente en la Rambla de Elx, no se volvió a encontrar hasta mediados del XX, en la Sierra deOrihuela. Estas primeras poblaciones alicantinas seconsideran extintas. Actualmente, se encuentra en una situación alarmante en nuestro territorio, yaque sólo se conocen dos poblaciones próximas, descubiertas recientemente en Els Bassars (Elx) y ElCarabassí (Santa Pola), ambas con muy pocos ejemplares.En los últimos rastreos, no se han observado ejemplares en estas áreas, pero se ha localizado unnuevo núcleo poblacional, próximo a la Playa delCarabassí, con más de 3500 ejemplares.

Amenazas:

El escaso número de localidades, que muestran fluctuaciones interanuales extremas, relacionadas con las condiciones climáticas, y la destrucción de los hábitats potenciales por las transformaciones urbanísticas en Elx y Santa Pola, constituyen sus principales factores de riesgo. Su carácter anual y la dependencia de las lluvias invernales que muestra, produce notables fluctuaciones en el tamaño y en el éxito reproductivo de sus poblaciones.

Acciones de conservación:

Se ha realizado un rastreo exhaustivo del territorio para la localización precisa de las diferentes poblaciones, la obtención de datos demográficos, recolección de semillas, que han sido depositadas en los bancos de germoplasma del JBUV y del CIEF, y la obtención de los protocolos de germinación y producción de planta. El material producido podría ser utilizado en acciones de introducción benigna o refuerzo poblacional, especialmente en el núcleo incluido en la porción terrestre del LIC l'Illa de Tabarca (Santa Pola) que cuenta con mayores garantías para la estabilidad y conservación de sus posiciones ecológicas más favorables.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1947 - 2015

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Limonium santapolense**
Nombre valenciano: Trenca l'olla de Santa Pola
Nombre castellano: Limonio

Autor Especie: **Erben**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable
Lista roja de Flora Vascular
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Autor Foto: Emilio Laguna

Descripción y biología:

Perenne, glabra, de hasta 70 cm de altura. Hojas grandes, elípticas u obovadas, de ápice obtuso y mucronado, multinervias, persistentes en la floración. Pecíolo de longitud similar al limbo. Ramas estériles escasas. Espigas con 3-4 espiguillas por centímetro. Brácteas internas de 3,8-4 mm de anchura, elípticas y con ancho margen hialino. Pétalos rojo-violáceos. Florece de mayo a julio.

Hábitat:

Habita sobre suelos arenosos salobres de las salinas de las ¿reas temomediterráneas semiáridas cercanas a Santa Pola, donde resulta localmente abundante, conociéndose igualmente de los saladares del Hondo y de Aguamarga, Elche y Crevillente. Convive con otras especies del género, produciendo formas hibrid-genas que hacen, a veces, difícilmente reconocibles los individuos puros.ó'ó'

Situación actual:

Aunque es un taxon del que todavía no se conoce bien su distribución, hasta la fecha parece estar localizado exclusivamente en la zona indicada del sur de la provincia de Alicante, por lo que sería otra de las numerosas plantas que se conservar'an si se protegiesen los ecosistemas salinos litorales, tan ricos en especies de interés corológico y ecológico

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1957 - 2016

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1998

[imprimir]

Nombre científico: **Limonium thiniense**
Nombre valenciano: Ensopeguera menuda
Nombre castellano: Saladilla menor

Autor Especie: **Erben**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Lista roja de Flora Vascular
· Vulnerable

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Descripción y biología:

Planta perenne, escaposa, poco leñosa en la base, grácil, poco ramosa, subglabra. Hojas de la roseta basal espatuladas, obtusas, mucronuladas, de 30-60 7-20 mm, con 3-5 nervios, ligeramente onduladas en los márgenes y en parte secas durante la floración, con pecíolo de 1-2 mm de anchura y menor que el limbo. Tallos de hasta 30(40) cm de altura, subverrugosos, en ocasiones muy ligeramente papilosos en la parte inferior, con escamas basales de 3-5 mm de longitud. Inflorescencia ramosa, con ramas estériles ausentes o muy escasas (1-3), las fértiles levemente dísticas. Espigas laxas, de 3-9 cm de longitud. Espiguillas laxamente dispuestas, 2-3 por centímetro, con 1-3 flores cada una. Bráctea externa de 1.5-1.7 1.5-1.8 mm, oval-triangular, largamente acuminada y con ancho margen hialino. Bráctea media de 1.6-1.8 1.0-1.2 mm, hialina y algo coriácea. Bráctea interna de 4.0-4.2(4.4) 2.6-2.8 mm, con margen hialino estrecho y acumen de 0.5-0.8 mm. Cáliz de 4.4-4.8 mm de longitud, peloso, levemente arqueado y lacerado tras la floración, con el limbo 2-3 veces mayor que el tubo. Pétalos cuneados, de 7.0-7.5 1.5-1.7 mm, de color rojo-violáceo pálido y ligeramente emarginados. Florece de junio a agosto.

Distribución:

Endemismo del sudeste ibérico hasta ahora conocido únicamente de unos pocos puntos de las provincias de Albacete, Alicante y Murcia (ERBEN, 1993), pero cuya área debe ser bastante mayor. En Alicante sólo ha sido visto en algunos puntos dispersos, desde Villena hasta la zona litoral comprendida entre Santa Pola y La Marina (Elche).

Hábitat:

Se desarrolla principalmente en suelos compactados, salinos y más o menos arenosos, formando parte de albardinares de áreas termo- y mesomediterráneas semiáridas.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1955 - 2016

Autor ficha: Crespo Villalba, M. B; Lledó Barrena, Mª D. El género Limonium Mill. (Plumbaginaceae) en la Comunitat Valenciana: taxonomía y conservación. 1998. Conselleria de Medio Ambiente. Generalitat Valenciana. 115 pp.
Año ficha: 1998

[imprimir]

Nombre científico: **Linaria arabiniana**

Autor Especie: **M.B. Crespo, De la Torre & Solanas**

Nombre valenciano: Esperonet
Nombre castellano: Palomilla

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable

Autor Foto: Luis Serra

Descripción y biología:

Bienal o perenne, glabra y glauca, con hojas lineares o estrechamente oblanceoladas, en su mayor'a verticiladas. Eje de la inflorescencia glabro. Flores amarillentas, raramente violáceas, con paladar anaranjado y espolón recto y agudo. Pedúnculo fructífero de 2-3 mm. Semillas con disco negro y liso, y ala entera y blanquecina. Florece de marzo a mayo.♂♂

Hábitat:

Habita en arenales litorales más o menos fijados, formando parte del matorral sabulícola, bajo condiciones bioclimáticas termomediterráneas semi¿ridas a secas.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1962 - 2008

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1998

[imprimir]

Nombre científico: **Linaria depauperata ssp. hegelmaieri**

Autor Especie: **(Lange) De la Torre, Alcaraz & M.B. Crespo**

Nombre valenciano: Gallet, gallets morats
Nombre castellano: Palomilla

Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Autor Foto: Emilio Laguna

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Planta anual, glauca y glabra. Hojas lineares, en su mayoría alternas, sólo las inferiores verticiladas. Eje de la inflorescencia com¿nmente glabro. Corola de 20-25 mm, con labios rojizos, tubo y espolón amarillentos. Disco de la semilla con tubérculos de hasta 0,4 mm. Florece de abril a junio.

Distribución:

Tiene su localidad clásica cerca de Villena, presentando ligeras irradiaciones hacia Murcia.

Hábitat:

Habita sobre sustratos sueltos, formando parte de pastizales laxos bajo bioclima termo-mesomediterráneo seco, en arenales algo lavados del interior

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1887 - 2016

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1998

[imprimir]

Nombre científico: **Lonicera biflora**
Nombre valenciano: Lligabosc valencià
Nombre castellano: Madreselva

Autor Especie: **Desf.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas



Ver más imágenes

Descripción y biología:

Planta de hasta 4 m de altura, trepadora, con tallos en lianas flexibles, pardos cuando son jóvenes, provistos de hojas opuestas, pecioladas, ovadas, algo más largas que anchas, con el anverso verde y glabro y el reverso grisáceo y pubescente. Flores en parejas (a veces 3) sobre pedúnculos axilares, sin brácteas, de color blanco-amarillento. Fruto carnoso, negro y redondo. Semillas pequeñas, castañas, cóncavas, provistas de una dura cubierta externa, asurcadas longitudinalmente.

Distribución:

Es una especie que se distribuye preferentemente en oeste del mediterráneo; en la Comunidad Valenciana la encontramos en las provincias de Alicante y Valencia concretamente en Sumacárcer, bosque ribereño, en Sueca, Cullera y en La Safor en Gandía, la marjal del Grao, en el margen de camino que atraviesa la marjal.

Hábitat:

Crece en ambientes riparios, como cañaverales, sobre suelos arcillosos-limosos, junto a especies como Cynanchum acutum, Vinca difformis, Calystegia sepium, Arundo donax, etc.

Situación actual:

Las poblaciones naturales que crecen en la Comunidad Valenciana son puntuales y tienen pocos ejemplares. En el río Segura, se conocen 3 poblaciones que en conjunto no deben superar los 500 individuos. Por otro lado, las poblaciones de Sueca, Algemesí (Río Júcar), Gandía y Cullera no alcanzan los 200 individuos.

Amenazas:

Las poblaciones de Lonicera biflora en la Comunidad Valenciana son escasas y cuentan con pocos ejemplares, lo que las hace más vulnerables a la extinción. Además, los hábitats ribereños están sometidos a frecuentes perturbaciones, tanto de modo natural como inducidas por el hombre, como por ejemplo desecación, urbanización del entorno, contaminación. También pueden verse afectadas por la competencia de especies vegetales exóticas.

Acciones de conservación:

Se han recolectado semillas en las poblaciones naturales para obtener y ensayar las técnicas de germinación y propagación más adecuadas. Se mantienen semillas de esta especie en el Banco de Germoplasma del Jardí Botànic de la Universitat de València. Con los ejemplares que se han ido obteniendo se ha realizado acciones de restauración e introducción en campo para generar nuevos núcleos poblacionales, concretamente se ha plantado ejemplares en la Reserva de samaruc de Algemesí y en el Ullal de Baldoví, ambas en el Parque Natural de a Albufera. En la reserva de Algemesí la plantación se realizó ya hace unos años y se ha podido observar una propagación natural de los ejemplares plantados, en el caso del Ullal de Baldoví, las plantaciones se ha realizado en 2006 por lo que todavía no es posible establecer el éxito de esta introducción.

Mapa de distribución:

Acercar a



Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1801 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro, Carlos Peña, Aruca Sebastián
Año ficha: 2008

[imprimir]

Nombre científico: **Lonicera japonica**

Nombre castellano: Madreselva

Autor Especie: **Thunb.**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA Liana robusta que puede alcanzar los 5 metros, con hojas pecioladas y un poco brillantes, inicialmente pubescentes. Flores en parejas, de color blanco, con tubo de color crema y labios desiguales

Distribución:

Planta originaria del este de Asia, naturalizada en Europa y gran parte del mundo (Ásia, Hawaii, Norteamérica, Brasil, Argentina, Australia y Nueva Zelanda), donde se comporta como invasora. En América es considerada como una planta invasora muy peligrosa, incluso en zonas forestales. En España se localiza fundamentalmente en el Pais Vasco y en Cataluña y, en menor medida, en la Comunitat Valenciana.

Hábitat:

Se naturaliza en ambientes riparios fundamentalmente. Crece de manera óptima en suelos ricos en condiciones de iluminación elevada, pero tolera bien la sequía.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana se localiza puntualmente en sotobosques de bosques de ribera, donde convive con otras alóctonas, como Hedera colchica, Lonicera japonica, Fallopia baldschuanica, Vitis riparia, etc.

Amenazas:

Es una especie de crecimiento muy rápido, cuyos tallos tienen capacidad de enraizamiento. Tiene una gran capacidad para movilizar recursos y compite de manera eficaz con las comunidades vegetales autónomas por la luz. Puede trepar por encima de los arbustos y llega a cubrirlos completamente. Es capaz de crecer durante el invierno, cuando la mayoría de las especies autóctonas se encuentran inactivas. Tiene capacidad de rebrote después de ser cortada, lo

que dificulta su eradicación. En la Comunitat Valenciana no se comporta, por ahora, como planta invasora pero si como especie naturalizada. Es muy ampliamente utilizada en jardines, desde donde escapa a zonas contiguas.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1982 - 2017

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Maytenus senegalensis ssp. europaea**

Autor Especie: **(Boiss.) Rivas-Mart. ex Güemes & Crespo**

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ib. Vulnerables

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Arbusto 1-2 m, glabro, con ramificación intricada, muy espinoso. Hojas 1-3 x 0,3-0,6 cm, de ovado-oblongas a obovado-rómbicas, enteras, largamente cuneadas, a veces glaucas. Inflorescencia densa, 3-4 veces bifurcadas. Flores pentámeras, de 4-6 mm de diámetro. Estambres 5. Cápsula 4-5 mm de ancha, globosa, bilocular o unilocular por aborción. Semillas marrón rojizas, brillantes. Florece de julio a septiembre.

Distribución:

Elemento iberonorteafricano distribuido por el SE de la Península Ibérica y el N de África (Marruecos y Argelia). En España se extiende por el litoral del cuadrante sudoriental, con su área centrada en la provincia Murciano-Almeriense, con irradiaciones locales hacia la Bética y la Catalano-Provenzal- Balear, desde los montes de Torremolinos (Málaga) hasta el Cap de la Nau (Xàbia, Alicante). En la Comunitat Valenciana ha sido citada en la Serra de Callosa (Callosa de Segura, Alicante) y en el Cap de la Nau. Diánico, Setábico y Murciano Meridional.

Hábitat:

Matorrales espinosos y cambronales de las zonas litorales cálidas, libres de heladas y con importantes criptoprecipitaciones de origen marino, preferentemente sobre suelos profundos de margas, aunque también ocupa roquedos calizos o ramblas, entre el nivel del mar y los 600 m de altitud. Las poblaciones alicantinas forman parte de matorrales de Querco cocciferae-Lentiscetum subass. rhamnetosum angustifolii, en la localidad de Xàbia, y de Mayteno-Periplocetum angustifoliae, en la localidad de Callosa. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni. IM-TM, SE-SA. 80-100 (600) m.

Situación actual:

Citada en dos localidades alicantinas, aunque la población de la Sierra de Callosa no ha sido localizada. La población septentrional forma parte de las maquías calcícolas del Cap de la Nau, un hábitat que no se corresponde con su óptimo ecológico, y está constituida por dos núcleos poblacionales separados unos 340 m. El tamaño poblacional de uno de los núcleos ha sido estimado en unos 200 individuos que muestran una buena dinámica poblacional, con ejemplares pertenecientes a todas las etapas de desarrollo en una población aparentemente bien estructurada.

Amenazas:

Las dos zonas de localización presentan entornos alterados por la expansión urbana o residencial. En el caso de Callosa, donde no se han relocalizado los ejemplares a pesar de su intensa búsqueda, existe además una fuerte afección local por la minería a cielo abierto y las transformaciones agrarias. La población del Cap de la Nau, además de presentar riesgos asociados a su escaso número de efectivos, coloniza zonas cercanas a otras que han sufrido colpasos del sustrato por efecto de la erosión marina remontante.

Acciones de conservación:

Las dos zonas, donde se conoce o se ha citado, forman parte de LIC de la Red Natura 2000, aunque en el Cap de la Nau, la población carece de protección adicional, que se obtendría parcialmente al ampliar la microrreserva existente en la zona. Esta poblaciones ha sido censadas y georreferenciadas, recolectándose semillas que se han incorporado a los bancos de germoplasma del JBUV y del CIEF, donde se está ensayando el protocolo de germinación y cultivo de la especie. Es conveniente acometer estudios de biología reproductiva de la especie. En este aspecto, se ha observado que ejemplares mantenidos en la rocalla del CIEF son habitualmente visitados por diversas especies de himenópteros y dípteros, incluyendo hormigas y moscas domésticas, respectivamente. En el desarrollo del proyecto LIFE hábitats se desarrollaron plantaciones experimentales de algunos ejemplares en la Sierra de Callosa de Segura, de origen genético cercano (Murcia). La especie goza de protección en Murcia y Andalucía.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1984 - 2016

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Nicotiana glauca**
Nombre valenciano: Tabac de jardí
Nombre castellano: Tabaco moro

Autor Especie: **R.C. Graham**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
· Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INAVASORA. Arbusto poco ramificado, perenne y de color verde glauco, que puede alcanzar los 10 metros de altura. Hojas verde grisáceas, gruesas y correosas, sin pelos, con formas variables, desde ovadas a elípticas o lanceoladas, de 5 a 25 cm. Flores amarillas de 3-4cm, tubulares, agrupadas en espigas erectas. Florece en primavera y verano ¿ pero puede florecer todo el año en áreas litorales cálidas-, momento en que produce una elevada cantidad de semillas que son dispersadas por el viento o el agua con mucha facilidad - las plantas adultas pueden producir hasta un millón de estas pequeñas semillas -. Las semillas germinan a temperaturas de 7°C. Es una planta de crecimiento rápido, especialmente en los estadíos juveniles, en que posee hojas de mayor tamaño que posibilitan una mayor

productividad. Ya durante el primer año las plantas pueden florecer y, en condiciones óptimas, a alcanzar los tres metros de altura.

Distribución:

Especie procedente de Sudamérica (Argentina, Paraguay, Bolivia) que ha sido introducida en áreas templadas de América (México), África, Asia (Israel), Australia e Islas oceánicas (Santa Helena). Se considera invasora en algunos estados de Estados Unidos, como Arizona, Florida, Nevada, California o Tejas. En las islas Baleares ¿ donde Nicotiana es muy frecuente en lugares alterados y degradados - se considera una especie invasora muy peligrosa. En el parque nacional de Doñana se realizan tareas para su control. En Lanzarote y fuerteventura la planta es especialmente problemática, y ha sido objeto de un plan de erradicación en el parque de Timanfaya. Se encuentra presente en todas las islas canarias.

Hábitat:

Puede vivir tanto en ambientes áridos (por ejemplo se comporta como invasora en la isla de Lanzarote, en el archipiélago Canario) como en ambientes húmedos (en las Baleares coloniza los márgenes de torrentes). Resiste la sequía y tolera los daños mecánicos, pero no a las heladas fuertes, el encharcamiento o la sombra densa.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana invade con facilidad baldíos y matorrales nitrófilos próximos a poblaciones o áreas cultivadas. En el subsector Alicantino ocupa Comunidades de Onopordenion macracanthi y Atriplicenion glaucae, mientras que en el Alto Mijares se presenta en Comunidades de Pegano-Salsoletea. Se ha utilizado como fijadora del sustrato en los taludes de la Autopista AP-7. En la Comunitat Valenciana, la mayoría de las poblaciones de la especie se encuentran en ambientes nitrófilos. Por lo tanto, no resulta una especie problemática para hábitats naturales de interés. No obstante, en ocasiones coloniza ciertos enclaves en los que se debería abordar su erradicación. Por ejemplo, se han observado individuos sobre las dunas fósiles de la Serra Gelada (Benidorm), que de extenderse plantearían problemas de competencia con la delicada vegetación dunar allí asentada. Es una de las especies estudiadas con mayor índice de ocupación de cuadrículas (n= 44), aunque se encuentra mejor distribuida en las provincias de Valencia y Alicante. En esta última provincia, el 29,3% de las cuadrículas presentan la especie, tratándose de la segunda especie alóctona mejor distribuida, después de Opuntia maxima. En la Comunidad Valenciana, la mayoría de las poblaciones de la especie se encuentran en ambientes nitrófilos. Por lo tanto, no resulta una especie problemática para hábitats naturales de interés. No obstante, en ocasiones coloniza ciertos enclaves en los que se debería abordar su erradicación. Por ejemplo, se han observado individuos sobre las dunas fósiles de la Serra Gelada (Benidorm), que de extenderse plantearían problemas de competencia con la delicada vegetación dunar allí asentada.

Amenazas:

Se considera una especie muy peligrosa, debido a la elevada tasa de producción de semillas y a la edad tan precoz con la que las plantas adquieren la madurez. Aunque la disposición de sus hojas no parece provocar interferencias por la luz con la vegetación nativa, su elevada evapotranspiración si reduce la disponibilidad de recursos hídricos en el substrato, ya escasos de por si en nuestro territorio. Todas las partes de la planta son tóxicas, excepto las semillas maduras.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1950 - 2017

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Notoceras bicorne**
Nombre castellano: Patagallina, trébol reventón

Autor Especie: **(Ait.) Amo**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ib. Vulnerables

Descripción y biología:

Hierba anual, hasta de 30 cm. Tallos ramificados, reptantes o ascendentes. Hojas 1-3 x 0,2-0,4 cm, oblongo-lineares, gradualmente atenuadas hacia la base. Racimos compactos que se alargan en la fructificación; pedicelos 1-2,5 mm. Sépalos 1,2- 1,6 mm. Pétalos c. 2 mm, poco más largos que los sépalos. Frutos 4-10 x 1,5-2 mm, erectos, adpresos; cuernos c. 1 mm, más largos que el estilo. Semillas c. 1,2 mm, uniseriadas, oblongas, rugosas, de un marrón rojizo. n = 11. Florece de febrero a mayo.

Distribución:

Notoceras bicorne se extiende por la Región Sáharo-Síndica, desde Marruecos hasta Pakistán, alcanzando el S de la Región Mediterránea y las Canarias. En la Comunitat Valenciana sólo se tienen referencias para algunas localidades del S de Alicante. Murciano Meridional.

Hábitat:

Forma parte de los pastizales anuales, en ambientes semiáridos y algo nitrificados, que se desarrollan en los claros de comunidades de Periploca angustifolia. Stipion retortae. TM, SA. 80-120 m.

Situación actual:

Esta especie ha sido citada en, al menos, dos grupos de núcleos poblacionales, localizados en las Sierras de Orihuela y de Callosa. En esta última, el área de ocupación se extienden por los términos municipales de Callosa de Segura y Albatera. No se han realizado censos detallados de las poblaciones, aunque las estimaciones sugieren un número inferior a los 500 ejemplares. En este sentido, hay que destacar que, tratándose de un terófito, está sujeto a significativas fluctuaciones poblacionales interanuales. No se dispone de datos recientes que confirmen la permanencia de las poblaciones de la Sierra de Orihuela.

Amenazas:

Sus hábitats se encuentran usualmente sobrepastoreados y, al menos en la Sierra de Orihuela, sufren la invasión de la cactácea Cylindropuntia rosea, que puede estar afectando significativamente a las poblaciones de N. bicorne por competencia lumínica y aportación de sustancias alelopáticas. Diversas áreas óptimas cercanas han sido fuertemente transformadas en las últimas décadas por el avance de la agricultura, la minería a cielo abierto y la expansión urbanística.

Acciones de conservación:

Se ha previsto desarrollar en breve acciones de censo y caracterización poblacional e iniciar la cadena de trabajos orientados a su conservación ex situ. La especie se localiza en el LIC Sierra de Orihuela y puede verse beneficiada por diversas actuaciones locales de conservación, como el control y erradicación progresiva de cactáceas que se desarrolla desde hace años en dicha zona.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1816 - 2013

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Ononis viscosa ssp. subcordata** Autor Especie: **(Cav.) Sirj.**

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Descripción y biología:

Ononis viscosa es un planta de ciclo anual que puede alcanzar hasta 40 cm de altura, aunque generalmente es pequeña. Como todas las especies del género Ononis, tiene las hojas compuestas de folíolos dentados; en este caso las hojas superiores e inferiores solo tienen un folíolo, mientras que las otras son trifoliadas. Un carácter significativo para identificarla es el pedúnculo floral que es muy corto pero prolongado en una arista varias veces más larga que el pedúnculo. Las flores son amarillas son más largas que el cáliz y éste es el carácter que le diferencia de otras subespecies de Ononis viscosa mucho más comunes. Se diferencia de Ononis ornithopodioides, que tiene un tacto viscoso y flores amarillas, porque las hojas de esta última no tienen un ala en la base, solo son estipuladas. Además el fruto manifiesta claramente la presencia de las semillas mientras que en Ononis viscosa el fruto es claramente cilíndrico. Florece al final de la primavera.

Distribución:

Ononis viscosa se distribuye por toda Europa, parte de Asia y el Oriente Medio y todo el norte de Africa. La subespecie cordata por el contrario, solo se localiza en el sur de la Península Ibérica. Las poblaciones Alicantinas representan el límite norte de esta especie en la Península.

Hábitat:

Ononis viscosa subsp. subcordata crece en arenales litorales junto con especies tan interesantes com Euphorbia baetica y Biscutella lucentina.

Situación actual:

Se trata de una especie muy rara en la Comunidad Valenciana, la cual representa el extremo de su área de distribución.

Amenazas:

El hecho de que las población valenciana de Ononis viscosa subsp subcordata no superen los 50 ejemplares provoca que esta especie sea muy vulnerable a cualquier alteración del medio donde habita, ya sea por causas naturales o inducida por el hombre. Juega en su contra el hecho de que la población está situada en un espacio vulnerable, debido al ritmo con el que se urbaniza su entorno. Ononis viscosa subsp subcordata está clasificada como "En peligro de extinción" en nuestro territorio.

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1994 - 1994

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Opuntia ficus-indica** Autor Especie: **auct., non (L.) Mill.**

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Origen: México. Descripción: Cactus de hasta 5 m de altura, con tallos engrosados y carnosos, de color verde grisáceo, con o sin espinas, que miden entre 1 y 2.5cm. Flores solitarias de gran tamaño (6-10cm) y color amarillo o anaranjado. El fruto es una baya espinosa, de color rojizo en su madurez.

Hábitat:

Coloniza matorrales, taludes y laderas y paredes rocosas continentales o litorales. Tolera las heladas moderadas, la sequía y cierta salinidad, así como las oscilaciones térmicas.

Situación actual:

: Sus formaciones densas compiten por el espacio y los recursos con la vegetación nativa. Provoca una fuerte modificación del paisaje y puede evitar los usos recreativos en el medio natural. Es un huésped de la mosca de la fruta, una de las principales plagas agrícolas del mediterráneo

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1994 - 2017

Autor ficha: Vicente Deltoro
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Orchis collina**

Autor Especie: **Banks & Sol. ex Russell**

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Autor Foto: Luis Serra

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Hierba perenne, tuberosa. Tubérculos 2, sésiles o subsésiles. Tallos lisos, glabros, con escamas basales envainadoras, escariosas. Hojas basales en roseta, anchamente lanceoladas; las caulinares decreciendo hacia el ápice, similares a las brácteas. Inflorescencia subcilíndrica, con 4-15 flores sésiles. Sépalos libres, pardo-violáceos. Pétalos de igual color; los laterales lanceolados; labelo plano o con los bordes revolutos, de subentero a crenulado, violáceo, con la zona próxima al espolón blanca; espolón sacciforme. Ginostemo recto, blanquecino. Polinios verde-azulados, con caudícula amarilla. Ovario glabro. Fruto en cápsula, erecto, con 6 costillas. Semillas hasta de 0,6 x 0,14 mm. n = 20; 2n = 36, ca. 40, 54. Florece de marzo a abril. Planta alógama autocompatible, con polinización entomógama.

Distribución:

Especie de distribución circunmediterránea e irano-turaniana, que alcanza el N de Irán y Turkmenistán. Ampliamente distribuida por el S de la Península Ibérica, aparece en localidades disyuntas y de pocos individuos desde Extremadura hasta el S de la Comunitat Valenciana y las Islas Baleares. Muy rara y escasa en la Comunitat Valenciana, ha sido citada en diversas poblaciones alicantinas. Diánico y Alicantino.

Hábitat:

Aparece en lastonares secos sobre margas en zonas soleadas de baja altitud. Calcícola. Thero- Brachypodion retusi. TM-MM, SC-SA. 2-40 (0-1000) m.

Situación actual:

Su presencia ha sido indicada en el entorno de Aspe, la Sierra de Crevillent, las salinas de Calpe y en el PN Lagunas de La Mata y Torrevieja, donde se conocen varias subpoblaciones. Las dos últimas han sido descubiertas recientemente. Exceptuando la última localidad, todas las poblaciones cuentan con un número mínimo de ejemplares, entre 1 y 3; por el contrario, la población de Torrevieja, que es objeto de seguimiento desde 2005, muestra un incremento progresivo en el número total de individuos. En 2006 fue especialmente significativo por el descubrimiento de un nuevo núcleo poblacional con más de un centenar de ejemplares, elevando el valor total de la población hasta los 163 ejemplares en cuatro núcleos poblacionales de tamaño muy desigual. El censo de esta localidad en 2008 contabilizó 197 ejemplares.

Amenazas:

Muchas zonas óptimas para albergar la especie han desaparecido en las últimas décadas por la expansión urbanística registrada en el centro y sur de la provincia de Alicante. Aunque la especie resulta beneficiada por el aclareo de la vegetación, el sobrepastoreo puede perjudicarla; no obstante, el principal riesgo actual reside en el avance de la sucesión vegetal de los pastizales donde habita, al desaparecer los claros o zonas más iluminadas donde se desarrolla. El tamaño y belleza de las flores exponen a esta orquídea a la recolección o el coleccionismo.

Acciones de conservación:

Además del seguimiento demográfico de las poblaciones, que vienen desarrollando los técnicos de la Conselleria, la mayor población se encuentra totalmente incluida en el mencionado Parque Natural, que forma parte además de la Red Natura 2000. La población de las salinas de Calp está incluida en una Microrreserva de Flora, solicitada por el ayuntamiento y actualmente en trámite de declaración. Otras especies de este mismo género han sido objeto de trabajos de germinación y micropropagación en el IVIA, con resultados desiguales. El Convenio CITES recoge una protección genérica para las orquídeas frente al comercio internacional.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1994 - 2017

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Oxalis pes-caprae**
Nombre valenciano: Agret
Nombre castellano: Agrios

Autor Especie: **L.**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
· Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA. Planta herbácea perenne que forma densos céspedes y cuyas hojas son trifoliadas ¿ como las de un trébol - con folíolos con forma de corazón que se encuentran sobre un pecíolo de cerca de 20 cm.; también es muy característica su flor amarilla, la floración es invernal, de septiembre a mayo. Posee bulbos subterráneos que dan lugar a numerosos bulbillos anualmente, que actúan como propágulos de esta especie.

Distribución:

Especie originaria de la región del Cabo, en Sudáfrica, e introducida en la cuenca mediterránea y en muchísimas otras regiones templadas del planeta, así como en regiones subtropicales, de manera involuntaria, como consecuencia de los movimientos de tierras que incluían bulbillos de la especie. Se cree que la especie fue introducida por primera vez en el sur de Europa en Malta, en el siglo XIX. Se cree que en España apareció por primera vez en 1850.

Hábitat:

Es una mala hierba de todo tipo de cultivos, aunque especialmente de los cultivos de cítricos. En la actualidad comienza a colonizar algunos hábitats naturales.

Situación actual:

Posiblemente, se trata de la especie exótica invasora más abundante y más ampliamente distribuida en la Comunitat Valenciana. No obstante, afecta fundamentalmente a cultivos, aunque también se ha localizado recientemente en algunos hábitats naturales, como sistemas dunares.

Amenazas:

Es una especie que produce pérdidas económicas ¿ debido la invasión intensa de los cultivos de agrios - y daños ambientales, ya que en los sistemas naturales que invade provoca un sombreado muy intenso, acapara la luz y el

espacio y acaba por desplazar a la vegetación nativa. En ecosistemas dunares el efecto es muy negativo, ya que estabiliza la arena y enriquece el suelo en nutrientes, con lo que promueve la entrada de plantas nitrófilas.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1950 - 2017

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Pennisetum setaceum**

Autor Especie: **(Forssk.) Chiov.**

Estados Legales

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
· Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex I

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE ALTAMENTE INVASORA. Pennisetum setaceum es una gramínea perenne que crece formando una densa macolla de tallos erectos con un tamaño entre 50 cm y un metro. Las espigas son prominentes, algo péndulas y plumosas, de un pálido color rojo vino. Las hojas, de color verde vivo, son elongadas y llegan a medir 65 cm. Existen variedades empleadas en jardinería cuyo follaje rosado, rojizo e incluso púrpura.

Distribución:

Es una especie originaria de África y oriente medio que en la actualidad se encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo, a causa de su uso como especie ornamental y de su carácter invasor. Así pues es una especie problemática en Arizona, California, Florida, Hawaii, Fiji, Sudáfrica y Australia. Se trata de una especie que resulta fácilmente dispersada por los vehículos o el ganado. A corta distancia también es dispersada por el viento y el agua.

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana se encuentra de manera ocasional naturalizado en márgenes de vías de comunicación

Amenazas:

Esta especie es capaz de adaptarse fisiológica y morfológicamente a un rango muy amplio de ambientes, de ahí su éxito como especie invasora en numerosas regiones del mundo. Además, se trata de una planta bien adaptada al fuego, de modo que las poblaciones de Pennisetum pueden recuperar la densidad que tenían antes del fuego e incluso aumentarla. En este sentido, la colonización de los ambientes naturales por pennisetum provoca un aumento en la carga de combustible del hábitat, lo que en última instancia puede provocar fuegos más intensos que pueden perjudicar a la vegetación nativa. Otras características que hacen de Pennisetum una buena invasora es que se trata de especie de rápido crecimiento que puede desplazar por competencia a otras especies de gramíneas autóctonas. Además se trata de una planta capaz de producir semillas viables sin fecundación previa ¿ asexualmente -; estas semillas permanecen viables en el suelo durante más de 7 años y contribuyen a hacer la erradicación definitiva de Pennisetum una tarea difícil, que requerirá repasos frecuentes en las áreas periféricas de los núcleos de infestación.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1989 - 2017

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Posidonia oceanica**

Autor Especie: **(L.) Delile**

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo I
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM
· Anexo II



Ver más imágenes

Descripción y biología:

Fanerógama marina, hojas acintadas, rizomas más o menos leñosos horizontales o verticales. Flores hermafroditas que florecen en otoño en el centro del haz. Fruto carnoso

Distribución:

Mediterráneo

Hábitat:

Infralitoral, fondos arenosos cercanos a la costa, en aguas limpias y bien oxigenadas.

Amenazas:

Destrucción / Alteración de hábitats.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1984 - 2016

Autor ficha: Instituto de Ecologia Litoral
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Reseda lanceolata**

Autor Especie: **Lag.**

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro crítico

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ia. En Peligro de Extinción

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Hierba anual o bienal, de 60-115 cm, glauca. Tallos glabros, erectos, poco ramificados. Hojas alternas, enteras o tripartidas. Inflorescencia racemosa, laxa; brácteas caducas, tan largas como los sépalos. Pedicelos florales hasta de 10 mm. Pétalos blanquecinos, los superiores divididos en 3 lóbulos, el central mayor. Fruto en cápsula cilíndrica, de 15- 30 mm, no estrechada en el ápice, erecta. Semillas 1 mm, sin carúncula. 2n = 24. Florece de marzo a julio. Dispersión boleocora. Además de la subespecie típica, que alcanza de forma muy localizada en el extremo meridional de Alicante, en el S de la Península Ibérica también aparece la subsp. constricta (Lange) Valdés Berm. Ambas subespecies coinciden en una parte significativa de su área global de distribución y se diferencian principalmente en la longitud de los pedicelos florales y el tamaño de las semillas, que siempre alcanzan dimensiones superiores en esta última.

Distribución:

Distribuida por el SW mediterráneo, sus poblaciones se localizan en el SE de la Península Ibérica y NW de África. En la Comunitat Valenciana, resulta extremadamente rara y sólo se conoce una población en Orihuela (Alicante).

Hábitat:

Forma parte de matorrales en ambientes semiáridos del piso termomediterráneo sobre sustratos margosos de la Sierra de Pujálvarez, formando parte de matorrales seriales bastante degradados por factores antrópicos(Thymo-Sideritidionleucanthae), como el pastoreo, la remoción de terrenos, etc.

Situación actual:

Taxon muy raro en nuestro territorio, únicamente conocido en una localidad de la Sierra de Pujálvarez (Orihuela, Alicante), que constituye el límite septentrional de su área de distribución. Los censos realizados desde 2008 muestran claras fluctuaciones interanuales asociadas con las condiciones climáticas de la anualidad correspondiente, especialmente en lo relativo a las precipitaciones. Los valores registrados en este periodo oscilan entre los 3 ejemplares censados en 2012 y los 123 en 2009.

Amenazas:

La especie está expuesta a la extinción por eventos naturales estocásticos o acciones antrópicas del entorno, como la sustitución de la vegetación natural por cultivos de regadío y urbanizaciones. Esta situación alarmante es consecuencia de su población demasiado reducida y excesivamente alejada de las más cercanas, localizadas en la provincia de Murcia.

Acciones de conservación:

Las únicas acciones de conservación se han centrado en el estudio demográfico de la población conocida y en el rastreo del territorio para la localización de nuevos núcleos. También se han recolectado semillas y se han realizado diversos ensayos de germinación que han permitido establecer un protocolo más efectivo con resultados satisfactorios.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1993 - 2017

Autor ficha: Simón Fos
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Ricinus communis**

Nombre castellano: Ricino, higuera del infierno

Autor Especie: **L.**

Origen: Exótico

Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Pequeño árbol de crecimiento rápido, con tallos lampiños, ramificados y rojizos. Las hojas son grandes, pecioladas, de hasta 60 cm, en forma de palma, con lóbulos lanceolados y márgenes dentados. Las flores están agrupadas en densas inflorescencias; las masculinas, tienen los estigmas amarillos y las femeninas son globos con estambres de color rojo. El fruto es una cápsula lisa o erizada de espinas que contiene 3 semillas brillantes. El ricino se reproduce a partir de semilla. Las plantas se reproducen sexualmente el primer año y pueden florecer todo el año en enclaves libres de heladas. Una única planta de gran tamaño puede producir hasta 150.000 semillas. Se trata de una especie que tolera mal la sequía, ya que induce un cierre de sus estomas y una disminución drástica de la fotosíntesis. Por esta razón el ricino no es frecuente en zonas áridas, ni tampoco en las zonas con fríos invernales intensos, ya que se trata de una especie muy termófila. El ricino se reproduce a partir de semilla. Las plantas se reproducen sexualmente el primer año y pueden florecer todo el año en enclaves libres de heladas. Una única planta de gran tamaño puede producir hasta 150.000 semillas. Se trata de una especie que tolera mal la sequía, ya que induce un cierre de sus estomas y una

disminución drástica de la fotosíntesis. Por esta razón el ricino no es frecuente en zonas áridas, ni tampoco en las zonas con fríos invernales intensos, ya que se trata de una especie muy termófila.

Distribución:

Es una planta originaria posiblemente de Etiopia y Somalia, si bien su uso en cultivo desde la antigüedad ha difuminado el origen de la especie. En la actualidad se encuentra distribuido por numerosas regiones cálidas y tropicales del mundo donde se comporta como invasor, e impide la reinstalación de la vegetación natural. En España se encuentra distribuido fundamentalmente por las regiones costeras mediterráneas.

Hábitat:

Coloniza ambientes ruderales, márgenes viarios y cauces artificiales o naturales degradados

Situación actual:

En la Comunitat Valenciana es una planta cultivada como ornamental y por el uso medicinal que antiguamente se daba a sus semillas. Debido a este cultivo generalizado de la especie se ha naturalizado en ambientes nitrificados, preferentemente en Comunidades de Artemisietea vulgaris. Se encuentra distribuida por las tres provincias tanto en zonas interiores como litorales, aunque con preferencia por altitudes bajas, con clima semiárido o secosubhúmedo.

Amenazas:

Se trata de una especie de desarrollo vigoroso, capaz de colonizar áreas alteradas y de excluir a la vegetación autóctona, especialmente en ramblas, barrancos húmedos y zonas riparias. Puede llegar a establecerse como formaciones monoespecíficas. Sus semillas germinan con rapidez después de cualquier perturbación, incluido el fuego. En la Comunitat Valenciana su presencia se limita, por ahora, a ambientes degradados de poco valor ecológico.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1950 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Robinia pseudacacia**

Nombre castellano: Acacia blanca

Autor Especie: **L.**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA Árbol caducifolio de 10-15 m de altura de copa ancha y tronco corto muy fisurado. Posee ramas jóvenes espinosas y hojas alternas, imparipinnadas, de hasta 30 cm de longitud. Posee 9-19 folíolos eliptico-ovales de 3-4 cm de longitud, de color verde intenso en el haz y algo grisáceos en el envés. En abril-mayo produce flores en racimos colgantes de 10-20 cm de longitud, con corola blanca y una mancha amarilla. El fruto en legumbre de 5-10 cm de longitud, aplanada, de color castaño cuando madura, que permanece en el árbol durante bastante tiempo.

Distribución:

Es un árbol procedente de América del norte, concretamente del centro y del este. Actualmente se ha naturalizado desde el sur de Canada hasta California. Ha sido utilizado muy frecuentemente en repoblaciones en muchos países centroeuropeos y mediterráneos. En la actualidad es considerada una especie invasora en los Paises Bajos, Francia, Alemania, Suiza, Hungría, Grecia, Turquia, Chipre, Israel, Australia y Nueva Zelanda. A pesar de su origen, en algunos estados de Estados Unidos, también se considera invasora. En la Península Ibérica y en los archipiélagos aparece naturalizada en muchos lugares dispersos, si bien su distribución se concentra en franja cantabrica, en Huesca, Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Hábitat:

En su región de origen habitat tanto en bosques como en terrenos abiertos, sobres suelos arenosos o pedregosos. En la Peninusla ibérica se ha cultivado fundamentalmente en taludes y torrentes y se ha naturalizado abundantemente en bosques y barrancos más o menos húmedos.

Situación actual:

Es la tercera especie en cuanto a ocupación de cuadrículas (n= 110) en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Castellón está presente en el 72,5% de las cuadrículas. Este porcentaje de ocupación provincial es el más elevado para el conjunto de las especies estudiadas en toda la C. Valenciana. Es una de las especies exóticas mejor distribuidas en la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Castellón. Robinia muestra una amplia distribución altitudinal y una gran afinidad por ríos y barrancos y zonas de abruptosidad media.

Amenazas:

Es un árbol de crecimiento muy rápido, que se propaga sexualmente mediante semillas y asexualmente a través de rebrotes de las raíces. Soporta la tala, rebrota con facilidad y puede crecer desde el nivel del mar a los 1300 metros. Tolera los suelos pobres y es resistente al frío y a la falta de agua. Se comporta como invasora en buena parte de las regiones templadas del mundo y está extensamente y está extensamente naturalizada en el sur y centro de Europa. Es muy peligrosa para los ecosistemas naturales, sobretodo para los ecosistemas forestales, donde invade los claros y provoca el desplazamiento de la flora autóctona.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1980 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Rumex roseus**

Nombre castellano: Acedera morisca

Autor Especie: **L.**

Origen: Autóctono

Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ia. En Peligro de Extinción

Descripción y biología:

Pequeño arbustoperenne rizomatosa, con tallos rojizos que puede alcanzar casi 1 m de altura y1,5 m de diámetro gracias a su rizomagrueso y estolonífero, que facilita su desarrollo en sustratos arenosos. Tallos robustos, asurcados, a menudo ramosos. Hojas (17-75 x 7-30 cm) ovadasa oblongo-lanceoladas, agudas ytruncadas o raramente cuneadas en la base, ligeramente onduladasy algo dentadas en el margen, a veces sagitadas i raramente pinnatisectas;peciolo más corto o poco más largo que la lámina; ócreas grandes. Inflorescencia simple,ocasionalmente con las ramas inferiores algodivididas. Flores hermafroditas o unisexuales distribuidas de forma variable; ocasionalmente dioica. Valvas (7-11 mm) ± orbiculares,cordadas en la base, ± enteras, inicialmenteblanquecinas pero enrojecidas al madurar. Aquenios (3-4 mm)pardo-rojizos, brillantes. Florece de marzo a junio (julio)

Distribución:

Taxon de distribuciónmediterráneo-occidental, ampliamentedistribuido por el occidente peninsular,donde abundan los sustratos arenosos, peroenormemente escaso en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica. En la Comunitat

Valenciana sólo se conoce en unas pocas poblaciones en los términos municipales de Orihuela, Petrer y Villena.Su distribución bioclimática abarca los pisos termo- y mesomediterráneo inferiorbajo ombrotipo semiárido hasta subhúmedo.

Hábitat:

En el conjunto de su área de distribución muestra una mayor valencia ecológica que le permite instalarse sobre diversos hábitats naturales o alterados por actividades antrópicas, como márgenes de caminos, viñedos, campos abandonados, pinares, etc., a veces en cascajares de borde de río. Las poblaciones alicantinas aparecen en la posición ecológica que le resulta más favorable: los arenales tanto marítimos como interiores.En las dunaslitorales aparece en comunidades del Loto cretici-Crucianelletummaritimae y en el interior en las de Sideritidochamaedryfoliae-Teucrietumdunensis.

Situación actual:

En la Comunidad Valenciana fue inicialmentemencionado por Carlos Pau de Carcaixent (Valencia), a finales del siglo XIX, y de José Borja Carbonell en la Serra de la Murta (Corbera, Valencia), aunque sólo existe material de herbario de este último.Posteriormente, fue localizada en el litoral de Orihuela(Alicante) y en los arenales de Petrery Villena (Alicante), donde se localizan las poblaciones conocidas actualmente, aunque algunos de los primeros núcleos descubiertos han desaparecido. Actualmente, sólo se tiene confirmada su presencia en 4 núcleos poblacionales: el arenal dePruna (Petrer) y otros tres 3 Orihuela. Los censos realizados en 2013 han contabilizado un total de 406 ejemplares, aunque más del 90% se concentran en la población de la Rambla de la Glea (Orihuela).

Amenazas:

Sus principales amenazas provienen del desmesurado crecimiento urbanístico sobre el litoral y a la fragmentación del hábitat. La desaparición de las poblaciones de la Dehesa de Campoamor y Barranco de la Glea(Orihuela, Alicante) se relaciona con la primera causa; también se han confirmado la extinción de otros núcleos en Petrer y litoral oriolano que se deben a la desaparición o transformación del hábitat. Por su parte, el reducido tamaño poblacional, con una fuerte concentración de efectivos en un solo núcleo, la hace especialmente vulnerable a cualquier alteración del hábitat por causas naturales o artificiales, especialmente los núcleos poblacionales que no superan la veintena de ejemplares. Además, estas poblaciones con un número tan reducido de ejemplares están expuestas a cuellos de botella genéticos y a depresión endogámica.

Acciones de conservación:

Las poblaciones conocidas son regularmente visitadas, censadas y cartografiadas. Estas acciones se han completado con rastreos exhaustivos para localizar algunas de las poblaciones indicadas en la bibliografía. También se conservan diversas accesiones en los Bancos de Germoplasma de la Comunitat Valenciana y se han iniciado los trabajos de propagación que han permitido establecer un protocolo estandarizado de germinación y se ha producido planta para una primera experiencia de creación de una población de seguridad en la MRF ¿Arenal de Petrer-Almorxó¿ (Petrer, Alicante). Por otra parte, algunas de las poblaciones conocidas en Orihuela se localizan en Espacios Protegidos Red Natura 2000, concretamente en los LIC ¿Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor¿ y ¿Cabo Roig¿.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1944 - 2016

Autor ficha: Simón Fos
Año ficha: 2014

[imprimir]

Nombre científico: **Ruscus aculeatus**
Nombre valenciano: Galzeran
Nombre castellano: Rusco

Autor Especie: **L.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Directiva de Hábitats
- Anexo V

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Planta vivaz, verde todo el año, con rizoma subterráneo del que brotan numerosos tallos rígidos de hasta 1 m. de altura. Hojas reducidas a pequeñas brácteas membranosas de cuya axila salen ramillas laterales aplastadas de aspecto foliáceo (filóclados), enteras, de contorno ovado a lanceolado, bruscamente estrechadas en una punta espinosa. Flores pequeñas, unisexuales, en la axila de una bractéola situada en el centro de la ramilla foliácea. Fruto en baya globosa, de 10-15 mm. de diámetro, roja. Florece de marzo a mayo. Los frutos maduran de otoño a invierno.

Distribución:

Se distribuye por la región mediterránea, alcanzando en centro de Europa. En la provincia de Alicante es bastante escasa.

Hábitat:

Pisos bioclimáticos termo y mesomediterráneos. Ombroclima subhúmedo. Zonas umbrosas de montaña, en comunidades de Quercetalia ilicis

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1864 - 2017

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1994

[imprimir]

Nombre científico: **Salsola soda**
Nombre castellano: Barrilla Común

Autor Especie: **L.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo Ib. Vulnerables

Descripción y biología:

Hierba anual 30-80 cm. Tallos rojizos, robustos, erectos, glabros. Hojas 15-75 mm, en su mayoría alternas, semiamplexicaules, cilíndrico-lineares, de margen escarioso, con ápice mucronado y caduco; las inferiores opuestas. Brácteas similares a las hojas aunque más cortas, ensanchadas en la base; bractéolas más largas que las flores. Flores c. 3 mm, solitarias o en grupos de 3-4 en la axila de las hojas. Semillas 3-5 mm. n = 9; 2n = 18, 36. Florece de junio a septiembre. Más información sobre conservación de germoplasma y cultivo en: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=82491&idioma=C

Distribución:

Especie de distribución paleotemplada, dispersa por el litoral suroccidental y mediterráneo de la Península Ibérica y en algunas depresiones interiores. En la Comunitat Valenciana se localiza en las áreas semiáridas del S de la provincia de Alicante. Alicantino.

Hábitat:

Coloniza terrenos encharcables de saladares o zonas próximas al mar, apareciendo cuando se evapora la lámina de agua, en formaciones anuales o juncales halófilos. Thero-Suaedion maritimae o Juncion maritimi. TM, SA. 4 m.

Situación actual:

Conocida desde finales del siglo XVIII, fue encontrada por M. Barnades en La Marina de Elx y posteriormente fue localizada por M. Lagasca en Alicante y por A. Rigual en la Laguna de La Mata, El Hondo y el embalse de Elx. Otra cita de finales de los 80, la sitúa en la desembocadura del río Segura (Guardamar de Segura, Alicante). No se tienen referencias actualizadas que permitan confirmar su presencia en las localidades indicadas, exceptuando la del PN de El Hondo, donde está confirmada la presencia de la planta. La población, actualmente incluida en una Microrreserva de Flora, está formada por una treintena de ejemplares que crecen en la franja de suelo salino húmedo que queda expuesta al disminuir los niveles en El Hondo.

Amenazas:

La permanencia de la especie pudo ser fomentada en el pasado por su recolección en ambientes naturales controlados para la obtención de sosa. El abandono de tal actividad y la destrucción o modificación ambiental de los saladares y sus niveles hídricos habrían conllevado la reducción y fragmentación de las poblaciones hasta niveles insostenibles. Los ejemplares del Hondo pueden verse afectados por el exceso de inundación, en ocasiones necesario para el desarrollo de proyectos de conservación de fauna amenazada.

Acciones de conservación:

La única población de Salsola soda conocida actualmente se localiza en una Microrreserva de Flora, incluida dentro del PN de El Hondo. Como especie prioritaria de la microrreserva, es objeto de seguimiento por parte de los técnicos de la Conselleria.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1852 - 2016

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Senecio angulatus**

Autor Especie: **L. fil.**

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Planta trepadora de hojas gruesas y carnosas, de morfología similar a las de la hiedra, con dos a tres dientes en cada lado. Tanto los tallos como las hojas están desprovistos de pelos y son de un intenso color verde lustroso. Las flores en capítulo, numerosas y de color amarillo intenso, aparecen en otoño e invierno. Las semillas, aquenios, son portadoras de un plumero de pelos que favorece su dispersión por el aire.

Distribución:

Es una especie nativa de Sudáfrica que en la actualidad se encuentra distribuida por el este de Africa: Uganda, Kenya, Tanzania, el oeste de Australia y Tasmania, Nueva Zelanda, las islas Canarias y Baleares y Europa (Córcega, Francia y Mónaco, Portugal, Italia, Cerdeña y Sicilia e islas circundantes.

Hábitat:

Vive cultivada en jardines donde puede llegar a cubrir paredes y fachadas, también la podemos encontrar naturalizada en las cunetas. Prefiere suelos calizos pero puede crecer en todo tipo de sustratos, desde la costa a territorios interiores que no experimenten fuertes heladas.

Situación actual:

Senecio angulatus es una especie ampliamente repartida por la Comunidad Valencia donde es frecuente verla cubriendo extensiones variables de matorral en el seno de barrancos. De momento no afecta a hábitats cuya conservación esté amenazada pero su tendencia poblacional es expansiva.

Amenazas:

Como la mayor parte de las lianas es una especie capaz de crecer vigorosamente en barrancos frescos con una cubierta arbórea capaz de proporcionar condiciones umbrosas. En esta situación es capaz de ahogar la vegetación nativa al crecer encima de ella, tanto en el estrato herbáceo como en el arbustivo. Su modo de crecimiento en forma de tapiz denso altera la entrada de luz en la comunidad e impide el desarrollo de plantas nativas.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1986 - 2014

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2009

[imprimir]

Nombre científico: **Sideritis glauca**
Nombre valenciano: Rabet de gat
Nombre castellano: Rabo de gato rosado

Autor Especie: **Cav.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· Vulnerable
Lista roja de Flora Vascular
· Vulnerable

Estados Legales

Convenio de Berna
· Anexo I
Directiva de Hábitats
· Anexo II
· Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
· LESRPE



Autor Foto: Luis Serra

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Arbusto pequeño, de 20-50 cm, glabro. Hojas linear-lanceoladas, generalmente enteras; las basales caducas, tomentosas; las caulinares algo más estrechas, agudas, glabrescentes. Inflorescencia con 2-9 verticilastros de 2-6 flores; brácteas pequeñas, de 3-5 mm, enteras o levemente dentadas. Cáliz acampanado, dentado, con ápice blanquecino, glabro. Corola blanca, en ocasiones con nerviación púrpura; labio superior, escotado o entero; el inferior con lóbulos laterales estrechos. Fruto en tetranúcula; núculas subtrigonas. 2n = 34. Florece de febrero a agosto. Más información sobre conservación de germoplasma y cultivo en: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=82491&idioma=C

Distribución:

Endemismo del SE de la Península Ibérica, donde queda restringido a las sierras alicantinas de Orihuela, Callosa y áreas limítrofes de Murcia. Murciano Meridional.

Hábitat:

Crece en fisuras de codinas y roquedos calcáreos con orientación a solana en ambientes semiáridos. Teucrion buxifolii. TM, SA. 80-600 m.

Situación actual:

A pesar de su reducida distribución territorial, resulta relativamente abundante en las comunidades rupícolas de los paredones calcáreos de solana que constituyen su óptimo ecológico. Los estudios demográficos han estimado el tamaño total de la población alicantina entre 100.000 y 300.000 individuos, ajustando el porcentaje de ocupación de la especie a su área potencial. La población de la Sierra de Orihuela concentra un mayor número de efectivos.

Amenazas:

Parte del hábitat donde esta especie fue citada en el pasado ha sido extensivamente alterado por la expansión urbanística, la transformación agraria y la instalación de canteras e infraestructuras viarias. La carencia de mecanismos de defensa frente al ramoneo, tanto físicos como químicos, hace que la especie sea particularmente palatable para el ganado, en especial para las cabras domésticas, lo que presumiblemente ha abocado a que la especie reduzca su hábitat a ecótopos rupestres poco accesibles, dando lugar a poblaciones fragmentadas aunque en ocasiones abundantes.

Acciones de conservación:

Gozaba de protección en la Comunitat Valenciana desde 1985. Varios núcleos poblacionales se localizan en los LIC Sierra de Orihuela y Sierra de Callosa de Segura, contando con las medidas de protección derivadas de la Red Natura 2000. Tres Microrreservas de Flora albergan poblaciones que son objeto de seguimiento por parte de los técnicos de la Conselleria. Se dispone de material conservado en el Banco de Germoplasma de Flora Silvestre Valenciana (JBUV) y se ha establecido un protocolo depurado de germinación, caracterizadándose algunos aspectos de su biología reproductiva. Se dispone de ejemplares vivos en las rocallas didácticas del IVIA y del JBUV.

Seguimiento de poblaciones:



[descargar excel]

Mapa de distribución:

Acercar a

Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1954 - 2016

Autor ficha: Aguilella, A; S. Fos & E. Laguna (eds.) 2009. Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas. Colección Biodiversidad, 18. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. Valencia. 358 pp.
Año ficha: 2010

[imprimir]

Nombre científico: **Solanum bonariense**

Nombre castellano: Naranjillo

Autor Especie: **L.**
Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Ver más imágenes

Descripción y biología:

ESPECIE INVASORA Arbusto de hasta 2m de altura, de tallos erectos, los jovenes cubiertos por pelos estrellados y los maduros desprovistos de ellos. Las hojas de color verde intenso y forma alargada, son pecioladas, agudas en el ápice y redondeadas en la base. Florece de abril a julio, momento en que produce flores blancas de hasta 3cm de diámetro con cinco lóbulos. El fruto es carnoso ¿ una baya ¿ y esférico, de color amarillo o anaranjado.

Distribución:

Planta originaria del sur de Brasil y Uruguay, así como del nordeste de Argentina. Esta naturalizada en la región mediterránea.

Situación actual:

Se considera una especie invasora en numerosas regiones templado cálidas del mundo ¿ se trata de una especie sensible al frio -. La especie se ha naturalizado con éxito el sudoeste de Europa, si bien por el momento no es causa de problemas ecológicos serios. En España ha colonizado riberas fluviales, pero por el momento ¿ como antes han hecho especies que ahora se comportan como invasoras ¿ su hábitat preferente son los lugares alterados

Amenazas:

Se trata de una especie naturalizada en la Comunitat Valenciana, para la cual existen un número muy importante de citas en la provincia de Valencia y Alicante. Por el momento se localiza en áreas de poco valor ambiental. Es importante tener en cuenta a la hora de valorar su peligrosidad que se trata de una especie capaz de reproducirse sexualmente a partir de semilla o asexualmente mediante rizomas.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1958 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Teucrium freynii**
Nombre valenciano: Trencapedres
Nombre castellano: Poleo de roca

Autor Especie: **E. Rev. ex Willk.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Categoria UICN
· En peligro crítico

Descripción y biología:

Planta cespitosa

Distribución:

Endemismo del SE de la Península Ibérica, de los sectores Almerienese y Murciano, habiéndose indicado para la Comunidad Valenciana en la Sierra de Orihuela, donde no ha vuelto a ser vista desde hace varios años

Hábitat:

Habita en fisuras de roquedos y pardenos calizos, preferentemente bajo bioclima termoditerráneo semiárido

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1981 - 1994

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1994

[imprimir]

Nombre científico: **Thymus membranaceus**

Nombre castellano: Cantahueso

Autor Especie: **Boiss.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo III. Especies Vigiladas

Autor Foto: Luis Serra

Descripción y biología:

Mata leñosa colonizadora

Distribución:

Endemismo del SE de la Península Ibérica, que alcanza la Comunidad Valenciana por el SW de Alicante

Hábitat:

Habita taludes, matorrales abiertos y pinares aclarados, sobre suelos poco evolucionados preferentemente básicos, bajo bioclima termo y mesomediterráneo semiárido.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas

Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1902 - 2016

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1994

[imprimir]

Nombre científico: **Thymus moroderi**
Nombre valenciano: Cantauesso
Nombre castellano: Cantahueso

Autor Especie: **Pau ex Mart. Mart.**
Origen: Autóctono
Medio: Terrestre

Libros Rojos

Lista roja de Flora Vascular
· Vulnerable

Autor Foto: Luis Serra

Ver más imágenes

Descripción y biología:

Matita leñosa, pubescente, con glándulas amarillentas. Hojas lineares, revolutas. Inflorescencia capituliforme. Brácteas violáceas, mucho mayores y vistosas que las hojas, con márgenes ciliados. Corola púrpura, excediendo bastante a los sépalos y brácteas. Florece de abril a junio.

Distribución:

Endémico de parte de la provincia de Alicante, penetrando ligeramente en la de Murcia.♂♂

Hábitat:

Habita en suelos calizos o yesosos degradados y secos, bajo bioclima termomediterráneo semiárido, interviniendo principalmente en matorrales calcícolas y gipsícolas xéricos

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1936 - 2016

Autor ficha: Laguna, E. (coord.) (1998) Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana. Valencia.
Año ficha: 1998

[imprimir]

Nombre científico: **Yucca aloifolia**

Nombre castellano: Yuca pinchuda

Autor Especie: **L.**

Origen: Exótico
Medio: Terrestre

Estados Legales

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana
· Anex II

Descripción y biología:

ESPECIE POTENCIALMENTE INVASORA Planta de 2 a 6 m de altura, con hojas lanceoladas y largas de hasta 50-75 cm de largo de color verde. En los individuos jóvenes, las hojas crecen al nivel del suelo pero con los años y la formación de un tronco pierden las hojas inferiores. Florece de finales de primavera a principios de otoño, momento en que produce flores grandes de color blanco, que aparecen reunidas en el extremo de un escapo que aparece entre las hojas superiores. Los frutos son carnosos negros.

Distribución:

Se cultiva en numerosas regiones del mundo en virtud de su tolerancia a la sequia y de su atractivo. Desde los jardines se naturaliza con frecuencia en zonas adyacentes.

Hábitat:

Es una especie originaria de las áreas costeras del norte de Carolina a Méjico. Crece de manera óptima en suelos arenosos a pleno sol.

Situación actual:

En la Comunidad Valenciana es una especie que se encuentra naturalizada en ambientes costeros, preferentemente en sistemas dunares, debido a la capacidad que tienen los ejemplares abandonados procedentes de los jardines para enraizar y su tolerancia a la sequia. En estas condiciones puede llegar a formar grupos densos de decenas de ejemplares.

Amenazas:

Es una planta con capacidad para naturalizarse en los sistemas dunares de la Comunitat Valenciana, donde puede formar masas densas. No obstante no resulta, por ahora, demasiado agresiva. La Yucca es una especie difícil de erradicar en campo, peligrosa para el hombre y la fauna doméstica a causa de los aguijones de sus hojas.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Periodo de observación: 2000 - 2016

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2007

[imprimir]

Nombre científico: **Ziziphora aragonensis**

Autor Especie: **Pau**

Estados Legales

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas
· Anexo II. Protegidas no catalogadas

Descripción y biología:

Hierba anual, aromática, con hojas pecioladas de hasta 3 mm, con limbo ampliamente ovado, entero o levemente dentado, con glándulas y pelos rígidos dispuestas sobre todo en el margen. Inflorescencia formada por grupos de 6 a 10 flores de color rosa, que presentan un cáliz tubular algo curvado, con pelos dirigidos hacia delante, principalmente en la parte inferior, y dientes de aproximadamente 1 mm.

Distribución:

Endemismo que se distribuye por la mitad oriental de la Península Ibérica. En Aragón se ha localizado en la Depresión del Ebro, donde se encuentra dispersa.También aparece, aunque más rara, en el Sistema Ibérico: estribaciones orientales del Moncayo, puntos dispersos por las sierras de Albarracín y Gúdar, y en Calatayud. Las poblaciones de la Comunitat Valenciana representan el límite sur de la distribución de esta especie.

Hábitat:

Pastizales terofíticos instalados en claros de matorrales y espartales. Preferentemente sobre suelos ricos en yesos, aunque también puede encontrarse sobre limos y arcillas. En la Comunitat Valenciana crece en pastizales anuales sobre arenas y margas de forma muy localizada, aunque por el rango ecológico que presenta, podría ser más abundante y localizarse en diversos puntos, al menos en las sierras más secas del centro y sur de la provincia de Alicante.

Situación actual:

Taxon muy escaso en la provincia, unicamente detectado Sierra de Salinas, en zonas arenosas de la base del barranco de los Hierros y en Monte Hurchillo, en Orihuela. Su poblacion total conocida no supera los 50 individuos

Amenazas:

Las derivadas de su pequeño tamaño poblacional y de un área de distribución reducida, que hacen vulnerable a esta especie a cualquier alteración del entorno. Es una especie que en la Comunitat Valenciana se incluye en la categoria de ¿vulnerable¿.

Acciones de conservación:

No se han llevado a cabo acciones de conservación concretas para esta especie.

Mapa de distribución:

Acercar a



Citas recientes (2001 -)
Citas 1980 - 2000
Citas Históricas
Fuente Mapa: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Periodo de observación: 1954 - 2006

Autor ficha: Vicente Deltoro Torró
Año ficha: 2008

[imprimir]